

1898

Арх. 102072

ПОЛНЫЙ РУССКИЙ

иллюстрированный

# СЛОВАРЬ-ТРАВНИКЪ

И

## ЦВѢТНИКЪ

СОСТАВЛЕННЫЙ



по новѣйшимъ ботаническимъ и медицинскимъ сочиненіямъ

врач. Е. Н. Зальсовой и О. В. Петровской

Томъ IV

С—Я

съ 83 рисунками въ краскахъ и 87 иллюстраціями.



С.-Петербургъ.

Книжный складъ «Родины», Литовская ул., соб. д., № 114.

1901.

Ср. 93791

Дозволено цензурою. С.-Петербургъ, 25 ноября 1901 г.



Графическое заведение «Родины» (А. А. Каспари).  
С.-Петербургъ, Лиговская ул., соб. д., № 114.

## Отъ издателя.

Выпуская нынѣ четвертый томъ нашего изданія «Полный русскій иллюстрированный Словарь-Травникъ и Цвѣтникъ» — томъ, содержащій въ себѣ описаніе растений на буквы С—Я (стр. 945—1152) и снабженный 73-мя раскрашенными рисунками (228—300) и 87-ю иллюстраціями (259—345), мы этимъ заканчиваемъ нашъ трудъ, имѣвшій своей цѣлью дать русской семьѣ такое изданіе, которое 1) служило-бы, какъ хорошій справочникъ, для точнаго опредѣленія всякаго растенія по его мѣстному, употребляющемуся лишь въ той или иной губерніи или области Россіи, названію и ботаническому его описанію, и 2) научало-бы разнообразному пользованію растеніями для домашняго обихода, для сельскаго хозяйства и для облегченія болѣзней людей и животныхъ.

Первая наша цѣль достигается тѣмъ, что въ нашемъ «Словарѣ-Травникѣ и Цвѣтникѣ» всѣ многочисленныя названія растений, какъ мѣстныя, такъ и научныя, расположены въ алфавитномъ порядкѣ, благодаря чему, зная мѣстное названіе растенія, легко найти, по ссылкѣ, стоящей за нимъ, и научное или по крайней мѣрѣ наиболѣе употребительное названіе растенія, за которымъ слѣдуетъ описаніе тѣхъ главнѣйшихъ признаковъ его внѣшняго вида, строенія, цвѣта и проч., по коимъ оно отличается отъ другихъ растений. Послѣднему обстоятельству, т. е., отличенію растений одного отъ другого, способствуютъ также приложенные къ книгѣ рисунки, напечатанные цвѣтными и черной красками.

Для достиженія второй нашей цѣли, т. е., указанія, какъ пользоваться растеніемъ, мы за ботаническимъ описаніемъ растений помѣстили соотвѣтствующія указанія на примѣненіе ихъ въ домашнемъ обиходѣ, сельскомъ хозяйствѣ и промышленности и тамъ-же, подъ заголовкомъ «Медицинское употребленіе», свѣдѣнія о томъ, какъ данное растеніе употреб-



ляется съ лечебными цѣлями, какъ въ народѣ, такъ и въ научной медицинѣ, причемъ въ большинствѣ случаевъ указано лечебное примѣненіе аллопатическое и гомеопатическое. Благодаря этому, читатель найдетъ въ нашемъ изданіи массу вполне безвредныхъ лечебныхъ средствъ не только для человека, но также и для животныхъ, а для того, чтобы разобратъ въ этихъ средствахъ и найти нужное при той или иной болѣзни, мы къ этому четвертому тому прилагаемъ **два алфавитныхъ списка**: первый — списокъ болѣзней человека, второй — списокъ болѣзней животныхъ. Въ этихъ обоихъ спискахъ за названіемъ болѣзней поставлены цифры, обозначающія тѣ страницы «Словаря-Травника», на которыхъ указано лечебное средство, способствующее облегченію и излеченію той или иной болѣзни.

Кромѣ этого, мы въ настоящемъ четвертомъ томѣ постарались восполнить тѣ невольные пропуски, которые объясняются громадной массой мѣстныхъ названій растений, и распредѣлили ихъ въ концѣ книги въ своемъ алфавитномъ порядкѣ. Вмѣстѣ съ тѣмъ мы приносимъ нашу благодарность тѣмъ изъ читателей, которые сооблаговостили сдѣлать указанія на эти невольныя и вполне извинительныя ошибки. Эти указанія намъ особенно дороги потому, что они говорятъ намъ о томъ, что наше изданіе «Полный русскій иллюстрированный Словарь-Травникъ и Цвѣтникъ» встрѣтило интересъ и сочувствіе среди русскихъ читателей. Мы же, со своей стороны, питаемъ надежду, что этимъ своимъ изданіемъ мы послужили также и на пользу русской семьи.



**Сумахъ большой виргинскій**, см. Уксусное дерево (*Rhus typhina* L.).

**Сумахъ копаль** (*Rhus corallinum* L.). Довольно высокій кустарникъ, произрастающій въ сѣверной Америкѣ. Листья употребляются туземцами для куренія. Какъ декоративный, кустарникъ этотъ иногда встрѣчается и въ паркахъ.

**Сумахъ красильный** (*Rhus Coriaria* L.). Дерево красильничье, Желтникъ красильный, Сумахъ, Кожевенное дерево. Кустарникъ, произрастающій у Средиземнаго моря, преимущественно въ Испаніи и Греціи, разводится, какъ декоративный, въ садахъ на югѣ. Листья и молодые побѣги употребляются на дубленіе кожъ и черную краску. Плоды даютъ красную краску, а кора—желтую. Листья примѣшиваются къ табаку для сообщенія ему пріятнаго запаха. Смятые листья, приготовленные для краски, извѣстны въ торговлѣ подъ названіемъ «шмакъ».

**МЕДИЦИНСКОЕ УПОТРЕБЛЕНІЕ.** Листья и плоды сыздавна употреблялись въ медицинѣ при желчныхъ лихорадкахъ, кровотеченияхъ, слизотеченіяхъ; въ настоящее время сумахъ врачами не выписывается и употребляется только въ гомеопатіи. Настойка свѣжихъ листьевъ въ гомеопатіи употребляется отъ многихъ сыпныхъ болѣзней, отъ лихорадки, поносовъ, ревматизма, подагры, параличей, истощенія, скарлатины, воланки, непроизвольнаго мочеиспусканія, бородавокъ и головной боли. Даютъ 1-2 капли чистой настойки или 1, 2, 3, 6-го разведенія 1-2 раза въ день.

Въ ветеринарной гомеопатіи дается 1-е или 2-е разведеніе въ тѣхъ-же случаяхъ, какъ и у людей.

**Сумахъ ядовитый** (*Rhus toxicodendron* L.). Кустарникъ, родомъ изъ Сѣверной Америки, встрѣчающійся у насъ въ качествѣ декоративнаго въ садахъ и паркахъ. Содержитъ во всѣхъ своихъ частяхъ острый желтовато-бѣлый, чернѣющій на воздухѣ, ядовитый молочнообразный сокъ, красящій въ черную краску бумагу и бумажныя ткани. При прикосновеніи вызываетъ на тѣлѣ сыпь, головокруженіе и судороги.

**Сумахъ японскій** (*Rhus succedanea* L.). Кустарникъ родомъ изъ Японіи и Китая. При выжиманіи и вывариваніи сѣмянъ получается такъ называемый «японскій воскъ» — твердое масло, употребляемое у индійцевъ на выдѣлку свѣчей и составляющее довольно обширный предметъ торговли съ Европой.

**Сумахъ японскій лаковый** (*Rhus vernicifera* Dc.). Ядовитый кустарникъ, произрастающій въ Китаѣ и Японіи. Изъ млечнаго сока, получаемаго при надрѣзахъ корня, японцы приготовляютъ извѣстный «японскій лакъ», а изъ сѣмянъ—масло, употребляемое, какъ горючій матеріалъ.

**Сумникъ**, см. Золотая роза (*Solidago Virgaurea* L.).

**Сумочникъ**, см. Пастушья сумка (*Capsella Bursa pastoris* Moench.)

**Сунца** см. Земляника лѣсная (*Fragaria vesca* L.)

- Суниця  
 Суница  
 Суничка  
 Суничникъ  
 Суница } см. Земляника лѣсная (*Fragaria vesca* L.).  
 Супротивница, см. Вероника ключевая (*Veronica Anagallis* L.).  
 Сурепка, см. Горчица дикая (*Sinapsis arvensis* L.).  
 Суржанка  
 Суржанокъ } см. Пшеница обыкновенная (*Triticum vulgare* L.).  
 Суржикъ  
 Сурикъ, см. Жгутъ корень ядовитый (*Cnidium venosum* Koch.).  
 Сурипка, см. Гулявникъ лекарственный (*Sisymbrium officinale* L.).  
 Сурипица, см. Брюква (*Brassica Napus* L.).  
 Сурмалина, см. Лапчатка-узикъ (*Potentilla Tormentilla* Schrk.).  
 Суrowецъ, см. Жабникъ пашенный (*Filago arvensis* L.).  
 Сурочьи ягоды, см. Жминда лозная (*Blitum virgatum* L.).  
 Сурѣпа, см. Брюква (*Brassica Napus* L.).  
 Сурѣпа, см. Свербига восточная (*Bunias orientalis* L.).  
 Сурѣпа, см. Горчица дикая (*Sinapsis arvensis* L.).  
 Сурѣпа, см. Желтушникъ левкойный (*Erysimum cheiranthoides* L.).  
 Сурѣпа, см. Рѣдка дикая (*Raphanus Raphanistrum* L.).  
 Сурѣпица, см. Желтоцвѣтъ пахучій (*Barbarea vulgaris* R.Br.).  
 Сурѣпица, см. Брюква (*Brassica Napus* L.).  
 Сурѣпица, см. Свербига восточная (*Bunias orientalis* L.).  
 Сурѣпица, см. Желтушникъ левкойный (*Erysimum cheiranthoides* L.).  
 Сурѣпица, см. Рѣдка дикая (*Raphanus Raphanistrum* L.).  
 Сурѣпица, см. Горчица дикая (*Sinapsis arvensis* L.).  
 Сурѣпица (*Brassica Rapa campestris* L.). Brassica, Горчица лубеньска (Малор.), Капустка, Кольза, Песика, Рапсъ, Рапсъ яровой, Рипакъ, Рѣповникъ, Рипій, Рыжій, Свирѣпа. Однолѣтнее травянистое растение изъ семейства «крестоцвѣтныхъ» (*Cruciferae* Juss.), распространенное почти во всей Европѣ и почти во всей Россіи. Выш. 7—14 вершк. Корень тонкій; нижніе листья лировидные, покрытые жесткими волосками, верхніе—овальные, заостренные, стебле-объемлюще. Кисти во время распусканія цвѣтовъ сжатые, плоскія, причѣмъ вполне раскрывшіеся цвѣты выступаютъ надъ цвѣточными почками. Цвѣты золотисто-желтые, не очень крупныя. Чашечка 4-хлестная; лепестковъ 4; тычинокъ—6. Плодъ—стручечекъ. Встрѣчается въ яровыхъ посѣвахъ, какъ сорная трава. Цвѣтетъ лѣтомъ. Воздѣлывается въ нѣсколькихъ разновидностяхъ ради сѣмянъ, изъ которыхъ добывается рапсовое, или кользовое масло. Различаютъ нѣсколько разновидностей сурѣпицы: 1) Сурѣпица яровая, или рѣпакъ—однолѣтняя трава съ тонкимъ корнемъ, нижніе листья сѣро-зеленыя; самое распространенное въ Рос-

сн масляное растеніе. 2) Сурьпица озимая—отличается дву-  
лѣтнимъ корнемъ, нижними листьями чисто зеленаго цвѣта,  
болѣе длинными стручками и болѣе крупными сѣменами. Та и  
другая разводятся на сѣмена, изъ которыхъ выжимаютъ масло.  
3) Рѣпа огородная—разновидность съ толстымъ мясистымъ,  
округлымъ или удлинённымъ корнемъ; растеніе двулѣтнее.  
(Р и с. 292.)

**Сурьпица чесночная**, см. Чесночная трава (*Alliaria officina-  
lis* Andr.).

**Сурьпка**, см. Горчица дикая (*Sinapsis arvensis* L.).

**Сурьпка**, см. Гулявникъ лекарственный (*Sisymbrium officinale* L.).

**Сурьпка лѣсная**, см. Бородавникъ обыкновенный (*Lampsana  
communis* L.).

**Сусай**, см. Осотъ огородный (*Sonchus oleraceus* L.).

**Сусакъ**, см. Сусакъ зонтичный (*Butomus umbellatus* L.).

**Сусакъ зонтичный** (*Butomus umbellatus* L.). Фарм. названіе:  
*Juncus floridus*. Бобовникъ (Орл.), Бочарная трава (Вор.), Бѣло-  
головникъ (Астр.), Бобы волчья, Волчья трава, Красоцвѣтъ  
болотный, Куга гранатая (Сарат.), Оситнягъ (Малор.), Осотнякъ  
(Даль), ошиб. Ситовые бѣлое, Ситный цвѣтъ, Ситовецъ, Сусакъ,  
Сусакъ-трава, Сусокъ (Мог.), Сусатокъ, Хлѣбница (Ряз.), Хлѣб-  
никъ, Цыбуля жабья (Умань), Бехъ или Бесъ болотный,  
Рогатка (Екат.), Ванцушникъ (Сарат.), Мадлачикъ (Астр.). Мно-  
голѣтнее травянистое растеніе изъ семейства «частуховыхъ»  
(*Allismaceae* Juss.), распространенное почти во всей Европѣ и  
обыкновенное почти во всей Россіи. Корневище горизон-  
тальное, ползучее; листья прикорневые, линейные, 3-хъ-гран-  
ные; обоеполые розовые цвѣты собраны зонтикомъ на  
верхушкѣ безлистнаго, превышающаго листья, стебля. Около-  
цвѣтникъ состоятъ изъ 3-хъ меньшихъ (наружныхъ) и 3-хъ  
болѣе крупныхъ (внутреннихъ) листочковъ; тычинокъ 9, изъ  
которыхъ 6 попарно противъ наружныхъ листочковъ около-  
цвѣтника, прочія противъ внутреннихъ. Пестикъ состоятъ изъ  
6 плодолистиковъ, сросшихся при основаніи: плодъ состоятъ  
изъ листовокъ, раскрывающихся на внутренней сторонѣ.  
Растетъ на болотахъ и при берегахъ. Цвѣтетъ лѣтомъ. Листья  
идутъ на плетеніе корзины и рогожъ. Корни его въ Архангель-  
ской губерніи, а также тунгузами въ Сибири и киргизами  
около Гурьева употребляются въ пищу. Калмыки пекутъ въ  
золѣ свѣжіе и сухіе корни и ѣдятъ ихъ съ саломъ. Въ Молда-  
вии печеные корни тоже употребляютъ въ пищу. Послѣ сосны  
растеніе составляетъ важнѣйшую пищу якутовъ, у которыхъ,  
между прочимъ, существуетъ предразсудокъ, что сусакъ цвѣ-  
тетъ только тогда, когда его никто не видитъ, и что онъ можетъ  
перемѣнить мѣсто. (Т а б л. XLIII, фиг. 246.)

**Сусакъ трава**

**Сусатокъ**

**Сусокъ**

**Сусопъ**, см. Иссопъ лекарственный (*Hyssopus officinalis* L.).



- Суставникъ, см. Мыльнянка лекарственная (*Saponaria officinalis* L.).
- Суставница человѣчья, см. Герань луговая (*Geranium pratense* L.).
- Сутловка, см. Параличная трава (*Ajuga Chia Poir.*).
- Сухарка, см. Осокорь обыкновенный (*Populus nigra* L.).
- Суховая, см. Манжетка обыкновенная (*Alchemilla vulgaris* L.).
- Суховерхъ, см. Девясиль шершавый (*Inula hirta* L.).
- Суховершка, см. Желтуха (*Senecio Jacobea* L.).
- Суховершки, см. Живучка ползучая (*Ajuga reptans* L.).
- Суховершки, см. Девясиль шершавый (*Inula hirta* L.).
- Суховершки, см. Черноголовка обыкновенная (*Prunella vulgaris* L.).
- Суховершки, см. Шалфей лѣсной (*Salvia silvestris* L.).
- Суховершки, см. Клеверъ луговой (*Trifolium pratense* L.).
- Суховершокъ, см. Сушеница лѣсная (*Gnaphallum silvaticum* L.).
- Суховайка, см. Цминъ (*Helichrisum arenarium* Dc.).
- Сухое дерево, см. Жимолость обыкновенная (*Lonicera Xylosteum* L.).
- Сухо-зелье, см. Цминъ (*Helichrisum arenarium* Dc.).
- Сухозолотица, см. Кровохлебка лекарственная (*Sanguisorba officinalis* L.).
- Сухокрыла, см. Иванъ да Марья (*Melampyrum nemorosum* L.).
- Сухоломъ, см. Василекъ перистый (*Centaurea Scabiosa* L.).
- Сухоломъ, см. Вѣйникъ наземный (*Calamagrostis Epigeios* Roth.).
- Сухоломъ, см. Подмаренникъ желтый (*Gallium verum* L.).
- Сухоломъ, см. Сабельникъ болотный (*Comarum palustre* L.).
- Сухоломъ, см. Сушеница лѣсная (*Gnaphallum silvaticum* L.).
- Сухоломъ, см. Многоножка тройчатая (*Polypodium Dryopteris* L.).
- Сухолюбникъ, см. Бересклетъ европейскій (*Evonymus europaeus* L.).
- Сухопутъ, см. Кошачьи лапки (*Antennaria dioica* Gaertn.).
- Сухоробрикъ } см. Гулявникъ лекарственный (*Sisymbrium*  
Сухоробрица } *officinale* L.).
- Сухоросъ, см. Черноголовка обыкновенная (*Prunella vulgaris* L.).
- Сухосѣря, см. Лапчатка-узикъ (*Potentilla Tormentilla* Schrenk.).
- Суходникъ, см. Пастушья сумка (*Capsella Bursa pastoris* Moench.).
- Сухотный корень, см. Аройникъ крапчатый (*Arum maculatum* L.).
- Сухоцвѣтъ, см. Цминъ (*Helichrisum arenarium* Dc.).
- Сухощепка, см. Сосна обыкновенная (*Pinus silvestris* L.).
- Сухоягодникъ, см. Сабельникъ болотный (*Comarum palustre* L.).
- Сушеница, см. Кошачьи лапки (*Antennaria dioica* Gärtn.).
- Сушеница, см. Жабникъ пашенный (*Filago arvensis* L.).

- Сушеница, см.** Сушеница болотная (*Gnaphalium uliginosum* L.).
- Сушеница альпійская** (*Gnaphalium Leontopodium* Scop.). Эдельвейсъ. Многолѣтнее травянистое, до 5 вершковъ выш., изъ семейства «сложноцвѣтныхъ» (*Compositae* Adans.), распространенное на скалахъ и между камнями на Альпахъ. Все растение покрыто густымъ бѣлымъ войлокомъ. Листья линейно-ланцетные. Мелкія корзинки собраны на верхушкѣ стебля въ плотное зонтикообразное соцвѣтіе, окруженное нѣсколькими лучеобразно-расположенными бѣлыми, шестисто-войлочными листьями. Цвѣтеть съ іюля до сентября. Очень похожее и близкое растение встрѣчается на Алтаѣ, въ Забайкальѣ и на крайнемъ востокѣ Сибири, въ горахъ. (Табл. XLIII, фиг. 247.)
- Сушеница болотная** (*Gnaphalium uliginosum* L.). Волонки (Малор.), Горляка, Змѣевикъ (Даль), Заломъ, Жабная трава, Летучій огонь (Ряз.), Порѣзная трава (Нижег.), Пуховка (Твер.), Ростиляникъ (Екат.), Снѣжокъ (Твер.), Сушеница, Собачки (Тул.), Спрычъ (Вятск.), Толстуха (Вор.), Червивая трава (Кал.). Однолѣтнее травянистое бѣловато-шерстисто-войлочное простерто-вѣтвистое растение изъ семейства «сложноцвѣтныхъ» (*Compositae* Adans.), распространенное почти во всей Европѣ и во всей Россіи. Листья продолговато или линейно-ланцетные, при основаніи суженные, верхніе прижимаются къ стеблю; послѣдніе сжаты въ пучки и окаты листьями. Корзинки обоеполовыя, съ краевыми нитевидными женскими цвѣтками, расположенными въ нѣсколько рядовъ, и срединными обоеполовыми 5-тизубчатыми цвѣтами. Тычинокъ 5; завязь нижняя одногнѣздная, съ столбикомъ, несущимъ 2-хразъ вѣльное рыльце. Плодъ — продолговатая сѣмяна съ хохолкомъ. Цвѣтеть лѣтомъ и осенью. Растетъ на влажныхъ мѣстахъ, въ канавахъ и при берегахъ.
- Сушеница лѣсная** (*Gnaphalium silvaticum* L.). Везмертникъ, полевой, Богородицкая трава (Кал.), Бубенчики (Новг.), Бѣлый быльникъ (Тв.), Бѣликъ пустошный (Вят.), Вѣлена (Волог.), Золотуха (Вятск.), Каминъ (Олон.), Огневка (Пск.), Одуванчики (Вил.), Пуховикъ (Волог.), Полынь дикая (Нижег.), Суховейшокъ (Кіев.), Сухомъ (Костр.), Шатунъ (Новг.), Цмѣнь (т. е., Тминъ) лѣсной. Многолѣтнее травянистое растение изъ семейства «сложноцвѣтныхъ» (*Compositae* Adans.), распространенное въ сѣверной и средней Европѣ, въ сѣверной и средней Россіи, на Кавказѣ и въ Сибири. Стебель прямостоячій, простой, бѣловойлочный, выш. 7—9 вершк. Прикорневые листья длинно-черешковые, ланцетовидные, стеблевые — почти линейные, къ верхушкѣ стебля постепенно уменьшающіеся, на нижней поверхности, а иногда и на верхней, шерстистые. Мелкія цилиндрическія желтоватыя корзинки сидятъ поодиночкѣ или пучками въ пазухахъ верхнихъ листьевъ и все вмѣстѣ образуютъ колосообразное соцвѣтіе. Корзинки обоеполовыя, съ краевыми нитевидными женскими, расположенными въ нѣсколько рядовъ, и срединными обоеполовыми 5-тизубчатыми

цвѣтами. Тычинокъ 5. Завязь нижняя одногнѣздная, съ однимъ столбикомъ. Рыльце 2-храздѣльное. Плодь—смянка съ хохолкомъ. Цвѣтъ лѣтомъ. Растетъ въ лѣсахъ. (Рис. 213.)

**Сущенникъ**, см. Анстникъ цикутный (*Erodium cicutarium* L.).

**Сциляха**, см. Вероника лекарственная (*Veronica officinalis* L.).

**Сциха** } см. Ерникъ обыкновенный (*Empetrum nigrum* L.)

**Сцыха** }  
**Счадливая травка**, см. Люцерна серповидная (*Medicago falcata* L.).

**Счець кобылій**, см. Щавель конскій, или домашней (*Rumex domesticus* L.).

**Счирица**, см. Амарантъ колосистый (*Amaranthus retroflexus* L.).

**Счиствокъ**, см. Чистецъ прямой (*Stachys recta* L.).

**Сумашечникъ**, см. Хлопушка (*Silene inflata* Smith.).

**Сыворотець** } см. Подмаренникъ желтый (*Gallium*  
**Сывороточная трава** } *verum* L.).

**Сырикикука**, см. Ирга обыкновенная (*Amelanchier vulgaris* Moench.).

**Сырое зелье**, см. Донникъ голубой (*Melilotus coerulea* Lam.).

**Сытовникъ**, см. Суть бурая (*Cyperus fuscus* L.).

**Суть**, см. Циперусъ съдобный (*Cyperus esculentus* L.)

**Суть**, см. Суть бурая (*Cyperus fuscus* L.).

**Суть бурая** (*Cyperus fuscus* L.). Осѣтякъ (Малор.), Суть, Сытовникъ. Однолѣтнее травянистое растение изъ семейства «сытовниковыхъ» (*Cyperaceae* Juss.), распространенное въ средней и южной Европѣ, въ западной, средней и южной Россіи, въ Сибири и Туркестанѣ. Стебель остро-трехгранный, выши. 3—9 вершк., съ плоскими линейными листьями. Ланцето-видные плоскіе колоски собраны на верхушкѣ стебля пучками; при основаніи соцветіе окружено оберткой изъ 2—3 зеленыхъ листьевъ неравной длины. Въ составъ каждого колоска входитъ нѣсколько темно-бурыхъ пленокъ, расположенныхъ въ 2 ряда съ зеленою полоскою на спинкѣ, прикрывающихъ другъ друга на подобіе черепицы и заключающихъ въ пазухѣ по одному цвѣтку. Околоцвѣтника нѣтъ. Тычинокъ 2; завязь одногнѣздная, съ однимъ столбикомъ и 3-мя нитевидными рыльцами. Плодь — орѣшекъ. Цвѣтетъ во второй половинѣ лѣта. Растетъ на сырыхъ песчаныхъ мѣстахъ и болотистыхъ лугахъ. (Рис. 294.)

**Суть длинная** (*Cyperus longus* L.). Многолѣтнее травянистое растение изъ семейства «сытовниковыхъ» (*Cyperaceae* Juss.), распространенное въ средней и южной Европѣ, въ юго-восточной Россіи и на Кавказѣ. Стебель выши. до 14 вершковъ, съ линейными листьями. Колоски линейные, сжатые съ боковъ, острые, ржавчинно-бурые, длиною до 1 см., расположены рыхлой, зонтикообразной метелкой, которая при основаніи окружена оберткой изъ очень длинныхъ листьевъ. Въ составъ каждого колоска входитъ нѣсколько пленокъ, расположенныхъ на стержнѣ въ 2 ряда и несущихъ въ пазухѣ по цвѣтку. Около-

цвѣтника нѣтъ. Тычинокъ 2; завязь одногнѣздная, съ однимъ столбикомъ и 3-мя нитевидными рыльцами. Плодь—остро-трехгранный орѣшекъ. Цвѣтетъ во второй половинѣ лѣта. Растетъ на болотистыхъ мѣстахъ.

**Сыть желтоватая** (*Cyperus flavescens* L.). Однолѣтняя травка изъ семейства «сытовниковыхъ» (*Cyperaceae* Juss.), распространенная въ средней и южной Россіи, въ Сибири и Туркестанѣ, съ тупо-трехграннымъ стеблемъ и желтоватыми колосками. Весьма походить на сыть бурую (опис. см. выше). Тычинокъ 3; рылецъ 2. Произрастаетъ на торфяныхъ болотахъ, на влажныхъ мѣстахъ. (Рис. 295.)

**Сычужникъ**, см. Подмаренникъ желтый (*Galium verum* L.).

**Сѣвень**, см. Тимофеевка (*Phleum pratense* L.).

**Сѣдачъ** } см. Иосконики конопляный (*Eupatorium cannabinum* L.).

**Сѣдашъ** }

**Сѣдличка**, см. Частуха обыкновенная (*Alisma Plantago* L.).

**Сѣдунъ**, см. Икотникъ сѣро-зеленый (*Berteroa incana* DC.).

**Сѣдунъ**, см. Бѣлоусъ обыкновенный (*Nardus stricta* L.).

**Сѣкирки**, см. Васильки рогаые (*Delphinium Consolida* L.).

**Сѣмянникъ**, см. Соколий перелетъ (*Gentiana cruciata* L.).

**Сѣно верблюжье**, см. Золыникъ калинный (*Salsola Kali* L.).

**Сѣно шведское**, см. Люцерна серповидная (*Medicago falcata* L.).

**Сѣнокосяка**, см. Погребомъ обыкновенный (*Rhinanthus Crista Galli* L.).

**Сѣрики**, см. Пастушья сумка (*Capsella Bursa pastoris* L.).

**Сѣрое зелье**, см. Чистотѣль большой (*Chelidonium majus* L.).

**Сѣрое зелье**, см. Донникъ голубой (*Melilotus coerulea* Lam.).

**Сѣрое зелье**, см. Земляные орѣшки (*Silene Filipendula* L.).

**Сѣрое зелье**, см. Клеверъ бѣлый, ползучій (*Trifolium repens* L.).

**Сѣрозелье**, см. Цминъ (*Helichrisum aenarium* DC.).

**Сѣрозелье**, см. Донникъ голубой (*Melilotus coerulea* Lam.).

**Сѣроцвѣтъ**, см. Цминъ (*Helichrisum arenarium* DC.).

**Сѣуха** } см. Тимофеевка (*Phleum pratense* L.).

**Сѣянецъ** }

**Сяпа**, см. Лукъ обыкновенный, или огородный (*Allium Cera* L.).

## Т.

**Табакъ лѣсная**, см. Золотая розга (*Solidago Virgaurea* L.).

**Табакъ**, см. Табакъ настоящий (*Nicotiana Tabacum* L.).

**Табакъ америка скій** } см. Табакъ настоящий (*Nicotiana*

**Табакъ виргинскій** } *Tabacum* L.).

**Табакъ венгерскій**, см. Махорка (*Nicotiana rustica* L.).

**Табакъ вѣдушкинъ**, см. Дождевикъ шиноватый (*Lycoperdon gemmatum* L.).

**Табакъ лѣсной**, см. Арника горная (*Arnica montana* L.).

**Табакъ лѣсной**, см. Сивецъ луговой (*Scabiosa succisa* L.).



**Табакъ настоящій** (*Nicotiana Tabacum* L.). Фармацевтическое названіе *Tabacum*, s. *Niosciamus peruvianus*, s. *Nicotiana virginiana* (Folia et Herba). Аме иканскій, виргинскій табакъ. Однолѣтнее травянистое растеніе изъ семейства «пасленовыхъ» (*Solanaceae* Juss.), родомъ изъ тропической Америки. Стебель выш. 1½ арш. до 1 сажени. Листья продолговато-ланцетные, длинно-заостренные, нижніе—низбѣгающіе на стебель. Розовыя цвѣты собраны на концѣ стебля раскидистой метелкой; чашечка 5-тилопастная съ 3-хугельными ланцетными зубцами; вѣничикъ в-ропчатый, съ расширенною кверху трубкой и съ 5-ю острыми зубцами. Тычинокъ 5; завязь верхняя 2-хгнѣздная, съ 1 столбикомъ и съ шпильнымъ рыльцемъ. Плодъ—2-хгнѣздная коробочка, раскрывающаяся створками. Цвѣтетъ въ юлѣ и августѣ. Разводится во многихъ теплыхъ странахъ и на югѣ Россіи. Обладаетъ наркотическими свойствами, употребляется для куренія.

**МЕДИЦИНСКОЕ УПОТРЕБЛЕНІЕ.** Табакъ содержитъ въ себѣ сильный ядъ никотинъ. Никотинъ очень быстро мѣняется на воздухѣ, непостояненъ по составу, а также и по дѣйствію на организмъ, потому врачами никогда не выписывается. Въ прежнее время его рекомендовали отъ заворота кишокъ ввидѣ клистировъ и съ столбняка, также его считали противоядіемъ стрихнину, но, при дальнѣйшемъ изученіи его дѣйствія, врачи убѣдились въ его полной непригодности.

Первыхъ курящихъ людей видѣлъ Христофоръ Колумбъ. Высадившись на Кубу въ 1492 году, онъ нашъ тамъ туземцевъ, курящихъ сигары. Гернанецъ де-Толедо перенесъ этотъ обычай въ Испанію и Португалію. Въ Англіи куреніе вошло въ моду съ 1566 г., у насъ въ Россіи—во время царствованія Петра Великаго.

Содержащійся въ табакѣ никотинъ очень ядовитъ; ядовитость его доказана опытами на людяхъ и животныхъ; по своимъ силѣ онъ ядъ всего больше подходитъ къ яду синильной кислоты. Докторъ Рейль, а послѣ него Джоржъ и Генрихъ, испытывали дѣйствіе никотина на самихъ себѣ. Они принимали 0,018—0,04 (¼ грана до ¼ гр.) никотина. Первымъ ощущеніемъ было чувство жжения въ рту и паранатія въ горлѣ, съ успешнымъ отдѣленіемъ слюны. Начиная отъ желудка, чувство теплоты распространилось на грудь и голову и доходило до концевъ пальцевъ рукъ и ногъ. Затѣмъ наступали явленія возбужденія, головная боль, головокруженіе, неясность сознанія и зрѣнія, слѣпоглазныя и глухота. Дыханіе учащалось, появлялось чувство стѣсненія въ горлѣ и сухость. Вслѣдъ за возбужденіемъ наступали снова явленія общей слабости, холодали сначала концы рукъ и ногъ, затѣмъ охлажденіе шло дальше, и человѣкъ терялъ сознаніе и впадалъ въ глубокій обморокъ. У одного изъ изслѣдователей появились, кромѣ того, судороги конечностей и дыхательныхъ мышцъ. Общая слабость, неправильное, прерывистое дыханіе, потеря аппетита были еще и на слѣдующій день послѣ опыта. Потребовались три дни для того, чтобы явленія отравленія прошли. Совершенно

такова-же картина отравленія табакомъ. — употребляется-ли онъ для куренія, принимается-ли внутрь ввидѣ настоя, или же вводится въ прямую кишку въ клистирѣ; потому-то слѣдуетъ считать табакъ вреднымъ растеніемъ, не употреблять его внутрь и по возможности стараться не пріучаться курить. Особенно вредно куреніе отзывается на молодыхъ, еще не окрѣпшихъ организмахъ. У нихъ небольшое количество выкуреннаго табака можетъ вызывать всю вышеописанную картину отравленія.

При появленіи у курищаго вышеописанной картины отравленія слѣдуетъ и медленно послать за врачомъ, самимъ-же въ это время стараться поддерживать силы больного, растирать его сухими шеткаш, поить чернымъ кофе, поставить клистиръ изъ кофе, при бредѣ и горячей головѣ положить ледъ на голову, облить голову холодою водою, на желудокъ и нѣры положить горчичники, къ ногамъ грѣлки.

Въ гомеопатіи табакъ употребляется противъ острыхъ болей въ суставахъ, при дрожаніи членовъ, отъ безысходнаго сна, чувства разбитости, грусти, неохоты къ труду, тяжести въ головѣ, головокруженіи, отъ различныхъ головныхъ болей, шума въ ушахъ, сухого кашля, каменнаго болѣзни и отъ чувства сдавленія въ груди. Даютъ 1—2 капли 1-го, 2-го, 3-го разведенія и повторяютъ пріемы по нѣсколько разъ въ день.

Табакъ сусѣдкинъ, см. Дождевикъ шиловатый (*Lycoperdon gemmatum* L.).

Табакъ турецкій, см. Махорка (*Nicotiana rustica* L.).

Таблакъ, см. Поремель обыкновен. (*Rhinanthus Crista Galli* L.).

Табачникъ } см. Дождевикъ шиловатый (*Lycoperdon gemmatum* L.).

Табачный грибокъ }  
Табл къ, см. Тюльпанъ степной, или садовый (*Tulipa gesneriana* L.).

Таблакъ наржиный, см. Тюльпанъ степной, или садовый (*Tulipa gesneriana* L.).

Таблакъ малый, см. Гусятникъ желтый (*Gagea lutea* Schult.).

Таблакъ нашинскій, см. Тюльпанъ степной, или садовый (*Tulipa gesneriana* L.).

Тавлинка чертова, см. Дождевикъ шиловатый (*Lycoperdon gemmatum* L.).

Таволга, см. Медуница (*Spiraea ulmaria* L.).

Таволга, см. Таволга дубраволетная (*Spiraea chamaedryfolia* L.).

Таволга алтайская (*Spiraea laevigata* L.). Ирга, Кизильникъ, Таволжка, Шампольное дерево, Шампольникъ, Рустаникъ изъ семейства «розовѣдныхъ» (*Rasaceae* Hook et Benth.), встрѣчается въ садахъ. Отличается отъ «таволги средней» (опис. см. ниже) продолговатыми, книзу болѣе узкими, голыми, цѣльно-крайними листьями, которые употребляются вмѣсто чая.

Таволга болотная, см. Медуница (*Spiraea ulmaria* L.).

Таволга дуболетная, см. Таволга дубраволетная (*Spiraea chamaedryfolia* L.).

**Таволга дубраволистная** (*Spiraea chamaedryfolia* L.). Березка степная, И. га, Волжанка (Тул.), Таволга, Таволга лесная, дуолистная, степная, Таволожникъ луговатый, Таволжанникъ (Вор.), Таволжникъ. Сибирекъ и кустарникъ изъ семейства «розоцвѣтныхъ» (*Rosaceae* Hook et Benth.), часто встрѣчающійся въ садахъ. Отличается отъ «таволги средней» (опис. см. ниже) угловатыми вѣтвями и эллиптическими надрѣзано-губчатыми листьями.

**Таволга земляные орѣхи**, см. Земляные орѣшки (*Spiraea Filipendula* L.).

**Таволга илемная**, см. Медунница (*Spiraea ulmaria* L.).

**Таволга иволистная** (*Spiraea salicifolia* L.). Таволга-трава, Чай дикій. Кустарникъ изъ семейства «розоцвѣтныхъ» (*Rosaceae* Hook et Benth.), распространенный въ Австраліи, Польшѣ, встрѣчающійся въ западныхъ и юго-западныхъ губерніяхъ, распространенный во всей Сибири, Японіи и Сѣв. Америкѣ, средней величины, съ голыми стеблями и съ голыми линейчатыми пальчатыми листьями, съ выдающимися на нижней сторонѣ жилками. Розовые обоеполовые мелкіе цвѣты въ густой, удлинненной, продолговатой метелкѣ на верхушкѣ стебля и вѣвей. Чашечка остающаяся, 5-тираздѣльная; лепестковъ 5; тычинокъ много. Пестикъ состоитъ изъ 5 плодолистиковъ. Плодъ состоитъ изъ 5 кожистыхъ листовокъ, верхушка которыхъ, вмѣстѣ съ столбикомъ, отогнута въ сторону. Цвѣтетъ лѣтомъ. Растетъ между кустарниками. Разводится въ садахъ.

**Таволга калинолистная** (*Spiraea opulifolia* L.). Высокій кустарникъ изъ семейства «розоцвѣтныхъ» (*Rosaceae* Hook et Benth.), родомъ изъ Сѣверной Америки, съ голыми вѣтвями и съ голыми 3-хлопастными, округло-яйц. видомъ, при основаніи клиновидными листьями, двояко-го-одночато-губчатыми и блѣдно-зелеными снизу листьями. Цвѣты въ щиткахъ на концахъ олиственныхъ вѣтвей. Чашечка 5-тираздѣльная, блѣдно-войлочная, съ вверхъ стоящими при плодахъ долями, приросшая къ цвѣтоложу. Вѣничикъ 5-лепестный; тычинокъ много. Пестикъ состоитъ изъ 5 вздутыхъ плодолистиковъ, сросшихся при основаніи своими ножками и супротивныхъ лепесткамъ. Плодъ состоитъ изъ 5 кожистыхъ, гладкихъ листовокъ, верхушка которыхъ, вмѣстѣ съ столбикомъ, отогнута въ сторону; онѣ раскрываются съ внутренней стороны и содержатъ нѣсколько блестящихъ съ хрящеватой кожурой семянъ. Цвѣтетъ въ іюнь. Разводитъ я въ садахъ.

**Таволга лесная**, см. Таволга дубраволистная (*Spiraea chamaedryfolia* L.).

**Таволга рябинолистная** (*Spiraea sorbifolia* L.). Бѣлизна (Полт.), Таволожникъ, Таволжанникъ пустой, Угрюмъ. Кустарникъ изъ семейства «розоцвѣтныхъ» (*Rosaceae* Hook et Benth.), родомъ изъ Сибири и Японіи. Вѣтви и листья немногочисленные; листья негачно-перистые, съ продолговато-ланцетными, заостренными, двояко-пальчатыми листочками. Бѣлые цвѣты въ

густой пирамидальной метелкѣ. Чашечка 5-тизубчатая. остающаяся, съ отвороченнымъ припладахъ зубчиками. Лепестковъ 5; тычинокъ много. Пестикъ изъ 5 сросшихся нижнею частью между собой плодолистиковъ. Плодь состоитъ изъ 5 продолговато-цилиндрическихъ, вверхъ-стоящихъ листовокъ съ верхушечнымъ и отогнутымъ въ сторону столбикомъ. Цвѣтъ лѣтомъ. Разводится въ садахъ.

**Таволга средняя** (*Spiraea media* L.). Кустарникъ вып. 1½ арш. до 1 сажени, изъ семейства «розоцвѣтныхъ» (*Rosaceae* Hook et Benth.), встречающійся въ Венгрии и на Балканскомъ полуостровѣ, въ юго-западной и сѣверо-восточной Россіи, въ Сибіри и Туркестанѣ. Вѣтви круглыя, гладкія. Листья эллиптическіе или ланцетные, на плодоносныхъ вѣтвяхъ цѣльно-крайніе, на безплодныхъ-же—съ нѣсколькими крупными зубцами на верхушкѣ. Бѣлые мелкіе цвѣты въ щиткахъ. Чашечка 5-тизубчатая, остающаяся при плодахъ, съ отвороченными зубцами. Лепестковъ 5. Пестикъ состоитъ изъ 5 не сросшихся плодолистиковъ. Плодь—сложная листовка. Листовки на внутренней сторонѣ при верхушкѣ съ бугромъ. Столбикъ выходитъ изъ ихъ сныки и наклоненъ въ сторону. Цвѣтъ въ апрѣлѣ и началъ мая. Часто разводится въ садахъ.

**Таволга степная**, см. Таволга дубраволистная (*Spiraea chamaedryfolia* L.).

**Таволга-травя**, см. Таволга пшенилистная (*Spiraea salicifolia* L.).

**Таволжанникъ**, см. Таволга дубраволистная (*Spiraea chamaedryfolia* L.).

**Таволожка**, см. Таволга алтайская (*Spiraea laevigata* L.).

**Таволжникъ**, см. Медунница (*Spiraea ulmaria* L.).

**Таволожникъ**, см. Таволга рябинолистная (*Spiraea sorbifolia* L.).

**Таволожникъ луговатый**, см. Таволга дубраволистная (*Spiraea chamaedryfolia* L.).

**Таволожникъ пустой**, см. Таволга рябинолистная (*Spiraea sorbifolia* L.).

**Тавунъ**, см. Вахта трилистная (*Menyanthes trifoliata* L.).

**Тагальникъ**, см. Бѣлоталь, или миндальная (*Salix amygdalina* L.).

**Тагамагана**, см. Тополь душистый (*Populus balsamifera* L.).

**Тагуа-пальма** (*Phytelephas macrocarpa* R. P.). Дерево, весьма похожее на панданусъ, отъ котораго отличается п ристо-надрѣзанными листьями. Произрастаетъ въ центральной части южной Америки по бассейну рѣки св. Магдалины, гдѣ въ горахъ на высотѣ 1000 метровъ надъ уровнемъ моря образуетъ даже небольшіе лѣса. Вершину дерева укушаютъ кроны длинныхъ листьевъ. Тяжелые плоды, величиною съ человѣческую голову, заключаютъ внутри 6—9 зеренъ, извѣстныхъ въ торговлѣ уже съ 1825 года по ихъ названію «слоновой кости», «о'фховъ тагуа». Бѣловое вещество этихъ зеренъ такъ называемая «растительная слоновая кость», вначалѣ молочнообразное на



видъ и очень прѣтвое на вкусъ, употребляется въ пищу; съ теченіемъ времени оно твердеетъ и въ концѣ концовъ превращается въ твердую бѣлую массу, имѣющую большое сходство съ слоновою костью. Въ настоящее время растительная слонобая кость въ большомъ количествѣ вывозится въ Сѣверную Америку, Англію, Германію и употребляется въ токарномъ дѣлѣ на выделку изъ нея пуговицъ и всевозможныхъ бездѣлушекъ. Мясистая внутренность плодовъ также поступаетъ въ продажу и употребляется на приготовленіе известнаго напитка «Тагуа», который особенно цѣнится жителями Новой Гренады.

**Тайникъ овальный** (*Listera ovata* R. Br.). Фармацевтическое названіе: *Bifolium*, *Ophrys bifolia* (Herba). Вѣрнее рѣчной (Вятск.), Гайникъ, Двулистникъ, Дремликъ (Могил.), Дѣтская трава, Зозулины слезки, Зозулины слези (Малор.), Зозулины ручишкѣ, Зозулины рушнички, Младенчина, Скрупуленъ (Вятск.), Стулигузъ (Малор.), Ночная тѣнь (Гродн.), Чемерица лѣсная. Многолѣтнее травянистое растеніе изъ семейства «ятрышниковыхъ» (*Orchideae* Juss.), распространенное въ Европѣ, исключая крайняго сѣвера, въ сѣверной, средней и юго-западной Россіи, въ Крыму, на Кавказѣ и въ Сибири. Корневище горизонтальное; стебель выш. 7—13 вершк., съ двумя почти супротивными овальными буроватыми лѣсьями. Цвѣточная кисть длинная, тонкая, прямостоящая. Околѣпѣтникъ состоитъ изъ 3 внутреннихъ и 3 наружныхъ зеленовато-желтыхъ лепестковъ, изъ которыхъ одинъ внутренній, отличающійся своей формой, образуетъ длинную, узкую губу, раздѣленную на концѣ на 2 линейныя расходящіяся продолговатыя тупыя лопасти. Тычинокъ одна, сросшаяся своей нитью съ столбикомъ завязи въ колоску (гиностелій); пыльникъ—сидящій на гиностеліи. Завязь нижняя одногнѣзная, скрученная; рыльце находится на гиностеліи подъ пыльникомъ. Плодъ—вверхъ стоячая коробочка. Цвѣтетъ въ май и въ іюнь. Растетъ въ лѣсахъ и между кустарниками.

**МЕДИЦИНСКОЕ УПОТРЕБЛЕНІЕ** тайника овальнаго известно только въ народѣ. Отваръ растенія употребляется для леченія дѣтей отъ грижи и кладется въ ванны для обмыванія различныхъ сыпей.

**Тайнишная трава**, см. Копытень сѣропейскій (*Asarum europaeum* L.).

**Талъ**, см. Ива козья (*Salix caprea* L.).

**Тада**, см. Черноталъ (*Salix pentandra* L.).

**Талабанъ**, см. Земляные орѣшки (*Spiraea Filipendula* L.).

**Талаганныкъ**, см. Толокнянка обыкновенная (*Alectosaphylos officinalis* Moench.).

**Талаженникъ** } см. Лоза (*Salix viminalis* L.).

**Талажчанникъ** }

**Талина**, см. Ива бѣлая (*Salix alba* L.).

**Таловое дерево**, см. Ива бѣлая (*Salix alba* L.).

**Таловый кустъ**, см. Ива козья (*Salix caprea* L.).

- Талъ, см. Ива бѣлая (*Salix alba* L.).  
 Талъ, см. Ива козья (*Salix capraea* L.).  
 Тальникъ, см. Ива бѣлая (*Salix alba* L.).  
 Тальникъ, см. Бѣлогаль (*Salix amygdalina* L.).  
 Тальникъ, см. Черногаль (*Salix pentandra* L.).  
 Тальникъ, см. Желтолозникъ (*Salix purpurea* L.).  
 Тальникъ, см. Ива ушастая (*Salix aurita* L.).  
 Тальникъ бѣлый, см. Лоза (*Salix viminalis* L.).  
 Тальникъ лоскный, см. Бѣлогаль, ива миндальная (*Salix amygdalina* L.).  
 Тальникъ травяной, см. Ива ползучая (*Salix repens* L.).  
 Танцерникъ, см. Просвирникъ л. свой (*Malva silvestris* L.).  
 Тапиокка, см. Кассава (*Manihot utilisissima* Pohl.).  
 Таракуцка, см. Ханьки (*Cucurbita ovifera* L.).  
 Тарамишекъ, см. Переступень бѣлый (*Bryonia alba* L.).  
 Тарапуньки, см. Ханьки (*Cucurbita ovifera* L.).  
 Таргунъ, см. Эстрагонъ (*Artemisia Dracuncul* L.).  
 Татаринъ, см. Чертополохъ курчавый (*Carduus crispus* L.).  
 Татаринъ, см. Чертополохъ пониклый (*Carduus nutans* L.).  
 Татаринъ, см. Чертополохъ разнолиственный (*Cirsium heterophyllum* All.).  
 Татаринъ, см. Остро-пестрая трава (*Silybum Marianum* Gaertn.).  
 Т. тарка, см. Чертополохъ ланцетоліственный (*Cirsium lanceolatum* Scop.).  
 Татарки, см. Татарникъ колючій (*Onopordon Acanthium* L.).  
 Татарникъ, см. Чертополохъ разнолиственный (*Cirsium heterophyllum* L.).  
 Татарникъ, см. Чертополохъ ланцетоліственный (*Cirsium lanceolatum* Scop.).  
 Татарникъ, см. Синеголовникъ равнинный (*Eryngium campestre* L.).  
 Татарникъ, см. Татарникъ колючій (*Onopordon Acanthium* L.).  
 Татарникъ бѣлый, см. Мордовникъ (*Echinops sphaerocephalus* L.).  
 Татарникъ колючій (*Onopordon Acanthium* L.). Фармацевтическое названіе *Carduus tomentosus*, v. *Spina alba*, v. *Onopordon* (*Herba recens*). Будякъ (Екат.). Жабра трава, Осотъ повалотный, Татарникъ, Татарка. Чертополохъ. Двудѣтное травянистое растение изъ семейства «сложноцвѣтныхъ» (*Compositae* Adans.), распространенное въ средней и южной Европѣ, въ средней и южной Россіи, на Алтаѣ и въ Туркестанѣ, выш. до 1½ арш. и выше. Листья продолговатые, выемчато-зубчатые или перистоланцетные, волнистые, очень колючіе, пухлякисто-шерстистые; низбогающие края листьевъ образуютъ на стеблѣ широкія колючія колыла. Корзинки пурпуровыхъ цвѣтовъ крупныя шаровидныя, обычно сѣно одиночныя; листья обертки оттопыренны, колючіе. Всѣ цвѣты трубчатые, однополые. Тычинокъ 5; завязь нижняя одногнѣдная, односѣмянная, съ столбикомъ, угловато-утолщеннымъ при основаніи двухраздѣль-

наго рыльца и снабженнымъ въ этомъ мѣстѣ кольцомъ волоскоу. Плодъ—сѣмянка съ хохолкомъ. Цвѣтъ во второй половинѣ лѣта. Растетъ на поляхъ, на дорогахъ и сорныхъ мѣстахъ. (Таблица XLIV, фиг. 251.)

**МЕДИЦИНСКОЕ УПОТРЕБЛЕНІЕ** извѣстно только въ народѣ. Въ отварѣ травы купаютъ дѣтей и стариковъ отъ грыжи. Изъ сѣмянъ можетъ получаться масло.

Татарское зелье, см. Аиръ обыкновенный (*Acorus calamus* L.)  
Ташка-зелье } см. Пастушья сумка (*Capsella Bursa pastoris*)  
Ташка-трава } Moench.).

Твердыкъ, см. Герань кроваво-красная (*Geranium sanguineum* L.).

Твердыкъ, см. Плакунъ-трава (*Lythrum Salicaria* L.).

Твердыкъ, см. Дербенникъ прутняковый (*Lythrum virgatum* L.).

Твердыкъ, см. Вшивица болотная (*Pedicularis palustris* L.).

Твердынка, см. Плакунъ-трава (*Lythrum Salicaria* L.).

Творожовникъ, см. Вшивица болотная (*Pedicularis palustris* L.).

Тебека, см. Тыква кухонная (*Cucurbita maxima* Duch.).

Тебека, см. Кипарисъ (*Cupressus sempervirens* L.).

Текачъ, см. Просо настоящее (*Panicum miliaceum* L.).

Текунъ, см. Плаунъ булавистый (*Lycopodium clavatum* L.).

Тельчибухъ, см. Орѣхи рвотные (*Strychnos nux vomica* L.).

Телѣжникъ, см. Погremoкъ обыкновенный (*Rhinanthus Crista Galli* L.).

Темьянъ, см. Тминъ обыкновенный (*Carum Carvi* L.).

Тереза, см. Дрокъ красильный (*Genista tinctoria* L.).

Теремокъ, см. Одуванчикъ лекарственный (*Taraxacum Dens Leonis* Desf.).

Теренъ, см. Тернослива (*Prunus insititia* L.).

Теренъ, см. Тернъ (*Prunus spinosa* L.).

Тересъ, см. Крушина слабительная (*Rhamnus cathartica* L.).

Теріакъ полевой, см. Короставникъ полевой (*Scabiosa arvensis* L.).

Терлицъ, см. Вшивица хохлатая (*Pedicularis comosa* L.).

Терличъ, см. Соколій перелетъ (*Gentiana cruciata* L.).

Терментія, см. Лапчатка-узикъ (*Potentilla Tormentilla* Schrenk.).

Терникъ, см. Тернъ (*Prunus spinosa* L.).

Терновникъ, см. Облѣиха обыкновенная (*Hippophaë rhamnoides* L.).

Терновникъ, см. Жасминъ полевой (*Lycium barbarum* L.).

Терновникъ, см. Тернъ (*Prunus spinosa* L.).

Терновникъ, см. Тернослива (*Prunus insititia* L.).

Терновникъ дикій, см. Утесникъ обыкновенный (*Ulex europaeus* L.).

Терновникъ дикій, см. Падубъ обыкновенный (*Ilex aquifolium* L.).

Терновникъ песочный, см. Облѣиха обыкновенная (*Hippophaë rhamnoides* L.).

Терновые левашы, см. Тернъ (*Prunus spinosa* L.).

Тернослива (*Prunus insititia* L.). Алыча, Кулька (Кіев.), Слива

мелкоплодная, Тернъ (Малор.), и изм. Торнъ (Вор.), Тюрнъ, Терреъ. Терновникъ, Тернослива, Черносливъ французскій. Кустарникъ изъ семейства «розовцвѣтныхъ» (*Rosaceae* Hook et Benth.), распространенный въ южной Европѣ и Закавказьѣ, съ отстоящими, иногда колючими вѣтвями; молодые вѣтви бѣло-пушистыя; листья эллиптически-обратно-яйцевидные, пильчатые; на нижней сторонѣ, преимущественно вдоль жилокъ, пушистые; бѣлые цвѣтки простые, съ пушистыми цвѣтоножками. Чашечка 5-тираздѣльная; лепестковъ 5; многочисленныя тычинки съ невидными нитями прикрѣплены вмѣстѣ съ лепестками къ краю цвѣтоложа. Пестикъ простой съ длиннымъ столбикомъ и головчатымъ рыльцемъ. Плодъ—черновато-фиолетовая, желтая или зеленая мясисто-сочная шаровидная висцїя костянки. Цвѣтетъ въ апрѣлѣ. Разводится въ разныхъ сортахъ, иногда встрѣчается одичалымъ.

**Терносливъ, см. Тернъ** (*Prunus spinosa* L.).

**Терносливъ, см. Тернослива** (*Prunus institia* L.).

**Тернъ** (*Prunus spinosa* L.). Фармацевтическое названіе: *Acacia germanica s. nostralis* (Flor., Rad., Cort. et Fruct.). Бадлакъ (Сл. Ц.), Бодлакъ, Карайчъ (Пенз., Тамб.), Тернъ, Теренъ (Малорос.), Тирнъ, Терновникъ, Терникъ, и изм. Дерникъ, а плоды Деръ (Курск.), Торнъ (Урал.), Тюрнъ, Терносливъ, Терновые лаваны, Слива тернистая. Очень вѣтвистый колючій кустарникъ изъ семейства «миндалныхъ» (*Amygdalaceae*), выш. отъ 1 саж. и выше, распространенный почти по всей Европѣ, въ средней и южной Россіи. Листья эллиптическіе или продолговатые, пильчатые. Бѣлые одиночные цвѣты сидятъ на короткихъ голыхъ цвѣтоножкахъ. Чашечка 5-тилистная; 5-тилепестный вѣнчикъ и многочисленныя тычинки прикрѣплены къ краямъ вогнутаго цвѣтоложа. Завязь свободная, одногнѣздная. Плодъ—шаровидный, почти черныя, съ голузоватымъ налетомъ костянки, терпкій на вкусъ. Цвѣтетъ весной до появленія листьевъ. Растетъ въ степяхъ, на холмахъ, между кустарниками и въ лѣсахъ. Листья иногда подмѣшиваютъ въ чай. Плоды употребляются въ пищу, болѣею частью ввидѣ маринада; изъ нихъ также приготавливаютъ напитки; кромѣ того, плоды и корень идутъ на краску. (Рис. 296.)

**МЕДИЦИНСКОЕ УПОТРЕБЛЕНІЕ** растенія очень ограничено. Высушенные цвѣты, приготовленные ввидѣ отвара, дѣйствуютъ слегка слабительно, не вызывая боли.

**Тернъ, см. Тернослива** (*Prunus institia* L.).

**Тернъ, см. Утесникъ обыкновенный** (*Ulex europaeus* L.).

**Тернъ кислый, см. Барбарисъ обыкновен.** (*Berberis vulgaris* L.).

**Тернъ мышій, см. Метла** (*Ruscus aculeatus* L.).

**Тернъ свиной, см. Чертополохъ ланцетолистный** (*Cirsium lanceolatum* Scop.).

**Тернъ таловый, см. Облѣпиха обыкновенная** (*Hippophaë rhamnoides* L.).

**Тернъ ячменный китайскій, см. Жасминъ полевой** (*Lycium barbarum* L.).



Терпентинное дерево } см. Скипидарное дерево (*Pistacia Ter-*  
 Терпентинъ } *rebintus* L.).

Тетеревиный кустъ } см. Можжевельникъ обыкновенный  
 Тетеревиныя ягоды } (*Juniperus communis* L.).

Тиманъ }  
 Тиминъ } см. Тминъ обыкновенный (*Carum Carvi* L.).  
 Тимонъ }

Тимонъ, см. Укропъ обыкновенный (*Anethum graveolens* L.).

Тимонъ }  
 Тимонъ черный } см. Чернушка (*Nigella sativa* L.).

Тимофеева трава } см. Тимофеевка (*Phleum pratense* L.).  
 Тимофеевка }

Тимофе вка (*Phleum pratense* L.). Бжанка (Минск.), Запорная трава (Пет.), Зубная трава (Олон.), Колосъ (Моск.), Межевая трава (Могил.), Нивникъ (Пск.), Палочникъ (Волог., Вят., Костр., Влад.), Палевинокъ (Вят.), Пырей (Шиж., Екат.), Пырей столбоватый, Пыреечникъ (Моск.), Аржанецъ, Аржаница (Тамб.), Арженецъ, Арженецъ луговой, Арженикъ, Оржанецъ (Самар.), Роженецъ, Ржанецъ луговой, Ржанецъ (Малор.), Ржаникъ (Олон.), Рожникъ (Моск.), Рожь дикая, Рвзецъ, изм. Рожецъ (ул.), Сяненецъ (Арх., Волог.) и изм. Сѣуха (Вятск.), Сивунъ (Вятск.), Сѣвень, Стебъ луговой, Степъ, Тимофей, Тимофеева трава, Тимофеевка, Хабръ, Хебръ. Многолетнее травянистое растение изъ семейства «злаковыхъ» (*Gramineae* Juss.), распространенное почти во всей Европѣ, весьма обыкновенное въ Россіи. Стебель выш. 7—22½ в. Листья мягкіе, по краямъ шероховатые. Метелка колосовицная (султанъ), очень плотная и жесткая. Колоски, образующіе метелку, одноцвѣтные: двѣ нижнія чешуи колоска (створки) продолжены въ короткую ость. По этимъ двурогимъ колоскамъ можно легко отличить тимфеевку отъ лисохвоста, у котораго изъ каждаго колоска выступаютъ только одна ость, принадлежащая цвѣточной чешуѣ. Тычинокъ 3; завязь одногнѣздная, односѣмянная, съ двумя столбиками, несущими перистыя рыльца. Плодъ—зерновка. Разводится какъ хорошая кормовая трава, на глинистой или цѣсколько сырой почвѣ. (Рис. 297.)

**МЕДИЦИННОЕ УПОТРЕБЛЕНІЕ.** Корень травы въ Олонечкой губерніи кладется на больной зубъ.

Тимофей, см. Тимофеевка (*Phleum pratense* L.).

Тимьянка, см. Лилія водяная (*Nymphaea alba* L.).

Тимьянъ, см. Тминъ обыкновенный (*Carum Carvi* L.).

Тина, см. Сассапариль итальянская (*Smilax aspera* L.).

Тина на водѣ, см. Ряска маленькая (*Lemna minor* Schl.).

Тинъ, см. Сассапариль итальянская (*Smilax aspera* L.).

Тирза, см. Ковылъ волосистый (*Stipa capillata* L.).

Тирилячъ, см. Соколій перелетъ (*Gentiana cruciata* L.).

Тирличъ, см. Купена лекарственная (*Convallaria Polygonatum* L.).

Тирлиъ, см. Соколій перелетъ (*Gentiana cruciata* L.).

Тирличъ, см. Стародубка (*Gentiana Amarella* L.).

Тирличъ-трава, см. Стародубка (*Gentiana Amarella* L.).

Тирнъ, см. Тернъ (*Prunus spinosa* L.).

Тирса, см. Ковыль волосистый (*Stipa capillata* L.).

Тирса, см. Ковыль перистый (*Stipa pennata* L.).

Тиссовое дерево } см. Тиссъ обыкновенный (*Taxus baccata* L.).

Тиссъ }  
Тиссъ обыкновенный (*Taxus baccata* L.). Зеленица, Красное дерево, Неплючка, Неплюющее дерево, Непной дерево, Тиссъ, Тиссовое дерево. Вечно зеленый кустарникъ или дер во изъ семейства «тиссовыхъ» (*Taxineae* Rich.), съ очень густымъ шатромъ. Листья линейные, острые, сверху блестящiе, темно-зеленые, снизу желтовато-зеленые. Цвѣты мелкiе, двудомные; мужскiе почти шаровидные, пазушные. Женскiе цвѣтки состоятъ изъ одного яичка, сидящаго на концѣ очень короткой вѣточки, покрытой чешуйчатыми листьями. Зрѣлое съѣмъ заключено въ разросшемся мясистомъ присѣмянникѣ (кѣ (кровелькѣ) ярко-краснаго цвѣта. Произрастаетъ въ средней и южной Европѣ, въ Литвѣ, въ Прибалтiйскомъ краѣ, Приислѣянскихъ губернiяхъ, въ Крыму, на Кавказѣ и въ Сибири. Цвѣтетъ весной. Древесина тирса обыкновеннаго очень прочна и весьма дорога цѣнится въ токарномъ дѣлѣ и с. оларномъ производствѣ. (Рис. 298.)

**МЕДИЦИННОЕ УПОТРЕБЛЕНIЕ.** Для лечебныхъ цѣлей собираются листья растения въ лѣтнее время и высушиваются. Запахъ свежихъ листьевъ слабый и совершенно пропадаетъ при высушиванiи. Вкусъ непрiятный, горькiй. Сосавныя части растенiя: эфирное масло, экстрактивное горькое вещество, красящее вещество, сахаръ и соли; дѣйствующее вещество составляетъ алкалоидъ «таксинъ» (*Taxin*). Употребленiе этого растенiя въ медицинѣ крайне рѣдко. По своему дѣйствию на организмъ оно имѣетъ общее съ белладонной, а съѣдена его дѣйствовать, какъ дигиталинъ. Въ большомъ количествѣ онѣ дѣйствуютъ наркотически и вызываютъ рвоту, головокруженiе, расширенiе зрачковъ и конвульси. Въ Россii это растенiе врачами никогда не назначается. Въ Германiи изъ ягодъ приготовляютъ сиропъ, который считается полезнымъ отъ боли въ горлѣ и орынности.

Титунъ лѣсной, см. Арника горная (*Arnica montana* L.).

Тило вовче, см. Сабельникъ болотный (*Comarum palustre* L.).

Тиорнъ, см. Терноелива (*Prunus insititia* L.).

Тминъ, см. Тминъ обыкновенный (*Carum Carvi* L.).

Тминъ, см. Купырѣ лѣсной (*Anthriscus silvestris* Hoffm.)

Тми ть, см. Цминъ (*Helichrysum arenarium* DC.).

Тминъ, см. Вдренецъ обыкновенный (*Pimpinella Saxifraga* L.).

Тминъ бѣлый } см. Кошачья лапка (*Antennaria dioica* Gärtn.).

Тминъ красный }

Тминъ обыкновенный (*Carum Carvi* L.). Фармацевтическое названiе: *Carum s. Cuminum pratense*. Анисъ (въ бол. ч. Россii), Анисъ дикiй полъвой, Анисъ лѣвой (Тур.), Ганусъ, Гупьба, (Волг., Пет.), Гонеба (Олон.), Козловка (Нижег.), Королекъ (съ

польск.), Тминъ, Тмінъ, Тиманъ, Тиминъ, Тимонъ (Вят.), Темьянъ, Тимьянъ (Даль), Кмень, Хрѣновица (Полт.). Чернушка (Курск.). Двудѣтное травянистое растение изъ семейства «зонтичныхъ» (*Umbelliferae* Juss.), распространенное почти во всей Европѣ и въ большей части Россіи, съ веретенообразнымъ корнемъ и прямостоящимъ стеблемъ, выш. 7—14 вершковъ. Листья двояко или тройко-перистые, съ узколинейными долями; влагалища длинные. Сложные зонтики о 8—10 лучахъ безъ обертокъ. Цвѣты мелкие, блѣлые или красноватые. Чашечка о 5 зубчикахъ; лепестковъ и тычинокъ по 5; завязь нижняя 2-гнѣздная, на верхушкѣ несетъ желѣзистый дискъ, выделяющій сладкій сокъ; сѣмечковъ 2; плодъ продолговатый, р. снабженный по созрѣваніи на 2 плодика висѣющихъ на столбикахъ. Плодники съ 5-ю питевидными ребрами. Цвѣтетъ въ маѣ и іюнѣ. Всрѣчается на лугахъ и разводится въ большомъ количествѣ на поляхъ. Изъ плод-въ добывается тминное масло, употребляемое въ водочномъ производствѣ (изъ сѣмянъ приготавливаютъ ликеръ «кюммель»), въ парфюмерномъ дѣлѣ и кондитерскомъ производствѣ; сѣменами нерѣдко посыпаютъ хлѣбъ и кладутъ въ сыръ. (Рис. 299.)

**МЕДИЦИНСКОЕ УПОТРЕБЛЕНІЕ.** Сѣмена тмина содержатъ въ себѣ эфирное масло, которое дѣйствуетъ слегка раздражающимъ образомъ на слизистыя оболочки желудка и кишечника, вызывая ихъ болѣе энергичную дѣятельность. Врачами тминъ почти не прописывается, но въ домашнемъ быту онъ употребляется въ отварѣ и порошокѣ отъ 0,5 до 2,0 грм. (8-ми гранъ до  $\frac{1}{2}$  драхмы) нѣсколько разъ въ день при судорожныхъ боляхъ въ желудкѣ и также употребляется кормящими женщинами для увеличенія количества молока. Въ аптекахъ изъ тмина приготавливаютъ масло. Это масло имѣетъ пріятный запахъ и входитъ въ составъ различныхъ мазей и пластырей. Его-же употребляютъ при выработкѣ водки извѣстной подъ именемъ кюммеля.

**Тминъ черный**, см. Чернушка (*Nigella sativa* L.).

**Тмінъ**, см. Тминъ обыкновенный (*Carum Carvi* L.).

**Тмянъ**, см. Цминъ (*Helichrisum arvenarium* Dc.).

**Товолникъ**, см. Таволга дубраволистная (*Spiraea chamaedrifolia* L.).

**Товстуха**, см. Соколія перелѣтъ (*Gentiana cruciata* L.).

**Товстушка**, см. Череда трехраздѣльная (*Bidens tripartita* L.).

**Товстушка**, см. Волчекъ (*Phelyraea ramosa* C. A. M.).

**Товстушка**, см. П. дорожникъ песчаный (*Plantago arenaria* W. K.).

**Тогестъ** } см. Ласточкинъ обыкновенный (*Vincetoxicum officinale* Moench).

**Тойсѣ**, см. Сныть обыкновенная (*Aegopodium Podagraria* L.).

**Толанъ**, см. Икотникъ стро-зеленый (*Berteroa incana* Dc.).

**Толкачикъ**, см. Подорожникъ большой (*Plantago major* L.).

**Толкачики**, см. Подорожникъ средний (*Plantago media* L.).

**Толкачики солотные**, см. Осока пузырчатая (*Carex vesicaria* L.).

**Толкачикъ**, см. Хвощъ полевой (*Equisetum arvense* L.).

**Толкачъ**, см. Хвощъ полевой (*Equisetum arvense* L.).

**Толокилики** } см. Толокнянка обыкновенная (*Arctostaphylos*  
**Толокница** } *officinalis* Moench.).

**Толокняникъ** см. Шиповникъ обыкновенный (*Rosa canina* L.)

**Толокнянка**, см. Зимолюбка зонтичная (*Chimaphila umbellata* Nutt.).

**Толокнянка**, см. Линнея сѣверная (*Linnaea borealis* L.).

**Толокнянка**, см. Толокнянка обыкновенная (*Arctostaphylos officinalis* Moench.).

**Толокнянка**, см. Шиповникъ обыкновенный (*Rosa canina* L.).

**Толокнянка**, см. Сморогда глухая (*Ribes alpinum* L.).

**Толокнянка обыкновенная** (*Arctostaphylos officinalis* Moench.).

Толокнянка, волчьи ягоды. Амирикъ, Ам рыкъ, Амрыка Брус-  
 слинникъ (Волог.), Водяница ягода, Волчьи ягоды (Твер.), Вавчи  
 ягдкы (Малор.), Костянки (Пск.), Мучивникъ (Могил.), Муче-  
 никъ (Гродн.), Мученицы (Могил.), Мучанокъ (Даль, Гродн., Мог.),  
 Мученичникъ (Кіев.), Мученикъ ягоды (Вил.), Мучница, Муч-  
 ница (Малор.), Медвѣжье ухо (Волын.), Медвѣжій виноградъ,  
 Медвѣжьи ягоды, Расходники, Росхолыкъ (Малор.), Толокнянка,  
 Толоконникъ, Толокняникъ, Толокница (Арх., Костр., Вят., Твер.),  
 Толоконка (Волог.), Толочанникъ (Могил.), Толокилка Тала-  
 чанникъ (очев., искаж. Толочинникъ). Вѣчно зеленый кустар-  
 никъ изъ семейства «вересковыхъ» (*Ericaceae* Lindl.), распро-  
 страненный въ сѣверной и средней Европѣ, встречающійся  
 въ сѣверной и средней Россіи, въ Малороссіи, на Кавказѣ и  
 Сибири. Очень походить на бруслику (опис. см. выше стр. 171),  
 отъ которой отличается верхней завязью и листьями, на обѣихъ  
 сторонахъ которыхъ наблюдаются сѣтчатые жилки вмѣсто  
 точечныхъ ямокъ. Стебель вѣтвистый, стелющійся, дл. 7—22½  
 вершк. Листья не опадающіе на зиму, кожистые, продолговато-  
 обратно-яйцевидные, цельнокрайные. Розовато-бѣлые цвѣты  
 собраны по 4—6 верхушечными поникшими кистями. Плодъ—  
 костянка краснаго цвѣта о 5 косточкахъ. Цвѣтетъ въ маѣ.  
 Растетъ на песчаныхъ мѣстахъ, въ лѣсахъ и между кустар-  
 никами. Листья, богатые дубильнымъ веществомъ, упот-  
 ребляются на дубленіе, особенно сафьяна, и на окраску кожъ  
 въ сѣрый и черныя цвѣта. Мѣстами листья употребляются на  
 куреніе вмѣсто табака. На сѣврѣ мучнистыя ягоды въ неуро-  
 жайные годы употребляются къ хлѣбу. (Табл. XLIV, фиг. 255.)

**МЕДИЦИННОЕ УПОТРЕБЛЕНІЕ.** Листья растенія употребляются  
 въ медицинѣ довольно часто отъ болѣзни мочевого пузыря подъ  
 именемъ «травы медвѣжьяго уха» (*fol. urae ursi*). Листья собираются  
 и высушиваются лѣтомъ. Они содержатъ въ себѣ дѣйствующее  
 вещество—арбутинъ, желѣзистое дубильное вещество, соли калия,  
 органическія кислоты и слѣды эфирнаго масла. Сушенныя листья  
 толокнянки завариваютъ, какъ чай. На стаканъ кипятка берутъ  
 2,0—3,0 и 4,0 грм. (отъ ½ драх. до 1-й драхмы) листьевъ. Даютъ  
 настояться и эту порцію выпиваютъ за сутки. Въ послѣднее

время вмѣсто отвара врачами прописывается арбузные по 0,3 грм. (5-ти грам.) на приемъ 3 раза въ день. Высушенные листья, превращенные въ порошокъ, даются крайне рѣдко. Всего лучше дѣйствуетъ отваръ листьевъ, онъ дѣйствуетъ мочегонно и вяжущимъ образомъ на слизистую оболочку пузыря, вслѣдствіе чего успокаиваетъ позывы на мочеиспусканіе, которые такъ мучительны для людей, страдающихъ катарромъ пузыря, помогаетъ отъ недержанія мочи, уменьшаетъ отдѣленіе слизи и крови въ мочѣ. Успокаиваетъ припадки колики при каменной болѣзни, при этомъ не раздражаетъ нисколько желудочно-кишечныхъ путей. Дается также, какъ мочегонное, при подагрическихъ припадкахъ и иногда замѣняетъ собою маточные рожки, какъ средство, способное вызывать сокращеніе матки.

Въ гомеопатіи изъ свѣжихъ листьевъ медвѣжьяго ушка приготовляется настойка, которая дается, какъ средство противъ камней въ мочевомъ пузырьѣ.

Въ ветеринарной медицинѣ травка употребляется при тѣхъ-же страданіяхъ, какъ и у человѣка; кромѣ того, она дается еще отъ водянки.

Толокняшка, см. Смородина глухая (*Ribes alpina* L.).

Толоконка

Толоконникъ } см. Толокнянка обыкновенная (*Aretostaphy-*  
Толочанникъ } *los officinalis* Moench.).

Толочинникъ }

Толстолистникъ, см. Заячья капуста (*Sedum Telephium* L.).

Толетушка, см. Живучка мохнатая (*Ajuga genevensis* L.).

Толетушка, см. Соколий перелетъ (*Gentiana cruciata* L.).

Толетушка, см. Медовникъ (*Galeopsis Tetrahit* L.).

Толетушка, см. Сущеница болотная (*Gnaphallum uliginosum* L.).

Толетушка, см. Бюшница обыкновенная (*Inula Pulicaria* L.).

Толетушка, см. Под рожицъ песчаный (*Plantago arenaria* W. K.).

Томатъ, см. Помидоръ (*Lycopersicum esculentum* Mill.).

Томка, см. Деникъ лекарственный (*Mellilotus officinalis* Lam.).

Томковица, см. Грыжникъ голый (*Herniaria glabra* L.).

Тонка, см. Тонка голландская (*Dypterix odorata* Willd.).

Тонка голандская (*Dypterix odorata* willd). Тонка. Высокія деревья, произрастающія въ лѣсахъ Гвианы. Черныя зерна извѣстны въ торговлѣ подъ названіемъ «обобка тонки», «тонки голландской», «кумаруна» (*Faba de Tonka*, s. de Tonco. Hollandsche Tonkabohnen, Fève de Tonka) отличаются сильнымъ запахомъ, извѣстны въ медицинѣ и у туземныхъ жителей, какъ потогонное средство; у насъ принавлиются для запаха къ нюхательному табаку. Древесина, на вывѣсая кумаруновымъ деревомъ, или гайякъ, употребляется на мебель.

Тонколистникъ, см. Норичникъ узловатый (*Scrophularia nodosa* L.).

Тонконогъ, см. Овсяница овечья (*Festuca ovina* L.).

Тонконогъ, см. Мятликъ обыкновенный (*Poa trivialis* L.).

Тонконогъ см. Мятникъ лѣсной (*Poa nemoralis* L.).

Тонконожка, см. Мятликъ лесной (*Poa nemoralis* L.).  
 Тонконожка, см. Овсяница высокая (*Festuca elatior* L.).  
 Топинамбуръ, см. Груша земляная (*Helianthus tuberosus* L.).  
 Топникъ бѣлый, см. Поповникъ обыкновенный (*Chrysanthemum Leucanthemum* L.).

Тополь, см. Тополь с ребристый (*Populus alba* L.).  
 Тополь, см. Осокорь обыкновенный (*Populus nigra* L.).  
 Тополь бальзамическій, см. Тополь душистый (*Populus balsamifera* L.).

Тополь бѣлолистный } см. Тополь серебристый (*Populus*  
 Тополь бѣлый } *alba* L.).

Тополь висловскій, см. Осокорь обыкновенный (*Populus nigra* L.).

Тополь душистый (*Populus balsamifera* L.). Вѣрба золотая (Умань). Рай-дерево (Приам. край), Рай кое дерево, Осокорь даурск. я, Осокорь дуннская, Тополь бальзамическ., Тагама-гака. Дерево изъ семейства ивовыхъ (*Salicaceae* Rich.), родомъ изъ Сѣверной Америки. Молодыя вѣтви краснобурья безъ ясныхъ граней; листья яйц. видные или яйцевидно-ланцетные, заостренные, городчато-пильчатые, снизу бѣловатые, съ почти круглыми черешками, снабженными сверху бороздкой. Почки смолисто-липкы. Цвѣтки однополые двудомные, одиночные, въ углахъ кроющихъ прицѣтниковъ, съ бѣлыми колосьями, развивающимися изъ прошлогоднихъ почекъ; колосья густые, цилиндрические, потомъ висячіе, цвѣтущіе до появленія листьевъ. Околоцвѣтникъ чашцеобразный, косой; тычинокъ 12 — 30. Завязь верхняя многогъзная, съ короткимъ столбикомъ, несущимъ 2-храздѣльное рыльце. Плодъ—двустворчатая коробочка; прицѣтники отпадаютъ до созрѣванія коробочекъ. Цвѣтетъ весн. и. Разводится иногда въ садахъ и при дорогахъ и особенно хороши для сѣверной полосы Россіи, такъ какъ легко прививается и очень быстро растетъ.

**МЕДИЦИНСКОЕ УПОТРЕБЛЕНІЕ.** Свѣжія почки тополя служатъ для приготовленія мази, которая считается полезною отъ ревматизма и подагры, также она накладывается на геморроидальныя шишки и ожоги. Настой почекъ въ винѣ или въ винномъ спиртѣ употребляютъ въ народѣ отъ цинги и отъ сифилиса.

Тополь итальянскій, см. Тополь пирамидальный (*Populus pyramidalis* Roz.).

Тополь пир. мидальный (*Populus pyramidalis* Roz.). Ранна (Малор.). Рай-дерево, Ракита ит. льнянская. Южная, украинская тополь, Тополь итальянскій, Яворъ (въ Малор.). Высокое дерево, представляющее разновидность осокора обыкновеннаго (опис. см. стр. 725) и отличающееся красивой пирамидальной кроной, вверхъ направленными, прижатыми вѣтвями и ромбическими листьями. Разводится часто въ садахъ и паркахъ.

Тополь серебристый (*Populus alba* L.) Осокорь, Осокорь бѣлый, Осокорь (Мал.), Сокоинъ (Мал.), Тополь, Топольникъ, Тополя (Малор.), Тополь бѣлый, Тополь бѣлолистный, Бѣлолистка, Тополя

серебриста (Малор.) Большое дерево, выш. въ нѣсколько саж., изъ сем. лѣства «ивовыхъ» (*Salicineae* Rich), распространѣнное въ средн. и южной Европѣ, въ средней Россіи въ Сибири и Турке танѣ. Стволъ пепельно-сѣрый. Молодые побѣги и нижняя сторона листьевъ блѣдо-войлочные. Листья длин. о черешковые, л. явидные или округло-овальные, угловато-зубчатые или выемчато-лопастные. Цвѣты однополые, двудольные, въ сережкахъ. Околоцвѣтникъ косой, чашеобразный; тычинокъ 8, краснаго цвѣта. Завязь верхняя одногнѣздная, съ короткимъ столбикомъ, несущимъ 2-храздѣльное рыльце желтаго цвѣта. Плодъ—мнор. с мясн. 2-хстворчатая коробочка. Сѣм. на сѣ. в. лоскамп. Цвѣтетъ рано весной. Растетъ на влажныхъ мѣстахъ, въ лѣсахъ и по берегамъ рѣкъ. Древесина употребляется въ столярномъ и токарномъ производствахъ. (Табл. XLIV, фиг. 252.)

**Тополь украинская**, см. Тополь пирамидальный (*Populus pyramidalis* Roz.).

**Тополь черный**, см. Осокорь обыкновенный (*Populus nigra* L.).

**Тополь южная**, см. Тополь пирамидальный (*Populus pyramidalis* Roz.).

**Топольникъ**

**Тополя** } см. Тополь серебристый (*Populus alba* L.).

**Тополя серебриста**

**Топорики** } см. Васильки рогаые (*Delphinium Consolida* L.).

**Топорки**

**Топтунъ**, см. Плаунъ булавиный (*Lycopodium clavatum* L.).

**Топтунъ**, см. Гречишка птичья, или спорышъ (*Polygonum aviculare* L.).

**Топтунъ**, см. Мокрица (*Stellaria media* Smith.).

**Топырка**, см. Медунница (*Spiraea ulmaria* L.).

**Торгунъ**, см. Эстрагонъ (*Artemisia dracunculus* L.).

**Торгунъ**, см. Дервель (*Ptarmica cartilaginea* Dc.).

**Торица**, см. Желтушникъ левкѣйный (*Erysimum cheiranthoides* L.).

**Торица**, см. Плевель опьяняющій (*Lolium temulentum* L.).

**Торица**, см. Дрема кукушкинъ цвѣтъ (*Lychnis Viscaria* L.).

**Торица**, см. Торица полевая (*Spergula arvensis* L.).

**Торица**, см. Звѣздчатка злачная (*Stellaria graminea* L.).

**Торица дикая**, см. Пикульникъ длинноцвѣтный (*Galeopsis Ladatum* L.).

**Торица полевая** (*Spergula arvensis* L.). Вошка. Вошь-трава.

Вошки, Торица (Тв., Ост.), Дерибка (Влад.), Заборная трава.

Земляной вересъ, Истоколенникъ, Метелики (Малор.), Минуши

(Аниск.), Разметка, Свинокроль (Могил.), Сорочья пряжа (Влад.)

Торка, Шпиргель. Однодѣтное травянистое растеніе изъ семей-

ства «гвоздичныхъ» (*Caryophyllaceae* Juss.), распространени-

во всей Европѣ и почти во всей Россіи, выш. 7—20 верш.

Стебель прямостоящій или восходящій. Листья янтевидные, л.

нижней сторонѣ съ продольной бороздой; листья укороченныхъ

побѣговъ собраны пазушными пучками и кажутся расположен-

ными мутовчато вокругъ стебля. Цвѣтоножки послѣ цвѣтѣн



отогнуты внизъ. Бѣлые мелкіе цвѣты образуютъ соцвѣтіе-развилину (лихазій-полузонтикъ); чашелистиковъ 5; лепестковъ и тычинокъ по 5; завязь несетъ 5 столбиковъ. Плодь — коробочка, раскрывающаяся наверху зубчиками. Цвѣтетъ съ юня до сентября. Часто встрѣчается на поляхъ и песчаныхъ мѣстахъ. Иногда разводится, какъ кормовая трава. (Рис. 300.)

**Торица трава**, см. Икотникъ сѣро-зеленый (*Berteroa incana* Dc.).

**Торка**, см. Торица полевая (*Spergula arvensis* L.).

**Тормашикъ**, см. Ломоносъ цѣлкій (*Clematis Vitalba* L.).

**Торнъ**, см. Тернъ (*Prunus insititia* L.).

**Торнъ**, см. Терновникъ (*Prunus spinosa* L.).

**Торонъ**, см. Тернъ (*Prunus spinosa* L.).

**Торфяникъ**, см. Торфяной мохъ (*Sphagnum squarrosum* Pers.).

**Торфяной мохъ** (*Sphagnum squarrosum* Pers.). Мохъ, Мохъ бѣлый, Торфяникъ. Мхи, принадлежащіе къ роду *Sphagnum* (сфагны) отличаются отъ всѣхъ остальныхъ тѣмъ, что ихъ листья состоятъ изъ двоякаго рода кѣлочекъ: 1) изъ кр. пныхъ пустыхъ (наполненныхъ воздухомъ) кѣлочекъ, оболочка которыхъ снабжена спиральными полосками утолщеній и представляетъ крупныя оверстія, выходящія наружу, и 2) изъ мелкихъ удлиненныхъ кѣлочекъ, заключающихъ протоплазму и хлорофиллъ и расположенныхъ между первыми. Стебель также одѣтъ снаружки вышеописанными крупными пустыми кѣлочками; вслѣдствіе обилія ихъ все растеніе имѣетъ не ярко-зеленый, а бѣловатый или красоватый цвѣтъ. Вслѣдствіе такого строенія сфагны обладаютъ способностью впитывать въ себя воду, подобно губкѣ. Всѣ виды этого рода растутъ на болотахъ и озерахъ, гдѣ обзуютъ сплошную, хотя и зыбкую коверъ на поверхности. Въ хвойныхъ лѣсахъ они нрѣдко также одѣваютъ всю почву. Сфагны распространены, главнымъ образомъ, въ умеренномъ и холодномъ климатѣ; они представляютъ главный матеріалъ, изъ котораго образуется торфъ.

**Торчокъ**, см. Строчокъ (*Helvella esculenta* Pers.).

**Тоткунъ**, см. Пастушья сумка (*Capsella Bursa pastoris* Moench.).

**Тоуканъ**, см. Ятрышникъ широколистный (*Orchis latifolia* L.).

**Топіельдія чашечная** (*Topfieldia calyculata* Wahl.). Многолѣтнее травянистое растеніе изъ семейства «лилейныхъ» (*Liliaceae* Dc.), распространенное въ сѣверной и средней Европѣ, въ западной Россіи, на Уралѣ и въ Сибири. Корневище ползучее. Стебель выш. 2—5 вершк., при основаніи съ узкими мечевидными листьями, сидящими въ 2 ряда. Цвѣты мелкіе, желтоатые, собраны верхушечной кистью; каждый цвѣтокъ снабженъ 3-листочнымъ прицвѣтникомъ, на немъ находящимъ чашечку. Околоцвѣтникъ 6-лиственный, звѣздчатый, несомнѣнный. Тычинокъ 6; завязь верхняя 3-хгнѣздная, съ 3-мя столбиками. Плодь — коробочка. Цвѣтетъ лѣтомъ, растеть на лугахъ. (Рис. 301.)

**Тоя**, см. Брѣжъ желтый (*Aconitum lycoctonum* L.).

**Тоя полевая**, см. Герань кроваво-красная (*Geranium sanguineum* L.).

Трава бабушка выпусти собачекъ, см. Поповникъ обыкновенный (*Chrysanthemum Leucanthemum* L.).

Тр ва-блхъ, см. Ромашка персидская (*Pirethrum carneum* Brst.).

Трава-головня, см. Плевель опьяняющий (*Lolium temulentum* L.).

Трава гонецъ, см. Очитокъ острый (*Sedum acre* L.).

Трава-листь, см. Гравилатъ воляной (*Geum rivale* L.).

Трава на желтую грыжу, см. Лапчатка серебристая (*Potentilla argenta* L.).

Трав о трехъ цвѣткахъ, см. Коровникъ черный (*Verbascum nigrum* L.).

Трава отъ выпадышей, см. Короставникъ полевой (*Scabiosa arvensis* L.).

Травица, см. Трасунка среичи (*Briza media* L.).

Травица красная, см. Звѣробой обыкновенный (*Hypericum perforatum* L.).

Тр ка дѣвичья, см. Травянка обыкновенная (*Dianthus deltoides* L.).

Травяная зелень, см. Гречиха птичья, спорышъ (*Polygonum aviculare* L.).

Травянецъ } см. Травянка (*Dianthus deltoides* L.).

Травянка (*Dianthus deltoides* L.). Фармацевтическое названіе.

*Tunica silvestris* (Fl. et Herba). Горжанка (Волог.), Грыжникъ (Вят.), Дворовая (Олон.), Золототысячникъ (Пет., Волог., Твер., Кал.), Искра (Гродн.), Игольникъ (Вят.), Красупинникъ (Вят.), Кочетки (Курск.), Красота дѣвичья (Волог.), Кровь человѣчья (Курск.), Конье Егорьево (Сиб., Даль), Липочки (Олон.), Некорко (Гродн.), Ногтовая трава (Вятск.), Овсянка (Волг.), Повѣсникъ (Черн.), Рыжикъ (Олон.), Слѣзки (Черн.), Слѣзки Божьи (Нижег.), Слѣзки полевые (Могил.), Сковорока (Волог.), Травянецъ (Двинг.), Дѣвичья травка, Цвѣтки красные (Курск.), Агафна купальница. Невысокая многолѣтняя травка изъ семейства «гвоздичныхъ» (*Caryophyllaceae* Juss.), распространенная почти во всей Европѣ, въ сѣверной и средней Россіи и въ западной Сибири. Образуетъ рыхлыя дерновинки. Вѣтвистый стебель покрытъ короткимъ пушкомъ; листья линейно-ланцетные. Ярко-пурпурные, рѣже бѣлые, цвѣты сидятъ на длинныхъ цвѣтоножкахъ поодиночкѣ или по два; прицвѣтники эллиптически-заостренные, вдвое больше чашечки. Чашелистиковъ 4—5, лепестковъ въ одинаковомъ числѣ съ чашелистиками; тычинокъ вдвое больше. Завязь несетъ 2 столбика. Плодъ—коробочка, раскрывающаяся вверху зубчиками. Цвѣтетъ съ мая до сентября. Растетъ на лугахъ и въ рощахъ.

**МЕДИЦИНСКОЕ УПОТРЕБЛЕНІЕ.** Медицинское употребленіе известно только въ народѣ. Въ Тверской губерніи растеніе употребляется отъ женскихъ болячекъ, въ Владимирской—отъ геморроидальныхъ припадковъ и неблагополучнаго разрешенія отъ

бремені, также отъ золотухи или краснухи, откуда и получилось названіе золототысячникъ и красушникъ, въ Уфим кой губ. его и принимаютъ отъ ломоты, и въ Курской губ. отъ боли въ животѣ. Травкѣ ангельскій, см. Арника горная (*Arnica montana* L.). Трникъ сленья трава, см. Серпуха красильная (*Serratula tinctoria* L.).

Тредовникъ, см. Норичникъ узловатый (*Serofularia nodosa* L.).

Тезубка, см. Тростникъ высокій (*Arundo Donax* L.).

Тремевина, см. Бересклетъ бородавчатый (*Evonymus verrucosus* L.).

Тременталь, см. Герань болотная (*Geranium palustre* L.).

Тресна

Треснякъ } см. Тростникъ обыкновенный (*Arundo Phragmites* L.).

Треста

Треста, см. Камышъ озерной (*Scirpus lacustris* L.).

Тресса, см. Цырей ползучій (*Trileum repens* L.).

Трестъ, см. Тростникъ обыкновенный (*Arundo Phragmites* L.).

Третьма, см. Вахта трилистная (*Menyanthes trifoliata* L.).

Треушникъ, см. Клеверъ луговой (*Trifolium pratense* L.).

Трефоль } см. Вахта трилистная (*Menyanthes trifoliata* L.).

Трехлиственникъ }

Трехлистая, см. Ландышъ майскій (*Convallaria majalis* L.).

Трехлистникъ луговой, см. Клеверъ луговой (*Trifolium pratense* L.).

Трехлистникъ ползучій, см. Клеверъ красноблѣдный (*Trifolium hybridum* L.).

Трехцвѣтка, см. Аютины глазки (*Viola tricolor* L.).

Трехцвѣтная трава, см. Иванъ да Марья (*Melampyrum nemorosum* L.).

Тржемелина, см. Бересклетъ бородавчатый (*Evonymus verrucosus* L.).

Тржещина, см. Тростникъ обыкновенный (*Arundo Phragmites* L.).

Трибѣята, см. Клеверъ средній (*Trifolium medium* L.).

Тривостренникъ, см. Тривостренникъ болотный (*Triglochin palustre* L.).

Тривострица болотная, см. Тривостренникъ болотный (*Triglochin palustre* L.).

Тривьянца, см. Дубровка (*Veronica Chamaedrys* L.).

Трилистникъ, см. Вахта трилистная (*Menyanthes trifoliata* L.).

Трилистникъ, см. Клеверъ луговой (*Trifolium pratense* L.).

Трилистникъ бѣлый, см. Бѣлоголовка (*Trifolium montanum* L.).

Трилистникъ водяной, см. Вахта трилистная (*Menyanthes trifoliata* L.).

Трилистникъ кислый, см. Кислица обыкновенная (*Oxalis Acetosella* L.).

Трилистникъ лѣсной, см. Клеверъ средній (*Trifolium medium* L.).

Трилистникъ розовый, см. Леденецъ рогатый (*Lotus corniculatus* L.).

**Триостренникъ болотный** (*Triglochin palustre* L.). Болотница обыкновенная (Грод.), Веревочникъ (Курск.), Пырей болотный, Свитей (Курск.), Тривострица болотная, Тривостренникъ, Чечевичникъ болотный. Многолѣтняя трава изъ семейства «ситниковыхъ» (*Juncaginaceae* Bartl.), образующая дерновники. Распространена почти во всей Европѣ и во всей Россіи. Цвѣточный стебель выпш.  $3\frac{1}{2}$ —11 ве шк. Мелкіе зеленовато-желтые цвѣты расположены тонкимъ кольцомъ, занимающимъ верхнюю половину стебля. Околоцвѣтникъ 6-тилистный, чашечковидный; тычинокъ 6; пестикъ состоитъ изъ 3-хъ сросшихся между собою плодолистиковъ. Плодъ сухой, распадающійся на 3 плодика. Растетъ на влажныхъ лугахъ. Цвѣтетъ лѣтомъ. (Рис. 301.)

**Триперстень**, см. Клеверъ средний (*Trifolium medium* L.).

**Триперстень бѣлый**, см. Бѣлоголовка (*Trifolium montanum* L.).

**Триперстница**, см. Герань болотная (*Geranium palustre* L.).

**Трипутень**, см. Подорожникъ болотный (*Plantago major* L.).

**Трипутникъ**, см. Василекъ луговой (*Centaurea jacea* L.).

**Трипутникъ**, см. Подорожникъ большой (*Plantago major* L.).

**Трипутникъ**, см. Подорожникъ средний (*Plantago media* L.).

**Трифупель**, см. Козелецъ преземистый (*Scorzonera humilis* L.).

**Трифолія** } см. Вахта трилистная (*Manyanthes trifoliata* L.).

**Трифоль** } см. Вахта трилистная (*Manyanthes trifoliata* L.).

**Трифоль**, см. Бѣлокрыльникъ болотный (*Calla palustris* L.).

**Трицвѣтная трава**, см. Анютины глазки (*Viola tricolor* L.).

**Троезелье** } см. Клеверъ луговой (*Trifolium pratense* L.).

**Троелистка** } см. Клеверъ луговой (*Trifolium pratense* L.).

**Троелистка**, см. Клеверъ средний (*Trifolium medium* L.).

**Троелистка** } см. Вахта трилистная (*Manyanthes trifoliata* L.).

**Троелисть** } см. Вахта трилистная (*Manyanthes trifoliata* L.).

**Троеста**, см. Канарейникъ тростниковый (*Phalais canariensis* L.).

**Тро стъ**, см. Ласточникъ обыкновенный (*Vincetoxicum officinale* Moench.).

**Троецвѣтка**, см. Верескъ обыкновенный (*Calluna vulgaris* Salisb.).

**Троецвѣтка**, см. Синюха обыкновенная (*Polemonium coeruleum* L.).

**Троецвѣтка** } см. Анютины глазки (*Viola tricolor* L.).

**Троечная трава** } см. Анютины глазки (*Viola tricolor* L.).

**Троицкая трава** } см. Анютины глазки (*Viola tricolor* L.).

**Троицынъ цвѣтъ** } см. Анютины глазки (*Viola tricolor* L.).

**Троичный цвѣтъ** } см. Анютины глазки (*Viola tricolor* L.).

**Трой-зелье**, см. Клеверъ луговой (*Trifolium pratense* L.).

**Тройнягъ**, см. Клеверъ средний (*Trifolium medium* L.).

**Тройнячокъ**, см. Клеверъ бѣлый ползучій (*Trifolium repens* L.).

**Тройца**, см. Клеверъ луговой (*Trifolium pratense* L.).

**Тройцевъ**, см. Анютины глазки (*Viola tricolor* L.).

**Тройчакъ**, см. Плакунъ-трава (*Lythrum Salicaria* L.).

**Тройчистое зелье**, см. Ледвенецъ рогатый (*Lotus corniculatus* L.).

**Тромелина**, см. Бересклетъ бородавчатый (*Evonymus verrucosus* L.).

**Тропечка** } см. Жабникъ пашенный (*Filago arvensis* L.).

**Тропникъ** }

**Тропникъ**, см. Кошачья лапка (*Antennaria dioica* Gärtn.).

**Тропникъ**, см. Стародубка (*Gentiana Amarella* L.).

**Тропникъ**, см. Чина весенняя (*Orobis vernus* L.).

**Троскотъ** } см. Тростникъ высокій (*Arundo Donax* L.).

**Тростникъ** }

**Тростникъ**, см. Тростникъ обыкновенный (*Arundo Phragmites* L.).

**Тростникъ большой**, см. Тростникъ высокій (*Arundo Donax* L.).

**Тростникъ высокій** (*Arundo Donax* L.). Фармацевтическое название *Donax* s. *Canpa Sargannaë*. Тростникъ большой, Тростникъ дебелая трава, Троскотъ, Камышникъ, Трезубка. Произрастаетъ близъ Астрахани и на Кав. азб. Служить для тѣхъ-же цѣлей, какъ и «тростникъ обыкновенный», описаніе косто см. ниже.

**Тростникъ дебелая трава**, см. Тростникъ высокій (*Arundo Donax* L.).

**Тростникъ обыкновенный** (*Arundo Phragmites* L.). Жгуты (Тверск.), Камышъ (во многихъ губ.), Куга (Приарг. кр.). Махалга (цвѣтъ камыша въ Астрах.), Очереть (Мал.) и пзм. Череть (Орл.), Черотъ (Гродн.), Ачередъ (Харьк.), Подренникъ, Семиколенникъ (Астр.), Тресна, Тре някъ (Олон.), Треста, Трестъ (Арх.), Троста, Тростъ, Тростникъ обыкновенный (Моск.), Тржещина (Гродн.), Ханьга (Арх.), Ростки въ Тобольской губ. назв. Коньцами, Шильцами, а на Иртышѣ—Коньяниками. По смѣш. съ др. д. Метлина, Метлица, Метлика. Пырей (Олон., Новг.), Пырей луговой (Ниж.), Мечевникъ (Смол.), Сабельникъ (Тверск.), Початки (Приар. кр.), Рызакъ болотный (Минск.). Многолѣтнее травянистое растение изъ семейства «злаковыхъ» (*Gramineae* Juss.), распространенное во всей Европѣ и весьма обыкновенное во всей Россіи. Отъ ползучаго корневища, выпускающаго длинныя подземныя побѣги, отходятъ высокіе (3—6 вершк.) стебли, съ длинными, плоскими, широкими сѣровато-зелеными листьями. Соцвѣтіе образуетъ краснато-бурую, болѣе или менѣе поникшую, метелку дл.  $5\frac{1}{2}$ —10 вершк. Колоски сжаты съ боковъ, многоцвѣтны; волоски, сисящіе при основаніи цвѣтковъ, сперва короче цвѣточныхъ пленокъ, а послѣ цвѣтенія значительно удлинняются, вслѣдствіе чего метелка становится пушистой. Цвѣтеть въ концѣ лѣта. Растетъ на болотахъ, по берегамъ рѣкъ, прудовъ и озеръ. Стебли употребляются для покрытія стѣнъ, крышъ сельскихъ строеній, на тростни и т. п. (Табл. XLV, фиг. 259.)

**Тростникъ сахарный** (*Saccharum officinarum* L.). Родомъ изъ Ост-Индіи. Внутренность стебля наполнена сочнымъ сахарнымъ веществомъ, называемымъ «тростниковымъ сахаромъ».

Произростаёт сахарный тростникъ на влажныхъ и сырыхъ мѣстахъ въ тропическихъ странахъ. Въ настоящее время съ успѣхомъ культивируется и составляетъ обширныя плантаціи въ Сѣв. Америкѣ, дающія обильные урожаи даже на значительной высотѣ надъ уровнемъ моря. Для добыванія сахара срѣзываютъ годовые отпрыски передъ цвѣтеніемъ и выжимаютъ посредствомъ вальцованія сокъ. Къ полученной такимъ образомъ жидкости для клеровки примѣшивается небольшое количество извести, далѣе жидкость кипятится, охлаждается, послѣ чего сахаръ осаждается ввидѣ кристалликовъ. Въ такомъ видѣ сахаръ, однако, подвергается посредствомъ многихъ способовъ дальнѣйшему рафинированію и клеровкѣ, чтобы отдѣлать отъ него грязныя частицы и придать ему чистый бѣлый цвѣтъ. По способу рафинированія и приготовления различаютъ нѣсколько сортовъ тростниковаго сахара. На вкусъ рафинированный тростниковый сахаръ очень приятенъ, имѣетъ способность при треніи фосфоресцировать, т. е., свѣтить въ темнотѣ. Употребляется въ пищу и считается питательнымъ.

**МЕДИЦИНСКОЕ УПОТРЕБЛЕНІЕ.** Сахаръ, принятый внутрь, увеличиваетъ отдѣленіе слизистой оболочки кишечнаго канала, въ то-же время онъ уменьшаетъ раздражимость слизистой оболочки и обволакиваетъ ее, хотя въ меньшей степени, чѣмъ слизистыя вещества. Врачами сахаръ примѣшивается къ различнымъ порошкамъ, чтобы уменьшить ихъ раздражающее дѣйствіе на слизистую оболочку; также сахарный сиропъ или сахарный порошокъ прибавляется къ микстурамъ для поправленія вкуса. Сахарная вода служитъ средствомъ, успокаивающимъ нервную систему, и дается при возбужденіи нервовъ, также лихорадящимъ больнымъ, кромѣ того, сахарная вода помогаетъ пищеваренію и полезна послѣ слишкомъ сытнаго и жирнаго обѣда и питья спиртныхъ напитковъ. Снаружи порошкомъ сахара посыпаютъ пятна на рогавицѣ глазъ и афты. Порошокъ сахара рекомендуется еще, какъ противоядіе при отравленіи мѣдью и яписомъ.

Въ гомеопатіи сахаръ употребляется, какъ индифферентное средство для приготовленія многихъ лекарствъ.

Въ ветеринарной медицинѣ сахаръ дается собакамъ отъ кашля, снаружи порошокъ сахара вдуваютъ животнымъ въ глаза отъ пятенъ на рогавицѣ и присыпаютъ язвы, имѣющія обширныя разрастанія грануляціонной ткани.

**Трошакъ**, см. Бресклетъ бородавчатый (*Evonymus verrucosus* L.).

**Троянда**, см. Шиповникъ (*Rosa canina* L.).

**Троянда**, см. Роза центифольная (*Rosa centifolia* L.).

**Троянокъ**, см. Пролѣска (*Anemone hepatica* L.).

**Трудница**, см. Кровохлебка лекарственная (*Sanguisorba officinalis* L.).

**Трускавка**, см. Клубника садовая (*Fragaria collina* Ehrh.).

**Трусликъ**, см. Василекъ перистый (*Centaurea Scabiosa* L.).

**Труеть**, см. Погремокъ обыкновенный (*Rhinanthus Crista Galli* L.).

**Трюфель бѣлый** (*Tuber albidum* Fr.). Грибъ изъ семейства стр-

фелевыхъ» (*Tuberaceae*), распространенный въ лѣсахъ средней Европы, встрѣчающійся въ большомъ количествѣ около Москвы, гдѣ его собираніе съ давнихъ поръ составляетъ промыселъ мѣстныхъ жителей. Плодовое тѣло этого гриба имѣетъ видъ клубня и развивается подъ землей. Наружная оболочка его свѣтлобурая или желтая; внутренняя масса бѣлая съ темными жилками. Запахъ у него гораздо слабѣе, чѣмъ у настоящихъ трюфелей. Растетъ онъ болѣею частью, какъ и всѣ трюфели вообще, около корней разныхъ древесныхъ породъ. Для отысканія его прежде дрессировали медвѣдей, въ настоящее время употребляютъ собакъ, особенно пуделей. Бѣлый трюфель въ окрестностяхъ Москвы идетъ въ продажу подъ именемъ русскаго, польскаго, московскаго или троичкаго трюфеля. Иногда же употребляютъ для фальсификаціи настоящихъ, или черныхъ трюфелей. (Табл. XLIV, фиг. 253.)

**Трюфель черный** (*Tuber cibarium* Sibth.). Трюфель. Перигора, Трюфель обыкновенный. Грибъ изъ семейства «трюфелевыхъ», встрѣчающійся въ лѣсахъ Франціи, Италіи, рѣже въ юго-западной Германіи. Плодовое тѣло (оно имѣетъ шаровидную неправильную форму отъ величины грецкого орѣха до размѣровъ апельсина и развивается подъ землей. Поверхность его красновато-бѣлая, пѣвѣ, усажена многогранными возвышеніями, внутренняя масса фіолетово-черная съ бѣловатыми жилками. Въ виду аромата и вкуса онъ высоко цѣнится гастрономами и считается лучшимъ сортомъ трюфелей. Другіе виды этого рода имѣютъ широкое распространеніе въ южной, средней и западной Европѣ; добываніе ихъ имѣетъ для нѣкоторыхъ мѣстностей значеніе важнаго промысла. Отыскиваютъ трюфели обыкновенно посредствомъ свиней или дрессированныхъ собакъ. Трюфели были извѣстны еще въ глубокой древности, очень цѣнились греками и римлянами, которые приписывали имъ возбуждающія свойства. (Табл. XLIV, фиг. 254.)

**Трясевичная трава** } см. Валериана лекарственная (*Valeriana officinalis* L.).

**Трясулька**, см. Земляные орѣшки (*Spiraea Filipendula* L.).

**Трасунка**, см. Трасунка средняя (*Briza media* L.).

**Трасунка средняя** (*Briza media* L.). Анюны, глазки (Смол.), Дрожалка (съ нѣм.), Змѣйка, Змѣйка-трава, Змѣяная трава, Здрѣжникъ, Сдрыжникъ (Могил.), Клонники (Смол.), Клопецъ (Новг.), Колосовая трава, Кокушкины слезки (Могил.), Невейка (Хар., Вор.), Сережникъ, Серьги, Сидзки (Мог.), Трасучка, Трасунка, Травница, Метлюгъ (Курск.), Перловникъ сѣный, Муки (Могил.), Конопель, Конопелька, Конопельки полевые, Конопий (Кіев.). Красивое двудомное растеніе изъ семейства «злаковыхъ» (*Gramineae* Juss.), распространенное почти во всей Европѣ и во всей Россіи, съ прямостоящею растопыренною метелкой, изланные колоски которой висятъ на тонкихъ ножкахъ и колышутся при малѣйшемъ вѣтрѣ. Стебель выш. 7—12 вершковъ. Листья плоскіе, узкіе. Колоски многоцвѣтные, сплеснуты съ

боковъ, округло-сердцевидные, безостные, зеленоватые и фиолетовые. Створки колосковъ короче непосредственно слѣдующихъ за ними двъ точныхъ пленокъ. Цвѣтеть лѣтомъ. Растетъ на лугахъ и между кустарниками. Отличная кормовая трава. (Табл. XLIV, фиг. 256.)

**Трасучка**, см. Трасушка средняя (*Briza media* L.).

**Трасучка**, см. Осина (*Populus tremula* L.).

**Туманъ**, см. Посконникъ конопляный (*Eupatorium cannabinum* L.).

**Турецкая трава**, см. Канарейникъ тростниковый (*Phalaris arundinacea* L.).

**Турица** } см. Липучка репейчатая (*Echinopspermum Lapula*  
**Турица** } *Lehm.*)

**Турокъ**, см. Кукуруза обыкновенная (*Zea Mays* L.).

**Турфа трава**, см. Осока песчаная (*Carex arenaria* L.).

**Турча болотная** (*Hottonia palustris* L.). Маттиоля, К. послѣпъ водяной. Турчъ, Турча трава, Плавунникъ, Тысячелистникъ водяной. Многолѣтнее травянистое водяное растение изъ семейства «првоцвѣтныхъ» (*Primulaceae* Vent.), распространенное въ сѣверной и средней Европѣ, въ сѣверной, средней и юго-западной Россіи, съ погруженнымъ въ воду стеблемъ, на которомъ кольцами сидятъ гребенчато перисто-разбѣченные листья. Цвѣтокъ выдается на 3½—4 верш. надъ поверхностью воды и несетъ на верхушкѣ кистевидное соцвѣтіе, состоящее изъ бѣловатыхъ или свѣтло-розовыхъ цвѣтовъ, расположенныхъ кольцами. Чашечка и вѣнчикъ 5-тираздѣльные. Тычинокъ 5; завязь верхняя одногнѣдная, съ осевымъ съмыносомъ и съ однимъ сѣмязкомъ. Плодь—корбочка. Цвѣтеть въ началѣ лѣта. Растетъ въ стоячихъ водахъ. (Рис. 305.)

**Турча трава** } см. Турча болотная (*Hottonia palustris* L.).  
**Турчъ** }

**Туръ**, см. Арника горная (*Arnica montana* L.).

**Тутовникъ**, см. Тutowое дерево (*Morus alba* L.).

**Тutowое дерево**, Шелковица бѣлая (*Morus alba* L.). Тутовникъ, Туюшникъ, Шелковица, Шелковица бѣлая. Шолковица, Шолковица бѣлая, Шовковица (назв. женск. особей), Шелковичное дерево, Шовкунъ, Шолкунъ (назв. мужск. особей), Тютюна. Кустарникъ или дерево выш. до 2 сажень изъ семейства «крапивныхъ» (*Urticaceae* Juss.), родомъ изъ Китая и Персіи. Листья яйцевидные или сердцевидные, при основаніи несимметричные, дѣльные или лопастные, пильчатые, шероховатые или гладкіе. Цвѣты мелкіе однополые. Пестичные женскіе цвѣты въ колосьяхъ на длинныхъ ножкахъ въ углахъ листьевъ. Околоцвѣтнікъ 4-храздѣльный. Тычинокъ 4; завязь верхняя одногнѣдная, съ 2-мя нитвидными рыльцами. Плодь сборный, ягодообразный, бѣлый, красноватый или почти черный, напоминающій плоды ежевики. Воздѣлывается во многихъ странахъ преимущественно ради листьевъ, которые идуть на кормъ шелковичныхъ червей. Встрѣчается въ одичаломъ видѣ въ Закавказьи.



казьѣ; въ Россіи разводится на югѣ. Изъ листьевъ добывается желтая краска. (Рис. 303.)

**Туговое ерево**, Шелковица черная (*Morus nigra* L.). Морва, Тутъ, Тютяна, Шелковица цареградекая, Шовковица (Малор.), Шахтутъ. Дерево выш. въ нѣсколько саженъ изъ семейства крапивныхъ» (*Urticaceae* Juss.), родомъ изъ Азіи, дико произрастающее въ Закавказьѣ. Листья очередные, сердцевидные или округлосердцевидные, цѣльные или лопастные. пальчатые, съ обѣихъ сторонъ широкооватые. Цвѣты мелкіе однополые въ небольшихъ на верхушкахъ колосьяхъ. Пестичные колосья почти сидяче и превращаются въ послѣдствіи въ черныя соплодия, напоминающія плоды ежевики и состоящіе изъ тѣсно сожженныхъ орышковъ, заключенныхъ въ сочные сросшіеся между собою околоцвѣтники. Цвѣтетъ весной. Разводится на югѣ. Плоды его — тутовые ягоды, ароматны и сладковаты на вкусъ, употребляются въ пищу; изъ нихъ также приготовляютъ сиропъ. Листьями кормятъ шелковичныхъ червей. (Рис. 304 и Табл. L, фиг. 281.)

**МЕДИЦИНСКОЕ УПОТРЕБЛЕНІЕ.** Свѣжія тутовые ягоды служатъ для приготовленія сиропа, который въ прежніе годы употреблялся очень часто для прибавленія къ микстурамъ отъ боли въ горлѣ, отъ поноса и въ особенности отъ молочницы у дѣтей; въ настоящее время сиропъ этотъ употребляется гораздо рѣже.

**Тутощникъ**, см. Туговое дерево (*Morus alba* L.).

**Тутъ**, см. Туговое дерево, шелковица черная (*Morus nigra* L.).

**Тушекъ**, см. Кермекъ, или Катранъ красный (*Statice Gmelini* Willd.).

**Туя**, см. Жизненное дерево (*Thuja occidentalis* L.).

**Тщерица**, см. Амарантъ колосистый (*Amaranthus retroflexus* L.).

**Тыква**, см. Тыква кухонная (*Cucurbita maxima* Duch.).

**Тыква бутылочная** (*Cucurbita lagenaria* L.). Тыква кубышечная, Кубышка, Тыква кувшинчатая. Тыква-травянка, Горлянка, Тыква фляжная. Видъ тыквы обыкновенной, декоративное растение съ бутылкообразными плодами, которые употребляются на югѣ, какъ сосуды для воды.

**Тыква кубышечная** } см. Тыква бутылочная (*Cucurbita La-*  
**Тыква кувшинчатая** } *genaria* L.).

**Тыква кухонная** (*Cucurbita maxima* Duch.). Гарбузь (Юж. Росс.), Тыква, Кабъ къ, Дыня, Даяя, Баяя (особ. сортъ желтой тыквы). Видъ тыквы съ громадными съдобными плодами.

**Тыква настоящая**, см. Тыква обыкновенная (*Cucurbita Pepo* L.).

**Тыква обыкновенная** (*Cucurbita Pepo* L.). Бульба (Тул.), Гарбузь, Гарбузы (Мог., Курск., Смол.), Дуракъ (Донъ), Кабакъ (Малор.), Кабачки, Книжка, Тыква настоящая. Однодомное однолѣтнее растение изъ семейства «тыквенныхъ» (*Cucurbitaceae* Juss.), родомъ изъ Азіи, съ шершаво-волосистымъ очень длиннымъ стеблемъ, вѣтвистыми усиками и сердцевидными неясно-5-тилопастными листьями. Цвѣты крупныя, желтые. Чашечка 5-тизубчатая, лепестковъ 5, тычинокъ 5. Завязь нижняя. Плоды

большіе, гладкіе, шаровидные или овальные, мясистые и сочные. Цвететъ съ юня до августа. Воздѣлывается во многихъ и новыхъ сортахъ, ради съдобныхъ плодовъ, которые идутъ также на кормъ скоту.

**МЕДИЦИНСКОЕ УПОТРЕБЛЕНІЕ.** Сѣмена тыквы много десятковъ лѣтъ были известны въ Мексикѣ, Востъ-Индіи и Остъ-Индіи своимъ свойствомъ изгонять дѣточныя глисты; въ послѣдніе годы они примѣняются съ этою цѣлю и европейскими врачами. Для взрослого человека дается отъ 100 до 200 сѣмянъ, дѣт. мѣ—половина. Сѣмена очищаются отъ шкурки, и изъ нихъ готовится наста или мармеладъ. Черезъ 5—6 часовъ послѣ прѣма тыквы дается 1—2 стол. ло. ки маслороваго масла. Дѣченіе производится безъ всякаго подготовленія. Сѣмена тыквы иногда упот. болѣютъ еще и противъ бѣлей въ мочевомъ пузырьѣ. Изъ нихъ дѣлаютъ молоко такъ-же, какъ и изъ миндаля.

**Тыква сухая**, см. Вальзаминное дерево (*Momordica Balsamina* L.).

**Тыква-травяника**, см. Тыква бутылочная (*Cucurbita Lagenaia* L.).

**Тыква фигурная** (*Cucurbita Melopepo* L.). Турецкая чалма. Гарбузь. Тыква (Малор.). Видъ тыквы съ сплюснутыми шаровидными плодами, снабженными по краямъ выступами ввидѣ бугровъ. Декоративное растение.

**Тыква фляжная**, см. Тыква бутылочная (*Cucurbita Lagenaia* L.).

**Тырликъ** } см. Рогоза широколистная (*Typha latifolia* L.).

**Тырличъ** }

**Тырлычъ рѣчной**, см. Рогоза узколистная (*Typha angustifolia* L.).

**Тырса**, см. Ковыль волосистый (*Stipa capillata* L.).

**Тысячеголовникъ**, см. Тыс. чоголовъ (*Saponaria Vaccaria* L.).

**Тысячеголовъ** (*Saponaria Vaccaria* L., нынѣ *Vaccaria vulgaris* Host.). Прозорникъ (Полт.), Стоголовникъ, Тысячеголовникъ. Однолѣтнее травянистое; стеленіе изъ сѣмянъства «гвоздичныхъ», распространенное, главнымъ об. азомъ, въ средней и ю. ной Европѣ, встрѣчающ. еся нерѣдко въ южной Россіи, въ Крыму, на Кавказѣ и въ зап. Азіи. Стебель гладкій, сильно вѣтвистый; листья голубовато-зеленые, нижніе продолговатые, суженные при основаніи, стеблевые—сидячіе, при основаніи немного сердцевидные и сросшіеся, ланцетные. Красные цвѣты одиночныя; чашечка немного вздутая, съ 5 острыми гран. ми; леп. стковъ 5, лепестки обратно-яйцевидные, съ зубчатой пластинкой. Плодъ—короб. чка, при основаніи 4-хвѣздная, раскрывающаяся наверху 4-ми зубцами. Цвететъ лѣтомъ. Растетъ между посѣвами. На Тарбугатахъ киргизы употребляютъ траву отъ зубной боли. Растеніе считается вреднымъ для лошадей, у коровъ-же увеличиваетъ количество молока.

**Тысячелиственникъ розовый**, см. Валериана лекарственная (*Valeriana officinalis* L.).

**Тысячелистникъ**, см. Тысячелистникъ обыкновенный (*Achillea Millefolium* L.)

**Тысячелистникъ водяной**, см. Турча болотная (*Hottonia palustris* L.).

**Тысячелистникъ обыкновенный** (*Achillea Millefolium* L.).

Ведренець (Орл.), Волосиная трава (Кондр. 153), Волосецъ (Приарг. кр.), Выпадокъ (Влад.), Греча, Гречка, Гречица полевая, Греча дикая (Волог., Двиг.), Гречина трава (Кондр. 20), Гусиная гречка (Даль), Гречушка (Уфим.), Горчица (Новг. г.), Грыжная трава (Вятск.), Грудная трава (Смол.), Гулявица (Подол.), Гусинникъ (Даль), Девятихъ бѣлая и красная (Арх., Костр., Меркл.), Деревій (Малор.), Деревей (Вел. Рос.), Дервей, Дирвій, Деривій, Дыревей, Деривій женскій, Деривій полевой (Полт.), Деревій бѣлый, Дѣвичьи пунки (Алт.), Живучая трава (Кал., Пот.), Зміяная трава (Яросл.), Золотень (Кондр. 37), Кашка (Моск. и сос. губ.), Бѣлая кашка (Моск., Тул.), Грудная кашка, Мелкая кашка (Олон.), Дикая кашка (Каз.), Кашица (Влад.), Кашка бѣлоголовикъ (Кал. губ.), Красноцвѣтка (Вятск.), Кровавникъ (Зап. Росс.), Кривавникъ (Малор.), Крованыкъ (Вол.), Кровавленикъ (Вигеб.), Кровавница (Нижег.), Кривоускъ, т. е., Кровенускъ (Бѣлорос. Сл. Нос.), Ладанъ росной (въ Никол. станицѣ на Алтаѣ), Маквица (Тул.), Материнка (Даль) Матренка (Костр., Влад., Нижег., Даур.), Матрежка (Костр., Каз.), Мелкая трава (Арханг.), Мерчикъ (Волог.), Морковникъ (Курск. губ.), Носочистка (Вят., Сѣнн.), Пахучая трава (Смол.), Подорожница (Костр.), Порѣзь, Порѣзникъ (Тверск.), Порѣзная трава (Алт., Арханг., Костр., Тверск., Моск.), Опорѣзная (Нижег. г.), Урѣзная (Каз. г.), Рѣзунъ (Олон.), Рѣзка (Пск.), Растиральникъ (Тамб.), Рябинка лиловая (Вятск.), Разплеть (Олон.), Романка (Смол.), Романица (Волог. г.), Рудометка (Смол.), Сановникъ (Олон.), Серпорѣзь, Серборизъ, Серпоризъ (Малорос.), Серберѣзь (Чери.), Тысячелистникъ (Вел. Росс.), Узикъ бѣлый, Узикъ мелкій (Волог.), Сузикъ (Тамб.), Чиганды, Чипанъ, (Олон.), Ахиллея, Бѣлоцвѣтъ (Пет. г.), Бѣлоцвѣтка (Вятск.), Бѣль, Бѣлоголовецъ (Смол., Кал.), Бѣлоголовникъ (Курск., Вор., Сар.), Бѣлоголовникъ (Малор.), Бѣлоголовка горчица (Костр.), Бѣлошка (Н. в.), Цвѣтки бѣлые (Вятск.), Подбѣлъ (Смол., Черн., Могил.), Подбилъ, Подбѣлка (Черн.), Подбѣла красная (Могил.). Растеніе травянистое изъ семейства «сложноцвѣтныхъ» (*Compositae* Adams.), весьма распространенное повсюду странамъ Европы и Сибири, за исключеніемъ самыхъ холодныхъ, растетъ по песчанымъ обрывамъ, лугамъ, по опушкѣ лѣсовъ, кустарниковъ, вообще на сухихъ мѣстахъ. Корневище его короткое, вѣтвистое, многолѣтнее; стебель прямой, обыкновенно невѣтвистый, вмѣстѣ съ листьями шерстисто-мохнатый. высотой въ футъ или нѣсколько болѣе; листья по очертанію — ланцетовидные, глубоко двуперисто-раздѣльные, почти сложные, съ линейными заостренными 2—5-тиздрѣзными долями; общій черешокъ листа почти на всемъ протяженіи цѣльнокрайній или только близъ верхушки листа, слегка зубчатый; стебель и листья имѣютъ

вкусъ нѣсколько вяжущій и горькій отъ присутствія въ нихъ смолистыхъ и вяжущихъ веществъ; цвѣты собраны въ корзинку, окруженную многолистной оберткой, состоящей изъ наложенныхъ другъ на друга, подобно черепицѣ, тонкихъ чешуекъ, и сидятъ на плоскомъ концѣ цвѣтоста (общемъ ложѣ), усакенномъ пленками. Цвѣты изжелта-бѣлые, въ дискѣ обоюстные, правильные пятизубчатые; трубка ихъ большею частью сплюснутая, двухкрылая, при основаніи раздутая, литеровидная; тычинки, въ числѣ пяти, съ сочлененными близъ верхушки нитями и срастанными въ трубку пыльниками, выходятъ изъ трубки вѣнчика; завязь нижняя обь одной сѣмяпочкѣ; окружные цвѣты—женские бѣлые или розовые съ округленнымъ язычкомъ; столбикъ на верхушкѣ раздвоенный. Запахъ цвѣтовъ нѣсколько ароматичнѣе, чѣмъ у листьевъ, отъ присутствія въ нихъ помимо дубильныхъ и смолистыхъ веществъ, еще эфирнаго масла; вкусъ, какъ у листьевъ, горьковатый, пріятный, нѣсколько вяжущій. Цвѣтеть тысячелистникъ съ начала или середины іюня до середины октября. Сѣмяпочки сплюснуты, на верхушкѣ голыя или съ выдающимся кольцевымъ валикомъ. Сѣмена созрѣваютъ съ начала августа. Разводится тысячелистникъ черезъ разсаживаніе корней или сѣмянъ. (Табл. XLV, фиг. 257.)

**МЕДИЦИННОЕ УПОТРЕБЛЕНІЕ.** Въ прежнее время ты с я ч е л и с т н и к ъ довольно часто употреблялся въ медицинѣ, теперь-же онъ употребляется, только какъ народное средство, при плохомъ апетитѣ и слабомъ пищевареніи. Кромѣ того, онъ входитъ въ составъ многихъ горькихъ сборовъ. Свежевыжатый сокъ тысячелистника даютъ весною чахоточнымъ и малокровнымъ больнымъ. Собираютъ тысячелистникъ весною, траву берутъ вмѣстѣ съ верхушками и высушиваютъ. Употребляютъ высушенный тысячелистникъ видѣ настоя. 2 унца сушеной травы съ верхушками кладутъ въ закрытый сосудъ или чайникъ и заливаютъ 16-тью унцами (1 стаканомъ) кипятка, закрываютъ крышкой и оставляютъ на  $\frac{1}{2}$  часа, чтобы настой сѣмался крѣпче, затѣмъ его процѣживаютъ и пьютъ по чайной чашкѣ одинъ разъ въ день, утромъ натощакъ или на ночь, иногда выпиваютъ эту порцію въ два приема: одну половину чашки на ночь, другую—утромъ. Настой тысячелистника улучшаетъ апетитъ, уменьшаетъ развитіе газовъ въ кишечникѣ и вообще направляетъ пищевареніе; кромѣ того, его пьютъ отъ катарра дыхательныхъ путей и при остановкѣ мѣсячныхъ очищеній.

Въ гомеопатіи лекарство приготавливается изъ свѣжаго сока тысячелистника и въ особенности рекомендуется отъ появленія крови въ мочѣ и въ мокротѣ. Даютъ 1—2 капли перваго разведенія или-же чистой настойки и повторають пріемы по нѣсколько разъ въ день.

Въ ветеринарной медицинѣ тысячелистникъ даютъ животнымъ при поносѣ и боляхъ въ животѣ. Его также прибавляютъ въ кормъ коровамъ, у которыхъ безъ видимой причины уменьшается молоко. Отваромъ травы обмываютъ раны и зудящіе мѣста.

**ТЫСЯЧНИКЪ**, см. Уруть колосистый (*Myriophyllum spicatum* L.).  
**ТЪМЕНЪ**, см. Кошачьи лапки (*Antennaria dioica* Gaertn.).  
**ТЪЛО ВОЛЧЬЕ**, см. Сабельникъ болотный (*Comarum palustre* L.).  
**ТЪЛОРЪЗЪ БОЛЬШОЙ**, см. Тълоръзъ сабуровидный (*Stratiotes aloides* L.).

**ТЪЛОРЪЗЪ САБУРОВИДНЫЙ** (*Stratiotes aloides* L.). Водорѣзникъ (Уралъ), Водорѣзъ (Тв.), Воинокъ трава, Кровавикъ, Мурѣзъ, Остролистъ, Ногорѣзъ (Тв.), Порѣзъ (Мог.), Рѣзакъ (Малор.), Рѣзакъ, Рѣзунъ, Рѣзунья (Арх.), Рѣзъ и ошибочно Дорѣзъ, Рѣпчатая (Ниж.), Тѣлорѣзъ большой, Ядрорѣзъ. Многолѣтнее травянистое растение изъ семейства «водокрасовыхъ» (*Hydrocharitaceae* Dc.), распространенное во всей Европѣ, исключая крайняго сѣвера, въ сѣверной, средней и юго-западной Россіи, на Кавказѣ и въ Сибирѣ. Ползучее корневище погружено въ илъ. Листья сидячіе, линейно-ланцетные, колюче-пильчатые. Цвѣты бѣлые, двудомные, выступающіе надъ поверхностью воды. Чашечка 3-хлестная; вѣнчикъ 3-хлепестный. Тычинокъ 11—15; завязь нижняя 6-тигнѣзная; плодъ мясистый, ягодообразный. Цвѣтеть лѣтомъ. Растетъ въ стоячихъ и медленно текущихъ водахъ. (Рис. 306.)

**ТЪЛУНЪ**, см. Бухарникъ мягкій (*Holcus mollis* L.).

**ТЪНЬ НОЧНАЯ**, см. Тайникъ овальный (*Listera ovata* L.).

**ТЪНЬ НОЧНАЯ**, см. Ягода чечевичная (*Phytolacca decandra* L.).

**ТЪНЬ НОЧНАЯ**, см. Пасленъ сладко-горькій (*Solanum dulcamara* L.).

**ТЮЛЬПАНОЕ ДЕРЕВО**, см. Магнолія (*Magnolia grandiflora* L.).

**ТЮЛЬПАНЪ БѢЛЫЙ**, см. Тюльпанъ лѣсной (*Tulipa silvestris* L.).

**ТЮЛЬПАНЪ ДИКІЙ**, см. Касатикъ водяной (*Iris pseudacorus* L.).

**ТЮЛЬПАНЪ ЖЕЛТЫЙ**, см. Тюльпанъ садовый, или степной (*Tulipa gesneriana* L.).

**ТЮЛЬПАНЪ ЖЕЛТЫЙ МАЛЕНЬКІЙ**, см. Тюльпанъ лѣсной (*Tulipa silvestris* L.).

**ТЮЛЬПАНЪ КРАСНЫЙ**, см. Тюльпанъ садовый, или степной (*Tulipa gesneriana* L.).

**ТЮЛЬПАНЪ ЛѢСНОЙ** (*Tulipa silvestris* L.). Тюльпанъ бѣлый, Тюльпанъ желтый маленький. Луковичное многолѣтнее растение выш. 5½—11 вершк. изъ семейства «лилейныхъ» (*Liliaceae* Dc.), распространенное въ средней и южной Европѣ и изрѣдка встречающееся въ западной Россіи. Стебель несетъ отъ 1—3 линейно-ланцетныхъ листьевъ. Цвѣтокъ одиночный, желтый, до распѣтанія помятый, потомъ прямостоящій. Околоцвѣтникъ колокольчатый, о 6 заостренныхъ листочкахъ. Тычинокъ 6; завязь верхняя 3-хгнѣзная, съ 1 столбикомъ и 3-хлопастнымъ сидячимъ рыльцемъ. Плодъ—коробочка. Цвѣтеть весной. Растетъ въ лѣсахъ и между кустарниками. (Рис. 307.)

**ТЮЛЬПАНЪ ЛѢСНОЙ**, см. Горечавка крупная (*Gentiana Pneumonanthe* L.).

**ТЮЛЬПАНЪ САДОВЫЙ, или степной** (*Tulipa gesneriana* L.). Тюльпанъ желтый, Тюльпанъ красный, Ростъ, Таблэкъ (Урал.), Таблэкъ нашинскій, каружный. Многолѣтнее луковичное ра-

стеиe выш. 5½—11 вершк. изъ семейства «лилейныхъ» (Liliaceae DC.), встречающееся въ южной и юго-восточной Россіи и на Алтаѣ. Листья широко-ланцетные. Цвѣтокъ одиночный желтаго или ярко-краснаго цвѣта съ темнымъ пятномъ при основаніи. Околоцвѣтникъ колокольчатый о 6 заостренныхъ листочкахъ. Тычинокъ 6; завязь верхняя съ 1 столбикомъ и сидячимъ 3-хлонастнымъ рыльцемъ. Плодъ—коробочка. Растетъ въ степяхъ. Цвѣтетъ весной. Разводится въ садахъ въ многочисленныхъ простыхъ и махровыхъ сортахъ съ чрезвычайно разнообразной окраской околоцвѣтника. Луковицы его ѣдятъ во всемъ Уральскомъ войскѣ.

Тюромокъ, см. Одуванчикъ лекарственный (*Taraxacum Dens Leonis* Desf.).

Тютина, см. Тутовое дерево, шелковица черная (*Morus nigra* L.).

Тютина, см. Тутовое дерево, шелковица бѣлая (*Morus alba* L.).

Тютюнъ, см. Махорка (*Nicotiana rustica* L.).

Тюхтя, см. Смородина красная (*Ribes rubrum* L.).

Тягунъ, см. Поповникъ обыкновенный (*Chrysanthemum Leucanthemum* L.).

Тяжное дерево, см. Кизильникъ обыкновенный (*Cotoneaster vulgaris* Lindl.).

Тялухъ, см. Бухарникъ мягкій (*Holcus mollis* L.).

Тянучка, см. Вьюнокъ полевой (*Convolvulus arvensis* L.).

## У.

Убырь, см. Поповникъ непахучій (*Matricaria inodora* L.).

Увѣнокъ, см. Барвинокъ малый (*Vinca minor* L.).

Увѣчная трава, см. Кошутень европейскій (*Asarum europaeum* L.).

Увѣчная трава

Увѣчная морская трава } Хлопушка (*Silene inflata* Smith).

Угадникъ, см. Золотая розга (*Solidago Virgaurea* L.).

Угиречникъ, см. Огуречная трава (*Borrago officinalis* L.).

Угірокъ, см. Огурецъ огородный (*Cucumis sativus* L.).

Угримъ, см. Кровохлебка лекарственная (*Sanguisorba officinalis* L.).

Угризенте дьявольское, см. Сивецъ луговой (*Scabiosa succisa* L.).

Угрюмъ, см. Таволга рябинолистная (*Spiraea sorbifolia* L.).

Удавъ дерево (*Cerastrus scandens* L.). Высокій лазящій кустарникъ, родомъ изъ Сѣверной Америки, встречающійся въ нашихъ садахъ въ качествѣ декоративнаго вьющагося растенія для бесѣдокъ и шпалеръ.

Ударникъ, см. Манжетка обыкновенная (*Alchemilla vulgaris* L.).

Ударникъ, см. Вербейникъ обыкновен. (*Lysimachia vulgaris* L.).

Ударникъ, см. Ласточникъ обыкновенный (*Vincetoxicum officinale* Moench).

**Удивительный цвѣтъ**, см. Почная красавица (*Mirabilis Jalapa* L.).

**Удушная трава**, см. Икотникъ сѣро-зеленый (*Berteroa incana* DC.).

**Ужачье зелье**, см. Ласточникъ обыкновенный (*Vincetoxicum officinale* Moench.).

**Ужикъ**, см. Горлець, раковая шейка (*Polygonum Bistorta* L.).

**Ужикъ** } см. Подорожникъ ланцетный (*Plantago lanceolata* L.).

**Ужинъ** } см. Подорожникъ ланцетный (*Plantago lanceolata* L.).

**Ужинъ**, см. Заячья капуста (*Sedum Telephium* L.).

**Ужовка**, см. Горлець (*Polygonum Bistorta* L.).

**Ужовка**, см. Прыщенець (*Ranunculus Flammula* L.).

**Ужовка**, см. Сладкій корень (*Scorzonera hispanica* L.).

**Ужовникъ**, см. Купырь лѣсной (*Anthriscus silvestris* Hoffm.).

**Ужовникъ**, см. Колокольчикъ жестковолосый (*Campanula cervicaria* L.).

**Ужовникъ**, см. Ужовникъ общинн. (*Ophioglossum vulgatum* L.).

**Ужовчикъ**, см. Гречища земноводная (*Polygonum amphibium* L.).

**Ужовникъ**, см. Горлець, раковая шейка (*Polygonum Bistorta* L.).

**Ужовникъ**, см. Козелець приземистый (*Scorzonera humilis* L.).

**Ужовникъ**, см. Дубровка (*Veronica Chamaedrys* L.).

**Ужовникъ обыкновенный** (*Ophioglossum vulgatum* L.), Фармацевтическое назв.: *Ophioglossum*. Безъязычникъ, Язычникъ (Мал.), Деветерникъ, Сердечная трава (Вят.), языкъ змѣевъ или ужовый трава, Ужовникъ. Папоротникъ изъ семейства «ужовниковыхъ» (*Ophioglossaceae* R. Br.), распространенный въ большей части Европы, встрѣчающійся въ сѣверной и средней Россіи, въ Крыму, на Кавказѣ и въ Сибири, выш. отъ 3-хъ до 6 верш. Изъ короткаго подземнаго корневища выходитъ листь, раздѣленный на 2 части: одна изъ нихъ—безплодная—имѣетъ видъ обыкновеннаго яйцевидно-продолговатаго цельно-крайняго листа, другая-же—плодоносная—не развиваетъ зеленой пластинки, но несетъ на длинномъ черенкѣ простой колосъ съ 2-мя рядами спорангіевъ (вмѣстителя со спорами). Растетъ на влажныхъ лугахъ и верешатникахъ.

**Ужъ**, см. Спорынья (*Sclerotium Clavus* DC.).

**Узикъ**, см. Касатикъ водяной (*Iris pseudacorus* L.).

**Узикъ**, см. Подорожникъ ланцетный (*Plantago lanceolata* L.).

**Узикъ**, см. Подорожникъ средний (*Plantago media* L.).

**Узикъ бѣлый** } см. Тысячелистникъ обыкновенный (*Achillea*

**Узикъ мелкій** } *Millefolium* L.).

**Узинъ**, см. Подорожникъ ланцетный (*Plantago lanceolata* L.).

**Узкая трава**, см. Ленъ дикий (*Linaria vulgaris* Mill.).

**Узорная трава**, см. Гулявникъ лекарственный (*Sisymbrium officinale* L.).

**Уквапъ** } см. Кошачьи лапки (*Antennaria dioica* Gärtn.).

**Уквапъ трава** } см. Кошачьи лапки (*Antennaria dioica* Gärtn.).

**Укладникъ**, см. Астрagalъ солодколистный (*Astragalus glycyphyllos* L.).

**Укладникъ**, см. Душевикъ остролистный (*Calamintha Acinos* Benth.).

**Укладникъ**, см. Ясколка обыкновенная (*Cerastium vulgatum* L.).

**Укладникъ**, см. Чина лѣсная (*Lathyrus silvestris* L.).

**Укладникъ**, см. Чина черная (*Orobus niger* L.).

**Укладникъ боровый**, см. Душевикъ остролистный (*Calamintha Acinos* Benth.).

**Уколюка**, см. Зольникъ калийный (*Salsola Kali* L.).

**Укота сѣрая** } см. Икотникъ сѣро-зеленый (*Berteroa*

**Укотникъ бѣловатый** } *incana* De.).

**Укрепъ**, см. Укропъ огородный (*Anethum graveolens* L.).

**Укретъ**, см. Борецъ желтый (*Asopitum lycosyonum* L.).

**Укропникъ**, см. Поручейникъ широколистный (*Sium latifolium* L.).

**Укропникъ**, см. Укропъ конскій (*Oenanthe Phellandrium* L.).

**Укропникъ**, см. Дрокъ красильный (*Genista tinctoria* L.).

**Укропъ**, см. Укропъ огородный (*Anethum graveolens* L.).

**Укропъ водяной**, см. Укропъ конскій (*Oenanthe Phellandrium* L.).

**Укропъ дикій**, см. Бедренецъ обыкновенный (*Pimpinella Saxifraga* L.).

**Укропъ дикій**, см. Сныть обыкновенная (*Aegopodium Podagraria* L.).

**Укропъ итальянскій**, см. Уруть колосистый (*Myriophyllum spicatum* L.).

**Укропъ конскій** (*Oenanthe Phellandrium* Lam.). Фармацевтическое назв: *Phellandrium* s. *Foeniculum aquaticum*. Вабинникъ водяной (Тавр.), Вехъ малый, Морковникъ водяной, Пустоселъ, Пустырникъ, Раздулка, Склизь, Кминъ водяной (Вол., Под.), Галахъ, Гирча, Кропъ, Укропникъ, Укропъ водяной, Конское сѣмя, Омежникъ водяной, Омегъ водяной, Омегъ малый, Собачья петрушка, Камеломъ, Круши-камень, Кропило водяное. Болотное многолѣтнее растение изъ семейства «зонтичныхъ» (*Umbelliferae* Juss.), распространенное почти во всей Европѣ и почти во всей Россіи. Корень тонкій, веретенообразный; стебель выш. 6—18 вершк., очень вѣтвистый, съ растопыренными вѣтвями. Воздушные листья двояко или тройко-перистые, съ мелкими яйцевидно-перисто-надрѣзанными долями; подводные листья мелко разрѣзаны на длинныя нитевидныя доли. Сложные зонтики супротивны листьямъ о 7—12 лучахъ. Цвѣты мелкіе, бѣлые. Чашечка 5-тизубчатая; вѣнчикъ 5-тилепестный; тычинокъ 5. Завязь нижняя двугрѣзная, съ 2-мя столбиками. Плодъ—продолговатая двусѣмянка, распадающаяся по созрѣваніи на 2 плодика и снабженная 5 широко-нитевидными, слабо-выдающимися ребрами. Цвѣтетъ лѣтомъ. Растетъ на тонкихъ лугахъ.

**Медицинское употребленіе.** Водяной, или конскій укропъ содержитъ въ своихъ сѣменахъ бальзамическое вещество, которое дѣйствуетъ возбуждающимъ образомъ на кишечный каналъ и на ды-



хательные органы. Въ прежнее время растение это употреблялось врачами, какъ средство, способствующее отдѣленію мокроты при ея обильномъ накопленіи въ легкихъ, въ зависимости отъ простого катарра бронхъ или отъ чахотки. Сѣмена водяного укропа даются въ отварѣ и кашкахъ отъ 0,5—1,0—2,0 грам. (8 гр.—16 гр.—30 гр.) на пріемъ по нѣсколько разъ въ день. Изъ сѣмянъ водянаго укропа въ аптекахъ приготавливаютъ еще экстрактъ, сиропъ и спиртную настойку. Въ народѣ изъ сѣмянъ водянаго укропа дѣлаютъ припарки.

Въ ветеринарной практикѣ сѣмена этого растения даютъ лошадямъ отъ зоба, почему растение и носить названіе лошадиныхъ сѣмянъ.

Въ гомеопатіи настойкой лечатъ различныя грудныя болѣзни.

Укропъ лѣсной, см. Жеруха лѣсная (*Nasturtium silvestre* R. Br.).

Укропъ обыкновенный воложекій (*Foeniculum vulgare* Gärtn.). Фенхель, Укропъ сладкій. Многолѣтнее травянистое растение изъ семейства «зонтичныхъ» (*Umbelliferae* Juss.), встречающееся въ южной Европѣ, въ Крыму и на Кавказѣ. Стебель прямостоячій, выш. 1½ арш. до 1 саж. Листья мелко-разсѣченные, съ нитевидными долями. Сложные зонтики плоскіе о 15—20 лучахъ безъ обвертокъ и обверточекъ. Цвѣты мелкіе желтые. Чашочка 5-тизубчатая; лепестковъ и тычинокъ по 5. Завязь нижняя 2-хлѣздная, съ 2-мя столбиками. Плодъ—продолговатая двусѣмянка, распадающаяся по созрѣваніи на 2 плодика съ 5-ю выдающимися толстыми тупыми ребрами. Разводятся въ нѣсколькихъ сортахъ ради плодовъ, которые имѣютъ примѣненіе въ медицинѣ, въ косметическомъ производствѣ, а также служатъ, какъ и зелень, приправою къ кушанью. (Рис. 208.)

**МЕДИЦИННОЕ УПОТРЕБЛЕНІЕ.** Сѣмена укропа содержатъ въ себѣ эфирное масло, которое дѣйствуетъ подобно анисовому, только менѣе его раздражаетъ стѣнки кишокъ и желудка. Укропъ—давнишнее средство; его описаніе встрѣчается еще у Гиппократы и Dioscorida, самыхъ древнихъ врачей. Они хвалятъ его, какъ вѣтрогонное и отхаркивающее средство. Въ древности употреблялись не одни только сѣмена, но также и всѣ другія части растения. Въ настоящее время укропъ употребляется врачами очень часто въ дѣтской практикѣ, отъ болѣй въ животѣ, обусловленныхъ вѣзучіемъ кишокъ, вслѣдствіе скопленія газовъ. Дѣтямъ укропъ дается въвидѣ укропной воды, которая прибавляется къ различнымъ микстурамъ, напр., къ касторовой эмульсіи, къ эмульсіи изъ миндаля или миндальнаго масла, къ микстурѣ съ ревенемъ и содой. На 2 унціи микстуры прибавляютъ отъ 2-хъ драхмъ до ½ унціи укропной воды (8,0—15,0 гр.). Взрослымъ съ тою-же цѣлью, кромѣ укропной воды, даютъ сахаръ съ укропнымъ масломъ (*oleosacchar. foeniculi*), на пріемъ берется по 5-ти гранъ (0,3 гр.) укропнаго сахара; укропную воду взрослые принимаютъ столовыми ложками. Укропу приписывается, кромѣ того, свойство дѣйствовать, какъ слабое отхаркивающее средство и помогающее отдѣленію молока у кормящихъ

грудью. Снаружи укропная вода употребляется въ домашнемъ быту для глазной примочки. Укропное масло, смѣшанное съ свинымъ саломъ, уничтожаетъ головныхъ насѣкомыхъ.

Въ ветеринарной практикѣ укропъ употребляется въ тѣхъ-же случаяхъ заботѣваній, какъ и анисъ, только онъ дѣйствуетъ нѣжнѣе аниса, потому во многихъ случаяхъ предпочитается послѣднему.

**Укропъ огородный** (*Anethum graveolens* L.). Фармацевтическое назв.: *Anethum*. Копръ (Слав.), Авиць, Укропъ, Кропъ, Копръ, Коперь, Копюръ, Тимонъ, Цапъ (Тамб.), Окропъ (Малор.), Окрипъ, Окрипъ, Крипъ, Укрипъ, Кронецъ. Однолѣтнее травянистое растение изъ семейства «зонтичныхъ» (*Umbelliferae* Juss.), распространенное въ южной Европѣ, Египтѣ и Персін. Стебель круглый; листья яйцевидные, глубоко-тройко-перистые, съ нитевиднѣйшими долями; мелкіе желтые цвѣты въ сложныхъ зонтикахъ безъ обертокъ и обвѣточекъ. Зубцы чаще ли незамѣтны. Лепестковъ 5, желтыхъ, почти округлыхъ. Тычинокъ 5. Завязь нижняя 2-хлѣздная, съ 2-мя столбиками. Плодъ—продолговатая двусѣмянка. Цвѣтетъ во второй половинѣ лѣта. Разводится въ садахъ и огородахъ, иногда встрѣчается на сорныхъ мѣстахъ.

**Укропъ полевой**, см. Горницвѣтъ весенній (*Adonis vernalis* L.).

**Укропъ сладкій**, см. Укропъ обыкновенный воложскій (*Foeniculum vulgare* Gärtn.).

**Укропъ Христовъ**, см. Борецъ желтый (*Aconitum lycoctonum* L.).

**Укрытъ**, см. Борецъ желтый (*Aconitum lycoctonum* L.).

**Укрытъ**, см. Колокольчикъ жестковолосый (*Campanula cervicaria* L.).

**Укусникъ**, см. Укусное дерево (*Rhus typhinum* L.).

**Укусное дерево** (*Rhus typhinum* L.). Сумахъ большой виргинскій, Укусникъ, Олений рогъ. Дерево, достигающее выш. 2-хъ сажень, изъ семейства «Terebinthinae». Молодые вѣтви и побѣги буровато-пушистые. Листья темно-перистые, раздѣленные на ланцетныя доли. Родомъ изъ Сѣверной Америки, но почти распространенное въ Европѣ, гдѣ часто встрѣчается также въ садахъ и паркахъ. Листья въ Сѣверной Америкѣ употребляются для дубленія. Красные плоды дерева подмывиваются къ уксусу для приданія ему большей крѣпости (сѣверо-американскій уксусъ). Древесина служитъ, какъ подѣлочный матеріалъ.

**Укушеніе дьявольское**, см. Сивецъ луговой (*Scabiosa succisa* L.).

**Улабникъ**, см. Ланчатка серебристая (*Potentilla argentea* L.).

**Уманъ** } см. Девясилъ подсолнечный (*Inula Helenium* L.).

**Умень** }

**Умъ б бій**, см. Качимъ метельчатый (*Gypsophila paniculata* Led.).

**Умъ бабій**, см. Зольникъ калийный (*Salsola Kali* L.).

**Умъ да разумъ**, см. Просо воробьиное (*Anagallis arvensis* L.).

**Уразная трава**, см. Соколіи перелетъ (*Gentiana cruciata* L.).

- Уразная трава, см. Герань луговая (*Geranium pratense* L.).
- Уразная трава, см. Смолка (*Lychnis Viscaria* L.).
- Уразная трава, см. Гречиха птичья (*Polygonum aviculare* L.).
- Уразная трава, см. Зячья калуста (*Sedum Telephium* L.).
- Уразная трава, см. Гулявникъ лекарственный (*Sisymbrium officinale* L.).
- Уразная трава, см. Осотъ полевой (*Sonchus arvensis* L.).
- Уразная трава, см. Коровякъ черный (*Verbascum nigrum* L.).
- Уразная трава, см. Вероника ручейная (*Veronica Beccabunga* L.).
- Уразникъ, см. Вероника лекарственная (*Veronica officinalis* L.).
- Уразникъ } см. Горечавка крупноцвѣтная (*Gentiana Pneumonanthe* L.).
- Уразница } *panthe* L.).
- Уразница, см. Стародубка (*Gentiana Amarella* L.).
- Ургуй, см. Сонъ-трава (*Anemone patens* L.).
- Урнеръ, см. Майникъ двулистный (*Majanthemum bifolium* L.).
- Урочная трава, см. Колючникъ обыкновенный (*Carlina vulgaris* L.).
- Урочная трава, см. Сняуха обыкновенная (*Polemonium coeruleum* L.).
- Урочная трава, см. Вероника лекарственная (*Veronica officinalis* L.).
- Урочникъ, см. Колючникъ обыкновенный (*Carlina vulgaris* L.).
- Урочникъ, см. Подмаренникъ желтый (*Galium verum* L.).
- Урутъ, см. Урутъ колосистый (*Myriophyllum spicatum* L.).
- Урутъ колосистый (*Myriophyllum spicatum* L.). Фармацевтическое название: *Millefolium aquaticum* s. *repens*. Греча дикая, Водоперица, Кровавикъ водяной, Перо орлово, Тысячникъ, Укропъ итальянскій, Урутъ, Шпешекъ болотный. Водяное многолѣтнее растение изъ семейства «онагриковыхъ» (*Onagraceae* Juss.), распространенное во всей Европѣ и въ Россіи, укореняющееся на днѣ прудовъ, озеръ и канавъ. Отъ ползучаго корневища отходятъ длинныя стебли, достигающіе иногда поверхности воды. Листья мутовчатые, болѣею частью по 4 листа въ кольцо, пластинка ихъ перисто-раздѣлена на нитевидныя доли. Невзрачныя розовыя цвѣты собраны на концахъ вѣтвей колосьями, выступающими надъ водой; на верхней части цвѣтоноса сидятъ тычиночныя цвѣты, а на нижней — пестичныя. Чашечка глубоко-4-храздѣльная, лепестковъ 4; тычинокъ 8; пестичныя цвѣты съ мелкими долями чашечки и маленькими отогнутыми лепестками, съ 4-хгранной нижней 4-хгнѣздной завязью и 4 крупными вереничатыми рыльцами. Плодь распадающійся на 4 костянки. Цвѣтетъ лѣтомъ. Листья по своей жесткости употребляются для полировки дерева. (Рис. 309.)
- Урѣзная трава, см. Подмаренникъ болотный (*Galium palustre* L.).
- Урѣзная трава, см. Ленъ дикий (*Linaria vulgaris* Mill.).
- Урюкъ, см. Абрикосъ обыкновенный (*Armeniac vulgaris* Lam.).

- Усатка**, см. Пшеница обыкновенная (*Triticum vulgare* L.).
- Ускопная трава**, см. Желтушник левкойный (*Erysimum cheiranthoides* L.).
- Ускопная трава**, см. Ятрышник широколистный (*Orchis latifolia* L.).
- Ускопная трава**, см. Вороний глаз (*Paris quadrifolia* L.).
- Ускопъ**, см. Желтушник левкойный (*Erysimum cheiranthoides* L.).
- Усникъ**, см. Бѣлоусъ обыкновенный (*Nardus stricta* L.).
- Усовая трава**, см. Желтушник левкойный (*Erysimum cheiranthoides* L.).
- Усовая трава**, см. Герань луговая (*Geranium pratense* L.).
- Усовая трава**, см. Гулявникъ лекарственный (*Sisymbrium officinale* L.).
- Усовая трава**, см. Гулявникъ струйчатый (*Sisymbrium Sophia* L.).
- Уста львиная**, см. Львиный зѣвъ большой (*Antirrhinum majus* L.).
- Устели землю**, см. Подмаренникъ дѣпкій (*Gallium Aparine* L.).
- Устели камень**, см. Нивянка восьмилепестная (*Dryas octopetala* L.).
- Уступа вовча**, см. Герань кроваво-красная (*Geranium sanguineum* L.).
- Утевникъ**, см. Гречиха земноводная (*Polygonum amphibium* L.).
- Утесникъ**, см. Утесникъ обыкновенный (*Ulex europaeus* L.).
- Утесникъ обыкновенный** (*Ulex europaeus* L.). Дѣль каменный, Дрогъ колючій, Золотохворостъ, Золотохвостъ, Тернъ, Терновникъ дикій, Утесникъ. Кустарникъ выш. 14—28 вершк. изъ семейства «мотыльковыхъ» (*Papilionaceae* L.), распространенный въ Германіи и во Франціи. Вѣтви оканчиваются острыми, твердыми колючками. Листья очередные, линейно-ланцетные, заостренные. Цвѣты желтые, одиночные. Чашечка раздѣлена до основанія на 2 губы; вѣтчикъ 5-тилепестный, мотыльковый (флагъ, 2 крыла, лодочка, состоящая изъ 2 сросшихся лепестковъ); тычинокъ 10, однобратственныхъ (сросшихся нитями въ одинъ пучокъ). Плодъ—бобъ. Цвѣтетъ въ маѣ и юнѣ. Растетъ на холмахъ, песчаныхъ и каменистыхъ мѣстахъ.
- Утина журавлиная**, см. Антисъ цикутный (*Erodium cicutarium* L.).
- Утиная трава**, см. Манникъ обыкновенный (*Glyceria fluitans* R. Br.).
- Утиная трава**, см. Ряска маленькая (*Lemna minor* L.).
- Утичы гыѣздышки**, см. Гумайка лекарственная (*Anchusa officinalis* L.).
- Утренникъ**, см. Котовикъ кошачій (*Nepeta Cataria* L.).
- Утробашень**, см. Очитокъ острый (*Sedum acre* L.).
- Утробникъ**, см. Пролѣска (*Anemone Hepatica* L.).
- Утробникъ**, см. Плакунъ-трава (*Lythrum Salicaria* L.).
- Ухо волчье**, см. Запникъ клубненосный (*Phlomis tuberosa* L.).

- Ухо лошаково, см. Окопникъ лекарственный (*Symphytum officinale* L.).
- Ухо медвѣжье, см. Толокнянка обыкновенная (*Arctostaphylos officinalis* Moench.).
- Ухо медвѣжье, см. Девясилъ подсолнечный (*Inula Helenium* L.).
- Ухо медвѣжье, см. Рдестъ плавающий (*Potamogeton natans* L.).
- Ухо медвѣжье, см. Пижма (*Tanacetum vulgare* L.).
- Ухо медвѣжье, см. Коровякъ черный (*Verbascum nigrum* L.).
- Ухо медвѣжье, см. Медвѣжье ухо (*Verbascum Thapsus* L.).
- Ухо медвѣжье, см. Коровякъ мохнатый (*Verbascum phlomidis* L.).
- Ухо мышье, см. Незабудка болотная (*Myositis palustris* With.).
- Ухо оленье, см. Медвѣжье ухо (*Verbascum Thapsus* L.).
- Ухо человѣчье, см. Копытень европейскій (*Asarum europaeum* L.).
- Ушва, см. Спаржа обыкновенная (*Asparagus officinalis* L.).
- Ушевникъ, см. Очанка лекарственная (*Euphrasia officinalis* L.).
- Уши бѣличьи, см. Вербейникъ обыкновенный (*Lysimachia vulgaris* L.).
- Уши заячьи, см. Ландышъ майскій (*Convallaria majalis* L.).
- Уши котовы, см. Клеверъ пашенный, или кошачій (*Trifolium agtarium* L.).
- Уши кукушкины, см. Ландышъ майскій (*Convallaria majalis* L.).
- Ушки, см. Ландышъ майскій (*Convallaria majalis* L.).
- Ушки верблюжьи, см. Медвѣжье ухо (*Verbascum Thapsus* L.).
- Ушки волчьи, см. Медвѣжье ухо (*Verbascum Thapsus* L.).
- Ушки заячьи, см. Сабельникъ болотный (*Comarum polustre* L.).
- Ушки заячьи, см. Ландышъ майскій (*Convallaria majalis* L.).
- Ушки заячьи, см. Васильки рогаые (*Delphinium consolida* L.).
- Ушки лисьи, см. Мелколепестникъ ѣдкій (*Erigeron acris* L.).
- Ушки медвѣжьи, см. Медвѣжье ухо (*Verbascum Thapsus* L.).
- Ушко, см. Вахта трилистная (*Menyanthes trifoliata* L.).
- Ушко медвѣжье, см. Аврикула (*Primula Auricula* L.).
- Ушко мышье, см. Ястребинка волосистая (*Hieracium Pilosella* L.).
- Ушко мышье, см. Мокрица (*Stellaria media* Smith.).
- Ушко суходольное, см. Ландышъ майскій (*Convallaria majalis* L.).
- Ушница, см. Стрѣлолистъ обыкновенный (*Sagittaria sagittaeifolia* L.).
- Уязиль, см. Анисникъ пикутный (*Erodium cicutarium* L.).

## Ф.

- Фарбовникъ, см. Байда красильная (*Isatis tinctoria* L.).
- Фасоль, см. Фасоль обыкновенная (*Phaseolus vulgaris* L.).
- Фасоль египетская (*Lablab vulgaris* Jav.). Лаблабъ. Вьющеяся

бобовое растеніе, распространенное въ Остѣ-Индіи и Египтѣ, гдѣ спѣлые плоды и сѣмена употребляютъ въ пищу. У насъ встрѣчается въ садахъ, какъ декоративное растеніе.

**Фасоль низкорослая** (*Phaseolus compressus* De.). Низкорослые турецкіе бобы. Фасоль пѣшая (Малор.), Квасоля пѣша (Малор.). Разновидность фасоли обыкновенной (опис. см. ниже: «фасоль обыкновенная») съ короткимъ не выходящимъ стеблемъ. Разводится въ огородахъ, употребляется въ пищу.

**Фасоль обыкновенная** (*Phaseolus vulgaris* L.). Фармацевтическое назв.: *Phaseolus s. Fabealba* (Semen.). Бобы коловые, Бобы турецкіе, Коралевый цвѣтъ, Фасоль, Фасоль пѣшая низкорослая, Фасоли, Квасоля, Хвасоля, Кобилеха, Кобилица, Каранка (съ черными зернами). Однолѣтнее травянистое растеніе изъ семейства «мотыльковыхъ» (*Papilionaceae* L.), родомъ, какъ предполагаютъ, изъ Южной Америки. Стебель вьющійся, отъ 7 вершк. до  $1\frac{1}{2}$  сажени. Листья тройчатые, цвѣтоносы короче листьевъ. Бѣлые, розоватыя или фіолетовые цвѣты собраны въ небольшомъ числѣ кистями. Чашечка двугубая; верхняя губа съ 2-мя, нижняя—съ 3-мя зубцами. Вѣнчикъ мотыльковый. 5-ти-лепестный (флагъ, крылья и лодочка изъ 2-хъ сросшихся лепестковъ). Лодочка клявообразно удлинненная. Тычинокъ 10; изъ нихъ 9 сросшихся нитями вмѣстѣ, 10-я (верхняя) свободная. Завязь одногнѣздная, съ 1 столбикомъ. Плодь—линейные, почти прямые, гладкіе, повислые бобы. Сѣмена обыкновенно бѣлые, съ маленькимъ продолговатымъ рубчикомъ. Цвѣтеть лѣтомъ. Всюду воздѣлывается на поляхъ и огородахъ въ многочисленныхъ сортахъ, отличающихся между собой по формѣ плодовъ и стѣблей, а также окраской плодовъ и сѣмянъ. (Рис. 310.)

**МЕДИЦИНСКОЕ УПОТРЕБЛЕНІЕ.** Бобы высушиваются и превращаются въ муку. Бобовая мука въ домашнемъ быту служитъ для присыпки кожи отъ рожистаго воспаления. Также мука эта идетъ въ аптекахъ, какъ безвредное вещество, для образованія пилульной массы при приготовленіи различныхъ пилуль.

**Фасоль огненная** (*Phaseolus multiflorus* Willd.). Бобы турецкіе, Бобы цвѣтушіе, Бобы испанскіе, Коралловый цвѣтъ, Кораливъ цвѣтъ, Красный цвѣтъ, Красоля (Малор.), Фасоль червона. Вьющееся растеніе изъ семейства «мотыльковыхъ» (*Papilionaceae* L.), родомъ изъ Южной Америки. Листочки яйцевидные, коротко или остро-заостренные; цвѣты ярко-красные или пестрые (флагъ красный, крылья бѣлые) въ многоцвѣтковыхъ кистяхъ. Сѣмена бѣлые или красныя съ черными пятнами. Часто разводится въ садахъ для украшенія. Бобы могутъ быть употребляемы въ пищу.

**Фасоль пѣшая**, см. Фасоль низкорослая (*Phaseolus compressus* L.).  
**Фасоль пѣшая низкорослая**, см. Фасоль обыкновенная (*Phaseolus vulgaris* L.).

**Фасоль червона**, см. Фасоль огненная (*Phaseolus multiflorus* Willd.).

**Фасоля**, см. Фасоль обыкновенная (*Phaseolus vulgaris* L.).

**Фелоникъ**, см. Кирказонъ обыкновен. (*Aristolochia Clematidis* L.).

**Фенхель**, см. Укропъ воложскій (*Foeniculum vulgare* Gärtn.).

**Фенхель китайскій**, см. Батьянъ-трава (*Illicium anisatum* L.).

**Фенхель флорентійскій** (*Foeniculum officinale* All.). Растеніе весьма близкое къ нашему анису и укропу, произрастающее въ южной Европѣ, по берегамъ Средиземнаго моря и въ Греціи; разводится въ садахъ и на поляхъ. Имѣетъ большое примѣненіе въ медицинѣ.

**МЕДИЦИНСКОЕ УПОТРЕБЛЕНІЕ** флорентійскаго фенхеля то-же, что и укропа обыкновеннаго (*Foeniculum vulgare*).

**Фига**, см. Смоковница обыкновенная (*Ficus carica* L.).

**Фига индѣйская**, см. Смолва индѣйская (*Opuntia Ficus indica* Mill.).

**Фига сухая трава**, см. Папайя (*Papaya vulgaris* Dc.).

**Фиги**, см. Смоковница обыкновенная (*Ficus carica* L.).

**Филатика**, см. Рогоза узколистная (*Typha angustifolia* L.).

**Филейникъ** } см. Кирказонъ обыкновенный (*Aristolochia Cle-*  
**Филильникъ** } *matitis* L.).

**Филичева трава**, см. Борецъ спній (*Aconitum Napellus* L.).

**Филійникъ**, см. Кирказонъ обыкновенный (*Aristolochia Clematidis* L.).

**Филовникъ**

**Филоникъ**

**Филоникъ степной**

**Филонникъ**

**Филѣйникъ**, см. Кирказонъ обыкновенный (*Aristolochia Clematidis* L.).

**Финики**, см. Пальма финиковая (*Phoenix dactylifera* L.).

**Финиковая пальма** } см. Пальма финиковая (*Phoenix dactylifera* L.).  
**Финиковое дерево** }

**Финикъ**, см. Пальма финиковая (*Phoenix dactylifera* L.).

**Финикъ дикій** (*Diospyros Lotus* L.). Бобъ турецкій, Бобъ грецкій, Хурма. Дерево, достигающее нѣсколькихъ сажень вышины, произрастающее въ сѣверной Африкѣ и на Востокѣ. Шарообразныя, величиною почти съ вишню, синевато-черныя, сладковатыя ягоды употребляются въ пищу. Изъ нихъ готовится сиропъ и родъ вина. Древесина доставляетъ прекрасный строительный и подѣлочный матеріалъ и извѣстна подъ именемъ «зеленаго збеноваго дерева». Дерево культивируется въ южной Европѣ.

**Финикъ низкій**, см. Бананъ (*Musa paradisiaca* L.).

**Финовникъ**, см. Кирказонъ обыкновенный (*Aristolochia Clematidis* L.).

**Финовникъ болотный**, см. Касатикъ водяной (*Iris pseudacorus* L.).

**Фираяя**, см. Звѣздчатка злачная (*Stellaria graminea* L.).

**Фирлетка**, см. Дрема кукушкинъ цвѣтъ (*Lychnis flos cuculi* L.).

**Фисташки**, см. Фисташковое дерево (*Pistacia vera* L.).

**Фисташки лѣсныя**, см. Клекача перистая (*Staphylea pennata* L.).

**Фисташковое дерево** (*Pistacia vera* L.). Клекотино дерево, а плоды—фисты. Орѣхи персидскіе, Фисташки. Высокое дерево съ перистыми разбѣшенными листьями, родомъ изъ Персіи и Сиріи, культивируемое во всѣхъ странахъ около Средиземнаго моря. Его красноватая, внутри свѣтло-зеленая, продолговатая маслянистая сѣмена (фисташковые орѣхи, фисташки) сладки и пріятны на вкусъ, доставляютъ масло, употребляются въ пищу въ сыромъ видѣ и подобно миндалю, имѣютъ примѣненіе также въ кондитерскомъ производствѣ.

**Фіалка, см. Мыльнянка лекарственная** (*Saponaria officinalis* L.).

**Фіалка, см. Фіалка собачья** (*Viola canina* L.).

**Фіалка бѣлая, см. Желтофіоль садовый** (*Cheiranthus Cheiri* L.).

**Фіалка гвоздичная, см. Левкой** (*Matthiola annua* L.).

**Фіалка горная, см. Жирянка обыкновенная** (*Pinguicula vulgaris* L.).

**Фіалка дикая, см. Иванъ чай** (*Epilobium angustifolium* L.).

**Фіалка душистая, см. Левкой** (*Matthiola annua* L.).

**Фіалка душистая** (*Viola odorata* L.). Фармацевтическое назв.: *Violaria*, s. *Viola Martis* (Semen), *Flores Violae odoratae*. Бышынныкъ (Умань), Веселые глазки, Маткина душка (Орл.), Коньски копытці (Умань), Підлісокъ (Малор.), Фіалка пахучая, Фіалокъ пунцовый, Троицный цвѣтъ. Многолѣтнее травянистое растеніе изъ семейства «фіалковыхъ» (*Violaceae* DC.), распространенное во всей части Европѣ, въ средней и южной Россіи и въ Сибири, выш. до 3½ вершк., съ ползучимъ корневищемъ, выпускающимъ длинныя стелющіеся побѣги. Воздушнаго стебля нѣтъ. Листья прикорневые, округло-яйцевидные, при основаніи съ глубокой сердцевидной выемкой; прилистники ланцетные. Фіолетовые, рѣже розовые или бѣлые цвѣты сидятъ поодиночкѣ на длинныхъ цвѣткахъ. Чашелистиковъ, лепестковъ и тычинокъ по 5. Чашелистики тупые. Изъ лепестковъ—нижній на верхушкѣ выемчатый, снабженъ шпорцемъ, прочіе округлые на верхушкѣ, 2 боковые менѣе крупныя. Тычинки съ короткими нитями. Завязь одногнѣздная, съ простымъ столбикомъ; рыльце съ загнутымъ внизъ носикомъ. Плодъ—одногнѣздная, шарообразная, пушистая 3-хстворчатая коробочка съ нескладывающимися створками. Цвѣтетъ весной. Растетъ между кустарниками и на опушкѣ лѣсовъ. Душистые цвѣты употребляются въ парфюмерномъ производствѣ.

**МЕДИЦИНСКОЕ УПОТРЕБЛЕНІЕ.** Трава и вѣтвы душистой фіалки прежде считались целебнымъ средствомъ отъ каменной болѣзни и употреблялись еще, какъ рвотное и слабительное средство. Цвѣты считались полезными отъ энтерическ. судорогъ и другихъ нервныхъ припадковъ, сиромъ фіалковый давали отъ удущья. Такую славу фіалкѣ составили ея запахъ и цвѣты, теиерь она совсемъ оставлена.

Въ гомеопатіи настойка изъ свѣжихъ цвѣтовъ фіалки употребляется отъ тоски, чувства тяжести въ груди, слабой памяти, головокруженія, боли и судорогъ въ вѣкахъ, близорукости,



шума въ ухахъ, также сердцебіенія и боли въ груди. Даютъ 1—2 капли чистой настойки или 1-го, 2-го, 3-го разведенія по нѣсколько разъ въ день.

**Фіалка желтая**, см. Желтофіоль садовый (*Cheiranthus Cheiri* L.).

**Фіалка лунная**, см. Лунникъ многолѣтній (*Lunaria biennis* Moench.).

**Фіалка лѣсная**, см. Фіалка собачья (*Viola canina* L.).

**Фіалка ночная**, см. Фіалка ночная обыкновенная (*Hesperis matronalis* L.).

**Фіалка ночная**, см. Ослинникъ двулѣтній (*Oenothera biennis* L.).

**Фіалка ночная** (*Platanthera bifolia* Rich.). Бальзаминъ дикій, Боякъ (Волын.), Духи ночные, Гвоздика (Твер.), Дѣтская трава, Жасминъ полевой (Кал., Смол.), Завязный корень (Яросл.), Зеленьки (Могил.), Конвалія, Команитникъ (Могил.), Кукушкины слезки (Моск. и друг.), Кукушникъ (Двин.), Кукушница двулистная, Любовный корень, Ладышъ (Тв.), Любка (Малор.), Любка (Кал., Смол.), Ночная красавица, Материкъ (Олон.), Передой (Вятск.), Сатиръ бѣлый, Стагачка (Даль), Сторчець смольный (Кіев.), Статушки (Вятск.), Чистотѣль, Ядрушки, Ячки, Ятрышникъ двулистный. Многолѣтнее травянистое растеніе изъ семейства «орхидныхъ» (*Orchideae* Juss.), распространенное почти во всей Европѣ, въ сѣверной, средней и юго-западной Россіи, въ Крыму, на Кавказѣ и въ Сибири. Корневая шишка веретенообразная; стебель выш. 7—11<sup>1</sup>/<sub>2</sub> вершковъ съ 2-мя прикорневыми обратно-яйцевидными листьями. Бѣлые цвѣты съ зеленоватымъ стѣнкомъ очень душистые (особенно ночью), собраны густымъ колосомъ. Лепестковидный околоцвѣтникъ состоитъ изъ 3 наружныхъ и 3 внутреннихъ листковъ, одинъ изъ послѣднихъ составляетъ продолговато-линейную, цѣльную губу съ тонкой нитевидной шпорою; 3 листочка сходятся плечомъ, а 2 боковыхъ отстоятъ. Тычинка одна, низъ ея сростается съ столбикомъ въ одну колонку, образуетъ короткий такъ называемый гиностелій съ приросшимъ 2-хлѣзднымъ пыльникомъ; хлѣзда пыльниковъ параллельныя съ узкимъ слаевиднымъ. Завязь нижняя одностѣдная, съ рыльцемъ, находящимся на колонкѣ подъ пыльникомъ. Плодъ—коробочка. Цвѣтетъ въ маѣ и юнѣ. Растетъ въ лѣсахъ и между кустарниками. (Табл. XLV, фиг. 258.)

**МЕДИЦИННОЕ УПОТРЕБЛЕНІЕ** извѣстно только въ народѣ. Въ Тверской губерніи сушеную траву безъ корня или свѣжую съ цвѣтами завариваютъ, какъ чай, и употребляютъ противъ лихорадки. Корни имѣютъ мочегонное дѣйствіе.

**Фіалка ночная обыкновенная** (*Hesperis matronalis* L.). Фармацевтическое назв.: *Hesperis*, s. *Viola matronalis*, v. *damascena*. Вечерница трава, Фіалокъ озимый, Вечерница душистая, Ночная красавица, Ночная фіалка (въ сад.), Левкой воздушный, Гашува (Могил.). Двулѣтнее или многолѣтнее травянистое растеніе изъ семейства «крестоцвѣтныхъ» (*Cruciferae* Juss.), распространенное въ средней и южной Европѣ, встрѣчающееся

въ южной Россіи, выш. 7—17 вершк.; стебель прямостоящій, наверху вѣтвистый; листья яйцевидно-ланцетные, зубчатые. Душистые цвѣты лиловаго, рѣже краснаго или бѣлаго цвѣта сначала сближены щитками, потомъ разрастаются въ кисть., Чашечка изъ 2-хъ паръ опадающихъ голыхъ или на концѣ пушистыхъ листочковъ; вѣнчикъ изъ 4 расположенныхъ накрестъ обратно-яйцевидныхъ тупыхъ лепестковъ; тычинокъ 6; пестикъ состоитъ изъ 2-хъ плодолистиковъ и раздѣленъ сѣмяносцемъ на 2 гнѣзда. Плодъ—почти цилиндрическіе стручки, вверхъ стоячіе на отстоящихъ ножкахъ, бугорчатые отъ сѣмянъ. Цвѣтетъ въ маѣ и въ іюнѣ. Встрѣчается въ лѣсахъ и между кустарниками. Разводится въ садахъ съ простыми и махровыми бѣлыми очень душистыми цвѣтами.

**Фіалка опушенная** (*Viola hirta* L.). Васелечекъ (Малор.), Вымянуха, Грыжная трава, Кильная трава, Зозульки, Корганъ (Тул.) Котикъ (Вор.), Котовы яйца (Курск.), Круглолистъ (Нижег.), Младенческая трава (Сарат.), Озепка (Перм.), Сердечная трава (Перм.). Многолѣтнее травянистое растеніе изъ семейства «фіалковыхъ» (*Violaceae* Dc.), распространенное почти во всей Европѣ, въ южной, средней и сѣверной Россіи. Корневище вѣтвистое, состоящее изъ укороченныхъ междоузлій, безъ подземныхъ побѣговъ; листья прикорневые коротко-шершавые, у основанія сердцевидные, яйцевидные или яйцевидно-продолговатые, съ яйцевидно-ланцетными прилистниками. Цвѣты одиночные на длинныхъ цвѣтостеблахъ, блѣдно-лиловые, не душистые. Чашелистиковъ, лепестковъ и тычинокъ по 5. Завязь одногнѣздная, съ простымъ столбикомъ. Плодъ—одногнѣздная 3-хетворчатая шарообразная пушистая коробочка. Цвѣтетъ весной; растетъ между кустарниками и въ сухихъ лѣсахъ.

**Фіалка пармская.** Одна изъ многочисленныхъ разновидностей фіалки душистой (опис. см. выше: «фіалка душистая»), съ крупными махровыми блѣдно-голубыми цвѣтами, обладающими чрезвычайно сильнымъ, пріятнымъ, своеобразнымъ запахомъ; разводится въ Италіи и южной Франціи.

**Фіалка пахучая**, см. Фіалка душистая (*Viola odorata* L.).

**Фіалка песчаная** (*Viola arenaria* Dc.). Драбъ, Поднимокъ (Малор.), Иронъ (Арх.), Куричья слѣпота, Проліска. Многолѣтнее травянистое растеніе изъ семейства «фіалковыхъ» (*Violaceae* Dc.), распространенное въ сѣверной и средней Европѣ, встрѣчающееся въ средней, сѣверной и юго-западной Россіи. Стебли и листья коротко-пушистые; изъ угловъ прикорневыхъ листьевъ выходятъ нѣсколько приподнимающихся стеблей, несущихъ въ углахъ своихъ листьевъ лиловые, иногда бѣловатые цвѣтки. Листья сердцевидные; нижніе—тупые, верхніе—немного заостренные. Прилистники ланцетные, по краямъ бахромчатые. Чашелистиковъ и лепестковъ по 5. Боковые лепестки менѣе крупные, нижній снабженъ шпорой. Тычинокъ 5; завязь одногнѣздная, съ простымъ столбикомъ. Плодъ—одногнѣздная

3-хлворчатая коротко-пушистая коробочка. Цвѣтетъ весной. Растетъ на сухихъ, преимущественно песчаныхъ, холмахъ и въ сосновыхъ лѣсахъ.

**Фіалка собачья** (*Viola canina* L.). Березка, Братокъ лѣсовый, Вюлетка, Изгонтъ-травя, Подлѣсокъ, Подперникъ (Вил.), Ранникъ (Гродн.), Сердечникъ (Монск.), Сокирки (Умань), Фіалка, Фіалка лѣсная. Многолѣтнее травянистое растеніе изъ семейства «фіалковыхъ» (*Violaceae* Dc.), распространенное по всей Европѣ и почти по всей Россіи, выш. до 7 вершковъ, съ воздушнымъ стеблемъ, на которомъ сидятъ черешковые, продолговато-яйцевидные, при основаніи сердцевидные листья. Прилистники ланцетные. Цвѣты синеватыя, безъ запаха. Чашелистиковъ, лепестковъ и тычинокъ по 5; завязь одногнздная съ простымъ столбикомъ. Плодъ—тулая 3-хлворчатая коробочка съ остроконечіемъ.

**Фіалка трехцвѣтная**, см. Аютины глазки (*Viola tricolor* L.) (Табл. XLV. фиг. 261.)

**Фіалки голубыя**, см. Горечавка крупная (*Gentiana Pneumonanthe* L.).

**Фіалковый корень**, см. Касатикъ флорентійскій, Ирисъ (*Iris florentina* L.).

**Фіалковый мохъ** (*Byssus Jolithus* L.). Растетъ на камняхъ, имѣетъ пріятный запахъ, содержитъ юдь и составляетъ народное лекарство отъ накожныхъ сыпей.

**Фіалокъ болотный**, см. Калужница болотная (*Caltha palustris* L.).

**Фіалокъ бѣлый**, см. Левкоя (*Matthiola annua* L.).

**Фіалокъ полевой**, см. Мыльнянка лекарственная (*Saponaria officinalis* L.).

**Фіалокъ пунцовый**, см. Фіалка душистая (*Viola odorata* L.).

**Фиолетовое дерево**, см. Сандальное дерево (*Haematoxylon Camprechianum* L.).

**Фиоль**, см. Желтофиоль садовый (*Cheiranthus Cheiri* L.).

**Фіона**, см. Кирказонъ обыкновенный (*Aristolochia Clematidis* L.).

**Фіонъ**, см. Норичникъ узловатый (*Scrofularia nodosa* L.).

**Фолынь**, см. Коровякъ бѣлоцвѣтный (*Verbascum Lychnitis* L.).

**Фонтанная трава**, см. Рдестъ плавающая (*Potamogeton natans* L.).

**Францовникъ**, см. Герань луговая (*Geranium pratense* L.).

**Французское дерево**, см. Гваляковое дерево (*Guajacum officinale* L.).

**Фукусія** (*Fuchsia* Plum.). Сereжки, Уланки. Одно изъ любимѣйшихъ и наиболѣе распространенныхъ горшечныхъ растеній, имѣетъ видъ кустарника, синіе, красные и бѣлые цвѣты котораго, хотя и лишены запаха, но тѣмъ не менѣе очень красиво свѣшиваются изъ листовыхъ пазухъ и часто расцвѣтаютъ сотнями на одномъ растеніи. Родомъ фукусія изъ Америки; разводится повсюду во всевозможныхъ разнообразныхъ махровыхъ и не махровыхъ сортахъ,

**Фукусъ пузырчатый** (*Fucus vesiculosus* L.). Фармацевтиче-



(Кал., Поти), Макъ дикий (Курск.), Ноготѣдникъ (Влад.), Просвирки, Просвирникъ полевой (Сар., Вят., Вор.), Проскурникъ (Уф.), Рожа (Кіев., Полт., Хар.), Рожа дикая, Рожа лѣсная, Рожа полевая, Рожа черная, Рожа собача (Малор.), Рожа собачья (Малор., Екат., Хар., Астр. и др.). Слизъ дикий, Слицъ синій (Бес.), Хатьма. Многолѣтнее травянистое растеніе изъ семейства «просвирниковыхъ» (*Malvaceae* R. Br.), распространенное въ средней Европѣ, въ юго-западной Россіи на Кавказѣ. Все растеніе стро-войлочное отъ звѣздчатыхъ волосковъ; стебель прямой; нижніе листья угловато-5-тилопастные; верхніе — 3—7-ми лопастные съ болѣе длинной среднею лопастью; цвѣтки розовые одиночные въ углахъ листьевъ; цвѣтоножки длиннѣе черешковъ. Подчашіе 3-храздѣльное; чашечка 5-тираздѣльная; лепестковъ 5, двулопастныхъ, въ 3 раза длиннѣе чашелистиковъ. Тычинокъ много, соединенныхъ нитями въ трубочку и несущихъ почковидные пыльники, открывающіеся одною горизонтальною щелью. Пестикъ состоитъ изъ нѣсколькихъ плодolistиковъ, сросшихся между собою и со срединнымъ столбикомъ, кончающимся наверху столькими-же столбиками, сколько плодolistиковъ; основаніе столбиковъ конусовидное. Плодъ сухой, распадающійся вслѣдствіе расклеиванія плодolistиковъ на гладкія, по краямъ округленные сѣмянки. Цвѣтетъ лѣтомъ. Растетъ на лугахъ, холмахъ, между кустарниками, около домовъ въ садахъ и огородахъ.

**МЕДИЦИНОСКОЕ УПОТРЕБЛЕНІЕ** извѣстно только въ народѣ. Въ Воронежской губерніи отваръ хатьмы употребляютъ отъ воспаления въ кишкахъ, въ Таврической губерніи листьями обкладываютъ лишаи, въ Саратовской губерніи растеніемъ лечатъ головную боль, простуду и ломоту. Во Владимірской губ. изъ сушеныхъ истертыхъ листьевъ дѣлаютъ мазь, которою натираются отъ простуды. Въ Саратовской и Екатеринославской губерніяхъ растенію приписываютъ еще свойство гнать кровь и поднимать матку. По своимъ свойствамъ растеніе имѣетъ много общаго съ алтеемъ.

**Хвайла**, см. Гравилатъ прямой (*Geum strictum* Ait.).

**Хвалинникъ**, см. Кирказонъ обыкновенный (*Aristolochia Clematidis* L.).

**Хвалка**, см. Сосна обыкновенная (*Pinus silvestris* L.).

**Хвасоля**, см. Фасоль обыкновенная (*Phaseolus vulgaris* L.).

**Хвелинникъ**, см. Кирказонъ обыкновенный (*Aristolochia Clematidis* L.).

**Хвига**, см. Смоковница обыкновенная (*Ficus Carica* L.).

**Хвилильникъ** } см. Кирказонъ обыкновенный (*Aristolochia Clematidis* L.).  
**Хвиловникъ** }  
**Хвойличникъ** }

**Хвойникъ**, см. Хвойникъ обыкновенный (*Ephedra vulgaris* Rich.).

**Хвойникъ обыкновенный** (*Ephedra vulgaris* Rich.). Фармацевтическое названіе: *Ephedra uvamarina*. Земляника (Урал.), Декоктъ степной (корни въ Одессѣ), Стоузелъникъ, Хвостъ кон-

скій, Хвойникъ, Наслѣдникъ, Стѣнникъ, Ладакъ калмыцкій, Малина калмыцкая, Ягоды бирючьи (Астр., Казан.). Низкій свѣтло-зеленый сильно вѣтвистый кустарникъ изъ семейства Gnetaceae Вѣтви, распространенный въ южной Европѣ, въ сѣвер. Африкѣ, западной Азіи, Крыму, Закавказьѣ и въ Сибири, изрѣдка встрѣчающіеся въ южной и юго-восточной Россіи. Вѣтви членистыя, вдоль бороздчатые, немного шероховатыя; листья мягкіе перепончатые, супротивные, сростшіеся въ небольшія влагалища, Цвѣты мелкіе, двудомные: мужскіе въ небольшихъ одиночныхъ, почти сидячихъ колоскахъ, состоящихъ изъ 4 рядовъ черепичато-расположенныхъ листочковъ, несущихъ въ углахъ своихъ одиночныя цвѣтки, каждый цвѣточекъ имѣетъ перепончатый двулопастный околоцвѣтникъ и срединный столбчикъ, несущій 8 двугнѣздныхъ пыльниковъ, раскрывающихся отверстіями; женскіе цвѣты состоятъ изъ 3-хъ паръ супротивныхъ, при основаніи сростшихся между собою попарно листочковъ, окружающихъ 2 яичка. Яички прямые, съ двойнымъ покровомъ, изъ которыхъ внутренній на верхушкѣ удлиненъ въ трубочку; плодъ похожъ на ягоду, состоящую изъ мяснстыхъ краснаго цвѣта верхушечныхъ листочковъ, окружающихъ продолговатояйцевидный, плоскій на одной сторонѣ сѣмена. Цвѣтетъ весной. Растетъ на каменистыхъ мѣстахъ. Калмыки приготавливаютъ изъ ягодъ искусственный медъ; красныя ягоды кипятятъ съ водой, а потомъ мѣшаютъ палкой съ кускомъ бараньяго сала. Астраханскіе казаки собираютъ длинныя корневые нити и продаютъ вмѣсто сассапарели.

**МЕДИЦИНСКОЕ УПОТРЕБЛЕНІЕ.** Эфедра, или хвойникъ, въ Россіи извѣстна подъ именемъ Кузьмичевоитравы. Первые печатныя свидѣнія объ этомъ растеніи появились въ 1889 г. въ «Самарскихъ Губернскихъ Вѣдомостяхъ», гдѣ была напечатана о ней статья Н. И. Партаскаго. Описывая эфедру, Партаскій указалъ на то, что извѣстный самарскій знахарь Кузьмичъ вылечиваетъ ею множество больныхъ, страдающихъ ревматизмомъ и разстройствомъ пищеварительныхъ органовъ.

Болѣе 20-ти лѣтъ тому назадъ знахарь Иванъ Кузьмичъ, жившій въ Бузулукскомъ уѣздѣ, Самарской губерніи, началъ лечить эту траву ревматизмъ. Слава Кузьмича быстро возрастала, и съ проведеніемъ желѣзной дороги къ нему стекались массы народа; были года, когда у него было до 10,000 посѣтителей не только изъ всѣхъ городовъ Россіи, но даже изъ Франціи, Германіи и Англіи. Федоръ Кузьмичъ получилъ это средство отъ своего отца, который вывезъ его изъ Сибири.

Въ народѣ плѣбныя свойства эфедры извѣстны давно. Калмыки и киргизы выжимаютъ сокъ изъ ягодъ эфедры, варятъ его въ котелкахъ, получая нѣчто похожее на кашу или настилу. Лекарство это называется по-калмыцки «сергана-шатъ» и служитъ пѣлительнымъ средствомъ отъ катарральныхъ страданій. Крѣпкій стваръ стеблей эфедры, напоминающій по вкусу стваръ можжевелника, киргизы пьютъ большими пріемами отъ ревмати-

ческихъ болей. Отваръ эфедры вызываетъ потъ, потому больного послѣ приѣма лекарства кладутъ въ постель и накрываютъ теплымъ одѣяломъ.

Федоръ Кузьмичъ для изготовленія своего лекарства варитъ траву съ корнями долгое время въ котлахъ, затѣмъ крѣпкій бураго цвѣта отваръ разбавляетъ водою «по вкусу» и па глаза «заправляетъ» мятнымъ масломъ. Больныхъ онъ снабжаетъ четвертными бутылками лекарства и предписываетъ имъ водки и вина во время леченія не пить, принимать отваръ по половинѣ или по цѣлой рюмкѣ 3—4 раза въ день за  $\frac{1}{2}$  часа до принятія пищи.

Эфедру слѣдуетъ собирать въ сухое время весной и осенью и сейчасъ-же высушивать траву подъ навѣсами, при свободномъ доступѣ воздуха, раскладывая ее тонкимъ слоемъ. Хорошо высушенная трава сохраняетъ свой зеленый цвѣтъ и цѣлительное свойство на 1—1 $\frac{1}{2}$  года. Важно слѣдить, чтобы трава не слеживалась или покрывалась плѣсенью, которая можетъ вызвать расстройство кишечника.

Для приготовленія декокта берутъ 3—4 золотника (3—4 драхмы, 12,0—16,0 грм.) травы съ корнями, толкутъ ихъ въ ступкѣ, завариваютъ 4—5 стаканами кипятка и оставляютъ настояться. Послѣ 12-тичасового настаиванія кипятятъ траву въ теченіе 4-хъ и болѣе часовъ въ чистомъ глиняномъ горшкѣ, не плотно прикрытомъ такою-же крышкою. Послѣ такого кипяченія получается декоктъ желто-краснаго цвѣта, по виду схожій съ русскимъ солодовымъ квасомъ средней густоты. По прекращеніи варки декокта получается 3—3 $\frac{1}{2}$  стакана; его остуживаютъ, процеживаютъ черезъ полотно и сливаютъ въ бутылку. Въ теплѣ декоктъ скоро закисаетъ, поэтому надо заготовлять его не въ большомъ количествѣ, заготовленное держать въ холодномъ мѣстѣ, а для приданія декокту вкуса и для того, чтобы предохранить его отъ порчи, на всю эту порцію можно прибавить 3—4 капли мятнаго масла. Передъ приѣмомъ декоктъ тщательно взбалтываютъ. Взрослые принимаютъ 3—4 раза въ день по рюмкѣ, дѣти — по десертной или чайной ложкѣ. Каждый приѣмъ слѣдуетъ брать за  $\frac{1}{2}$  часа до принятія пищи; послѣ приѣма лекарства лѣтѣмъ полезно погулять на воздухѣ, зимою подвигаться въ комнатахъ. При леченіи слѣдуетъ очень остерегаться простуды. Леченіе продолжается, смотря по роду болѣзни, отъ недѣли до 2-хъ—3-хъ мѣсяцевъ. Острые заболѣванія проходятъ скоро, хроническія — требуютъ продолжительнаго леченія. Въ хроническихъ заболѣваніяхъ послѣ перваго курса леченія, продолжавшагося 2—3 недѣли, дѣлаютъ перерывъ на нѣсколько дней, затѣмъ начинаютъ леченіе съ меньшихъ порцій: такъ, напр., вмѣсто полной рюмки, пьютъ  $\frac{3}{4}$  и  $\frac{1}{2}$  рюмки и передъ полнымъ окончаніемъ леченія принимаютъ декоктъ уже не 4 раза въ день, а только 2 раза. Всѣ спиртные напитки безъ исключенія парализуютъ дѣйствіе эфедры, потому они положительно запрещаются. Больнымъ, страдающимъ слабостью пищеваренія, слѣдуетъ остерегаться при леченіи тяжелой пищи, какъ-то жирныхъ блюдъ, картофеля, колбасъ и т. п.

Потогонное лечение эфедрою производится въ постели, чтобы больной не простудился. Декокты готовятъ такъ-же, только не кладутъ въ него мятного масла. Рюмку декокта разводятъ въ одномъ или въ двухъ стаканахъ горячей воды, которые и выпиваютъ заразъ, послѣ чего закутываются въ одѣяла. Послѣ такого приѣма лекарства наступаетъ обильный потъ. Потогонный способъ леченія примѣняется при хроническихъ ревматизмахъ и невралгяхъ, напр., при сѣдалищной невралгii.

Эфедра и ея цѣлебныя свойства извѣстны также за-границею; такъ, во Франціи сокъ ея плодовъ считается полезнымъ при тифѣ, при острыхъ воспалительныхъ заболѣваніяхъ и какъ болеутоляющее средство. Зеленые стебли и спѣлыя ягоды ввѣдѣ отвара употребляются во Франціи отъ дезинтеріа.

**Хворобой**, см. Звѣробой обыкновенный (*Hypericum perforatum* L.).  
**Хворостъ бѣшеный**, или пьяный, см. Азалея желтая (*Azalea pontica* L.).

**Хвостачъ**, см. Пазникъ крапчатый (*Achyrophorus maculatus* Scop.).

**Хвостачъ красносиній**, см. Плакунъ-трава (*Lythrum Salicaria* L.).

**Хвостики овечьи**, см. Подмаренникъ сѣверный (*Gallium boreale* L.).

**Хвостникъ**, см. Лисохвостъ луговой (*Alopecurus pratensis* L.).

**Хвостникъ** } см. Сосенка водяная (*Hippuris vulgaris* L.).  
**Хвостнякъ** }

**Хвостовая трава**, см. Горичникъ лекарственный (*Peucedanum officinale* L.).

**Хвостъ бѣлый**, см. Пупырникъ обыкновенный (*Torilis Anthriscus* Gärtn.).

**Хвостъ воловій**, см. Асфодель (*Asphodelus ramosus* L.).

**Хвостъ конскій**, см. Хвойникъ обыкновенный (*Ephedra vulgaris* Rich.).

**Хвостъ конскій**, см. Хвощъ полевой (*Equisetum arvense* L.).

**Хвостъ кошачій**, см. Амарантъ (*Amarantus caudatus* L.).

**Хвостъ лисій**, см. Лисохвостъ луговой (*Alopecurus pratensis* L.).

**Хвостъ лисій**, см. Амарантъ (*Amarantus caudatus* L.).

**Хвостъ львиный**, см. Нустырникъ обыкновенный (*Leonorus Cardiacus* L.).

**Хвостъ мышиный**, см. Мышехвостникъ маленькій (*Myosurus minimus* L.).

**Хвостъ свиной**, см. Горичникъ лекарственный (*Peucedanum officinale* L.).

**Хвостъ свиной**, см. Коровякъ черный (*Verbascum nigrum* L.).

**Хвостъ собачій**, см. Чертополохъ разнолистный (*Cirsium heterophyllum* All.).

**Хвостъ собачій**, см. Гребенникъ обыкновенный (*Cynosurus cristatus* L.).

**Хвощикъ**, см. Хвощъ полевой (*Equisetum arvense* L.).



**Хвоощъ**, см. Хвоощъ зимующій (*Equisetum hyemale* L.).

**Хвоощъ**, см. Звѣздчатка большая (*Stellaria Holostea* L.).

**Хвоощъ болотный** (*Equisetum palustre* L.). Круглякъ (Малор.).

Многолѣтнее травянистое растеніе изъ семейства «хвощовыхъ» (*Equisetaceae* Dc.), распространенное въ Европѣ, Азіи и Сѣверной Америкѣ и обыкновенное въ Россіи. Стебли однородные (плодоносные и бесплодные), выш. 7—11 вершк., зеленые, глубоко-бороздчатые, съ длинными простыми вѣтвями, внутри полыми, съ перегородками въ узлахъ. Листья мелкіе, кольчатые, сростаются въ зубчатая влагалища. Плодоносные стебли съ широкими влагалищами, снабженными 6—7-ю ланцетовидными зубцами съ широкой бѣлой каймой по краямъ. Плодоносные стебли по созрѣваніи споръ скоро отмираютъ и замѣняются бесплодными. Спорангій (т. е., вместилища для споръ) помѣщаются на нижней поверхности особыхъ щитовидныхъ листиковъ, собранныхъ ввидѣ колоска на концѣ стебля. Растетъ на болотистыхъ лугахъ и по берегамъ озеръ. (Р и с. 311.)

**Хвоощъ боровой**, см. Хвоощъ зимующій (*Equisetum hyemale* L.).

**Хвоощъ бѣличій**, см. Хвоощъ лѣсной (*Equisetum silvaticum* L.).

**Хвоощъ водяной**, см. Сосенка водяная (*Hippuris vulgaris* L.).

**Хвоощъ желтый**, см. Желтуха (*Senecio jacobea* L.).

**Хвоощъ зимній**, см. Хвоощъ зимующій (*Equisetum hyemale* L.).

**Хвоощъ зимующій** (*Equisetum hyemale* L.). Фармацевтическое названіе: *Equisetum majus s. mechanici*. Хвоощъ зимній, Хвоощъ (Малор.), Щетъ, Щеть, Хвоощъ боровой, Хвоощъ обыкновенный. Многолѣтнее растеніе изъ семейства «хвощевыхъ» (*Equisetaceae* Dc.), обыкновенное во всей Европѣ и въ Сибири. Стебель простой безъ вѣтвей, зимующій, оканчивается остроконечнымъ колоскомъ со спорангіями, находящимся на нижней поверхности щитовидныхъ листиковъ, сѣровато-зеленый, съ широкою срединною полостью и 10—25 тонкими бороздками на поверхности. Листья мелкіе, кольчатые, сростающіеся въ цилиндрическія прижатая влагалища съ 14—20 черноватыми тупыми зубцами; послѣдніе оканчиваются ланцетно-кожистыми, скоро опадающими придатками. Растетъ въ лѣсахъ. Употребляется для полированія столярныхъ работъ. (Табл. XLV, фиг. 260.)

**МЕДИЦИННОЕ УПОТРЕБЛЕНІЕ.** Въ Гродненской губ. отваромъ поятъ больныхъ отъ болѣзни горла и груди.

**Хвоощъ лѣсной** (*Equisetum silvaticum* L.). Болотная (Олон.), Ельникъ болотный (Кал.), Елка полевая (Влад.), Пестушка свиная (Нижег.), Столбецъ болотный (Яросл.), Хвоощъ бѣличій (Олон.). Многолѣтнее растеніе изъ семейства «хвощевыхъ» (*Equisetaceae* Dc.), распространенное почти во всей Европѣ и весьма обыкновенное въ средней и сѣверной Россіи. Стебли его простые (т. е., не вѣтвистые), плодущіе побѣги красновато-бурые, несуть на верхушкѣ колосокъ со спорангіями (вместилища для споръ); но созрѣваніи споръ плодущіе побѣги зеленѣютъ, значительно вырастаютъ (съ 7—14 вершк.), а при основаніяхъ влагалищъ изъ узловъ развиваются много-

численные вѣтви со вторичными развѣтвленіями; безплодные побѣги свѣтло-зеленые, наверху обыкновенно согнутые, съ 10—14 ребрышками; вѣтви ихъ многочисленныя, тонкія, 3-х-гранныя, вѣтвистыя, согнутыя дугой внизъ; влагалища вѣтвей съ 3-мя тонко-заостренными зубцами. Растетъ въ лѣсахъ и между кустарниками. (Р и с. 312.)

**МЕДИЦИННОЕ УПОТРЕБЛЕНІЕ.** Всѣ виды хвоща прежде употреблялись въ медицинѣ, какъ мочегонное средство, теперь оставлены. Молодые побѣги употребляются въ пищу. Въ Вологодской губ. отваръ ихъ пьютъ для возстановленія силъ и отъ сухотки. Въ аптекахъ хвощи продаются для чистки кухонной металлической посуды.

**Хвощъ обыкновенный**, см. Хвощъ зимующій (*Equisetum hyemale* L.).

**Хвощъ озерный**, см. Камышь озерной (*Scirpus lacustris* L.).

**Хвоя**, см. Сосна обыкновенная (*Pinus silvestris* L.).

**Хебръ**, см. Тимофеевка (*Phleum pratense* L.).

**Хемитникъ**, см. Стальникъ пахучій (*Ononis hircina* Jacq.).

**Хенне**, см. Ажканна настоящая (*Lawsonia alba* L.).

**Хетра**, см. Букъ обыкновенный (*Fagus silvatica* L.).

**Хилинъ**, см. Синеголовникъ плосколистный (*Eryngium planum* L.).

**Хинная трава**, см. Зюзникъ европейскій (*Lycopus europaeus* L.).

**Хинное дерево** (*Cinchona* L.). Деревья и кустарники, произрастающіе въ Кордильерахъ Южной Америки, съ вѣчно-зелеными блестящими цѣльнокрайними прямостоящими листьями, съ опадающими прилистниками, двулистными, собранными въ колосья, цвѣтами и плодами—двустворчатыми коробочками съ мелкими сѣменами, верхняя кожѹра которыхъ извѣстна въ медицинѣ подъ названіемъ «хинной корки», какъ средство противъ перемежающейся лихорадки. Несмотря на множество изслѣдованій и описаній относительно хинной корки, знакомство съ видами хиннаго дерева должно признать еще недостаточнымъ; извѣстно существованіе около 50 видовъ этого дерева, различающихся между собой въ строеніи либо плодовъ, либо цвѣтовъ, но только половина изъ нихъ доставляетъ хинную корку, употребляющуюся въ медицинѣ.

**МЕДИЦИННОЕ УПОТРЕБЛЕНІЕ.** Хинная корка вывезена іезуитами-миссіонерами изъ Южной Америки и Востъ-Індіи. Существовать такой разсказъ, что туземцы изъ ненависти долгое время скрывали отъ своихъ мучителей, проповѣдниковъ религіи любви, цѣлебную силу хинной корки, и будто-бы левъ, больной лихорадкою, пожирившій кору и выздоровѣвшій, открылъ благочестивымъ отцамъ цѣлебную силу этой коры.

Долгое время хинная кора не считалась врачами за лекарственное средство, испанскіе врачи даже считали ее «созданиемъ дьявола»; во всеобщее употребленіе она вошла только въ царствованіе Людовика XIV-го, который излечился при ея помощи отъ тяжелой перемежающейся лихорадки.

Существуетъ нѣсколько видовъ хиннаго дерева и нѣсколько сортовъ корки.

Дѣйствующая часть хинныхъ корокъ, алкалоидъ-х и н и нъ, былъ впервые добытъ въ Эдинбургѣ въ 1820 г., и съ тѣхъ поръ онъ не переставалъ оказывать самое вѣрное и благотворное дѣйствіе у постели больныхъ и заслужить полное довѣріе какъ больныхъ, такъ и врачей.

Въ продажѣ существуетъ три вида хинной корки: королевская, желтая и красная. Изъ королевской корки готовится хинное вино, изъ желтой и красной—вырабатываются фабричнымъ путемъ различные препараты хины, продаваемые въ аптекахъ. Красная корка даетъ самое большее количество хинина, потому считается самой дорогой.

При приемѣ хинина въ полости рта замѣчается горькій вкусъ, обуславливающий усиленное отдѣленіе слюны; раздражающаго дѣйствія на слизистую оболочку рта хининъ не производитъ. Небольшіе его дозы также не раздражаютъ слизистой оболочки желудка, большіе-же вызываютъ чувство теплоты въ желудкѣ, боли и могутъ вызвать рвоту; это въ особенности рѣзко выступаетъ при существующемъ уже катаррѣ желудка. На слизистую оболочку прямой кишки хининъ такого дѣйствія не имѣетъ, потому при разстроенномъ пищевареніи его можно употреблять ввидѣ клистировъ.

Хининъ имѣетъ обширное примѣненіе въ медицинѣ. Онъ уменьшаетъ чувствительность и раздражительность головного и спинного мозга, потому дается при различнаго рода невралгіяхъ и неврозахъ; затѣмъ, какъ извѣстно, онъ дѣйствуетъ, какъ жаропонижающее средство, потому его даютъ при всевозможныхъ лихорадочныхъ заболѣваніяхъ, при гриппѣ, воспаленіи легкихъ, при острыхъ сыпныхъ болѣзняхъ; въ особенности-же большое значеніе онъ имѣетъ, какъ специфическое средство противъ перемежающихся болотныхъ лихорадокъ.

Хининъ задерживаетъ гніеніе, потому въ небольшихъ количествахъ назначается при хронической диспепсiи и, какъ горькое вещество, для возбужденія аппетита послѣ тяжелыхъ болѣзней. Хининъ усиливаетъ мѣсячныя отдѣленія и вызываетъ сокращенія матки, потому его даютъ роженицамъ, у которыхъ очень слабыя потуги. Во время беременности большіе дозы хинина не должны быть употребляемы, потому что могутъ вызвать выкидышъ. Также большіе дозы хинина не должны быть употребляемы людьми, страдающими плохимъ пищевареніемъ и запорами.

Хинная корка дается большимъ въ отварѣ и ввидѣ хиннаго вина. Для приготовления отвара берутся отъ 1—2-хъ драхмъ (4,0—8,0 грам.) корки, заливается 16ю стол. ложками воды и кипятится до тѣхъ поръ, пока не останется 12-ть стол. ложекъ, такой отваръ принимаютъ черезъ 2 часа по столовой ложкѣ; къ нему прибавляютъ 1—2 стол. ложки сиропа для вкуса и иногда нѣсколько капель (10—30-ть) соляной кислоты, какъ средства, помогающаго желудочному пищеваренію. Такая микстура полезна

людямъ, выздоравливающимъ отъ тяжелыхъ болѣзней. Дѣтямъ она дается чайными ложками.

Хининъ имѣетъ массу разновидностей, смотря по тому, какими веществами онъ обрабатывается. Всего чаще употребляется соляно-кислый хининъ, сѣрно-кислый, бромистый хининъ и хининъ съ танниномъ (*chinin. muriaticum, sulfuricum, hydrobromatum* и *chinin. tannicum*). Дѣйствія соляно-кислаго и сѣрно-кислаго хинина почти одинаковы. Последний только дешевле, потому употребляется чаще въ большихъ госпиталяхъ и въ бѣдной практикѣ. Онъ почти не растворяется въ водѣ, и для его растворенія приходится прибавлять къ нему нѣсколько капель соляной кислоты. Соляно-кислый хининъ въ водѣ хорошо растворяется. По своему виду онъ легко отличается отъ сѣрно-кислаго хинина: онъ представляется видѣ шелковистыхъ блестящихъ тонкихъ нитей, сѣрно-кислый-же хининъ имѣетъ видъ порошка.

Различаютъ малые и большіе приемы этихъ двухъ видовъ хинина: малые приемы въ 2—5 гранъ (0,1—0,4 грм.) 2—3 раза въ день даются, какъ легкое противолихорадочное средство, при различнаго рода простудныхъ болѣзняхъ, часто въ смѣси съ какимъ-нибудь болѣе сильно жаропонижающимъ средствомъ, какъ-то съ фенацетиномъ, антипирномъ или салициловымъ натромъ. Большіе приемы отъ 5-ти до 10-ти—20-ти гранъ (0,4—0,8—1,2 граммъ) даются главнымъ образомъ отъ перемежающейся лихорадки, въ тѣхъ случаяхъ, когда можно заподозрѣть, что причиною болѣзни служитъ скрытая перемежающаяся лихорадка. Дается хининъ въ этихъ случаяхъ въ дни, свободные отъ жара и припадковъ лихорадки. На тощій желудокъ хининъ принимать не слѣдуетъ. При перемежающейся лихорадкѣ приемъ въ 10—15 гранъ (0,3—1,0 грм.) можно повторить 2—3 раза въ день; при этомъ братъ не весь приемъ сразу, а по половинѣ черезъ 15—20 минутъ. Большіе приемы хинина вызываютъ непріятный шумъ въ ушахъ, который, однако, проходитъ, какъ только приемы хины оставляются.

Бромистый хининъ дается въ маленькихъ дозахъ по 2—3 грана (0,1—0,2 грм.) 2—3 раза въ день въ тѣхъ случаяхъ, когда преобладаютъ нервные явленія, невралгическія боли, общее безпокойство, дурное настроеніе духа, общая слабость. Хининъ съ танниномъ назначается въ такихъ-же дозахъ или немножко большихъ при хроническихъ поносахъ, сопровождающихся повышеніемъ температуры. Для избѣжанія непріятнаго горькаго вкуса хининъ кладутъ въ облатки.

Дѣтямъ вмѣсто соляно-кислаго хинина даютъ такъ называемый *euchinin*, который при обработкѣ лишается горечи, потому можетъ быть принятъ безъ облатокъ. На приемъ *euchinin*а даютъ въ порошокъ отъ 2-хъ до 3-хъ гранъ (0,1—0,2 грм.), смѣшивая его съ сахаромъ. Хининъ съ танниномъ также менѣе горекъ, чѣмъ соляно-кислый. Его очень часто назначаютъ дѣтямъ, страдающимъ хроническими поносами съ повышеніемъ температуры. На приемъ отъ 2-хъ до 3-хъ гранъ (0,1—0,2 грм.) 2—3 раза въ день.

Въ гомеопатіи спиртная настойка хинной корки

употребляется при тѣхъ-же заболѣваніяхъ, даже еще чаще. Такъ, напримѣръ, она дается при поносѣ простымъ и кровавымъ, при судорогахъ въ желудкѣ, болѣзняхъ легкихъ, хорей, подагрѣ, носовыхъ кровотеченіяхъ, зубной боли, кори, оспѣ и отравленіи ртутью. Даютъ 1—2 капли и даже нѣсколько капель чистой настойки или же 1—2-го разведенія 1—2 раза въ день и чаще.

Всѣ виды хинина даются также отъ 0,05 до 0,1 грм. (отъ  $\frac{1}{6}$  грана до 1-го грана) по нѣсколько разъ въ день.

Въ ветеринарной практикѣ хининъ дается также часто, какъ жаропонижающее и укрѣпляющее средство. Но такъ какъ большимъ животнымъ его надо давать въ большихъ количествахъ, а средство это принадлежитъ къ числу дорогихъ, то для большихъ животныхъ его замѣняютъ другими болѣе дешевыми средствами. Для большихъ животныхъ готовится отваръ хинной корки, и берутъ 30 грм. (1 унцъ) на 350 грм. (12 унцъ) воды. Такой отваръ рекомендуется, какъ противоядіе противъ приема большого количества ртутнаго камня.

Сѣрноокислый хининъ дается лошадямъ отъ 4,0 — 15,0 грам. (1 драхма до  $\frac{1}{2}$  унца.), овцамъ, козамъ и свиньямъ 1,0—2,0 грам. (16 до 30 гран.), собакамъ и кошкамъ 0,03—4,0 грм. ( $\frac{1}{2}$  грана до 16-ти гранъ).

Въ ветеринарной гомеопатіи употребляется хинная корка во всѣхъ случаяхъ, въ которыхъ понижена жизнедѣятельная сила животныхъ вслѣдствіе какихъ-нибудь сильныхъ потерь крови и нагноеній. Также примѣненіе хинны считается полезнымъ отъ скопленій жидкости въ животѣ, груди и конечностяхъ, появившихся вслѣдъ за тяжелыми болѣзнями, какъ-то, напр., послѣ тяжелаго гриппа, воспаленія легкихъ. Даютъ 1-го—3-го разведенія или чистую настойку.

Хинный корень, см. Сассaparель (*Smilax China L.*).

Хиновникъ, см. Кирказонъ обыкновенный (*Aristolochia Clematidis L.*).

Хитръйникъ, см. Мятликъ лѣсной (*Poa nemoralis L.*).

Хишнякъ, см. Пахучка обыкновенная (*Calamintha Clinopodium Benth.*).

Хлопалка, см. Хлопушка (*Silene inflata Smith.*).

Хлопецъ, см. Погребокъ обыкновенный (*Rhinanthus Crista Galli L.*).

Хлопокъ русскій, см. Асклепіасъ сирійскій (*Asclepias syriaca L.*).

Хлопунчики, см. Хлопушка (*Silene inflata Smith.*).

Хлопушка (*Silene inflata Smith.*). Фармацевтическое названіе: Behen album (Radix). Беренъ бѣлый, Бѣгунъ бѣлый, Волдырникъ, Денежникъ (Волог.), Зборъ (Нижег.), Заячья калуца (Костр.), Куколь, Куколица, Куколіца (Малор.), Кокиль (Под.), Котельки бѣлые (Вор.), Калтурникъ (Черн.), Ландышъ бѣлый (Витебск.), Лускавка (Гродн.), Мыловка (Нижег.), Огурцы бѣшеные (Нижег.), Пуколка (Тверск.), Соколій перелетъ дикій, Сережка, Серьги, Скрипушка (Минск.), Смолевка-хлопушка, Сто-

головникъ (Тавр.), Сумашечникъ (Тверск. въ селѣ Овселукѣ), Увѣчная трава (Костр.), Увѣчная морская трава, Хлопалка (Ставр.), Хлопунчики (Гамб.), Шелкунечная трава (Раз.), Шелкунцѣ (Нижег.), Шелкунцы (Кал.), Шелкунъ (Тверск., Арх.), Шолкунецъ, Шоркунцы (Архан.), Шолкотуха (Новг.). Многолѣтнее травянистое растение изъ семейства «гвоздичныхъ» (Caryophyllaceae Dc.), распространенное почти во всей Европѣ и во всей Россіи, выш.  $5\frac{1}{2}$ —11 вершк. Листья эллиптическіе или ланцетовидные, заостренные, супротивные, стоячіе; стебель узловатый; бѣлые цвѣты образуютъ соцветіе-развилку (дихазій, полузонтикъ). Чашечка яйцевидная, пузырчато-вздутая, съ многими жилками, соединенными въ сѣточку, 5-тизубчатая, съ трехугольными острыми зубцами; лепестковъ 5, бѣлыхъ, съ двураздѣльной пластинкой. Тычинокъ 10; завязь одногнѣздная, съ 3-мя столбиками. Плодъ—коробочка съ недлинной плодоножкой. Цвѣтетъ лѣтомъ и до осени. Растетъ на поляхъ, лугахъ, въ лѣсахъ и около дорогъ. (Рис. 313.)

**МЕДИЦИННОЕ УПОТРЕБЛЕНІЕ.** Въ Швеции употребляется, какъ домашнее средство отъ рожи.

**Хлопушки**, см. Хлопушка (*Silene inflata* Smilt.).

**Хлопчатникъ**, см. Хлопчатобумажный кустъ (*Gossipium herbaceum* L.).

**Хлопчатобумажный кустъ**, Хлопчатникъ (*Gossipium herbaceum* L.). Бавелна, Бавовна, Бавонъ, Бавуна, Баволь (Малор.), Балибакъ (Вѣлор.). Родомъ хлопчатникъ изъ тропическаго пояса, стебель его травянистый, выш. до  $1\frac{1}{2}$  арш., съ 5 тлопастными листьями и 3—5-гнѣтворчатыми коробочками, которыя образуются послѣ цвѣтенія и въ которыхъ сѣмянки окружены бѣлымъ волокнистымъ пучкомъ хлопка; по созрѣваніи коробочекъ послѣдній выпадаетъ изъ нихъ. Хлопчатникъ воздѣлывается на югѣ Европы и въ Америкѣ, гдѣ составляетъ обширныя плантаціи. Выращивается онъ ежегодно изъ сѣмянъ и поспѣваетъ по прошествіи 8-ми мѣсяцевъ. Бѣлыя растреснувшіяся коробочки собираются, отправляются на мельницы для отдѣленія хлопка, который затѣмъ складываютъ въ тюки и прессуютъ. Въ этомъ видѣ хлопокъ поступаетъ уже на фабрики для дальнѣйшей переработки его въ ткань.

**МЕДИЦИННОЕ УПОТРЕБЛЕНІЕ.** Изъ волосковъ сѣмянъ вырабатывается вата, употребленіе которой въ настоящее время обширно какъ къ общежитію, такъ и въ медицинѣ. Изъ сѣмянъ готовится масло, которое имѣетъ бѣльное сходство съ оливковымъ. Корни хлопчатника имѣютъ свойства вызывать сокращеніе матки, изрѣдка выписываются врачами отъ кровотеченій.

**Хлѣбенка**, см. Кровохлебка лекарственная (*Sanguisorba officinalis* L.).

**Хлѣбикъ пчельный**, см. Клеверъ луговой (*Trifolium pratense* L.).

**Хлѣбная травка**, см. Бѣлозоръ болотный (*Parnassia palustris* L.).

- Хлѣбникъ**, см. Сусакъ зонтичный (*Butomus umbellatus* L.).
- Хлѣбникъ**, см. Бѣлокрыльникъ болотный (*Calla palustris* L.).
- Хлѣбникъ полевой**, см. Клеверъ луговой (*Trifolium pratense* L.).
- Хлѣбница**, см. Сусакъ зонтичный (*Butomus umbellatus* L.).
- Хлѣбница**, см. Бѣлокрыльникъ болотный (*Calla palustris* L.).
- Хлѣбница**, см. Иванъ-чай (*Epilobium angustifolium* L.).
- Хлѣбное дерево** (*Artocarpus incisa* L.). Высокое дерево съ большими 9-тилопастными вырѣзными листьями и круглыми отъ 3—4 ф. въсомъ, тяжелыми дынеобразными, величиною съ голову новорожденнаго ребенка, плодами. Отечество, по всей вѣроятности, Остъ-Индія; нынѣ культивируется и распространено въ Востъ-Индіи. Но въ Америкѣ оно является распространеннымъ болѣе какъ декоративное дерево, ради своей красивой, густой листвы, чѣмъ ради своихъ плодовъ, составляющихъ для туземныхъ жителей тропическихъ странъ главнѣйшій родъ пищи. Въ продолженіе 8—9 мѣсяцевъ дерево приноситъ такіе обильные плоды, что 2—3 дерева могутъ прокормить человѣка въ продолженіе цѣлаго года. Плоды собираются недозрѣлыми; въ это время мясо плода снѣжно-бѣлаго цвѣта, рыхло и мучнисто. Съ нихъ снимаютъ толстую кожуру, рѣжутъ на ломтики, которые пекутъ на горячихъ камняхъ; въ такомъ видѣ они могутъ долго сохраняться и получаютъ вкусъ пше-ничнаго хлѣба. Островитяне изъ плодовъ хлѣбнаго дерева приговляютъ запасы, для чего они вырываютъ яму, наполняютъ ее очищеннымъ мясомъ плода и прикрываютъ листьями. По прошествіи нѣкотораго времени плоды закисаютъ, и получается родъ тѣста, которое берутъ по мѣрѣ надобности, дѣлаютъ изъ него шарики и пекутъ такъ-же, какъ и свѣжіе плоды. Изъ каштанообразныхъ свмянъ добываютъ родъ картофельной муки или употребляютъ ихъ въ пищу въ поджаренномъ видѣ. Древесина идетъ на постройку домовъ, волокна молодыхъ побѣговъ употребляются для пряжи; молочный сокъ, вытекающій изъ подъ коры, съ прибавленіемъ къ нему кобосоваго молока служить, какъ клей, а изъ смѣси его съ сахаромъ, бѣлкомъ и опилками приготовляютъ мастику или замазку. Листья служатъ вмѣсто оберточной бумаги для различныхъ съѣстныхъ припасовъ. Опавшія мужскія сережки могутъ замѣнять трутъ.
- Хлѣбный корень**, см. Иньяма (*Dioscorea Batatas* L.).
- Хлѣбощенка**, см. Гроздовникъ обыкновенный (*Batrachium Lunaria* L.).
- Хлѣбѣдка**, см. Черноголовка обыкновенная (*Prunella vulgaris* L.).
- Хлѣбушка**, см. Клеверъ луговой (*Trifolium pratense* L.).
- Хлѣбъ бабочкинъ** } см. Клеверъ луговой (*Trifolium pratense* L.).
- Хлѣбъ Вожій** } se L.).
- Хлѣбъ заячій**, см. Трюфель (*Tuber*).
- Хлѣбъ кукушачій**, см. Черноголовка обыкновенная (*Prunella vulgaris* L.).

**Хлѣбъ пьяный**, см. Плевель опьяняющій (*Lolium temulentum* L.).

**Хлѣбъ свиной**, см. Дряква европейская (*Cyclamen europaeum* L.).

**Хлѣбъ свиной**, см. Чина клубненосная (*Lathyrus tuberosus* L.).

**Хмелеградъ обыкновенный** (*Ostrya carpinifolia* Scop.). Дерево выш. въ нѣсколько сажень, произрастающее въ южной Европѣ и изрѣдка встрѣчающееся въ Закавказьѣ, изъ семейства «дѣщинныхъ» (*Corylaceae*). Листья черешковые, продолговато-яйцевидные, заостренные, при основаніи почти сердцевидные, по краямъ doubly-пильчатые. Цвѣты однодомные въ висячихъ сережкахъ. Тычиночныя сережки цилиндрическія, длинныя, съ плосковидными чешуйками; пыльники снабжены пучкомъ волосковъ. Пестичныя сережки во время созрѣванія плодовъ имѣютъ яйцевидно-цилиндрическую форму и напоминаютъ хмелевую шишку. Плодъ—орышекъ, заключенный въ зеленоватую совершенно замкнутую яйцевидную продолговатую плюску. Цвѣтетъ весной.

**Хмелевая**, см. Люцерна хмелевая (*Medicago lupulina* L.).

**Хмелевая трава** } см. Гречиха-вьюнокъ (*Polygonum Convol-*

**Хмелевка** } *vulus* L.).

**Хмелевка**, см. Погремокъ обыкновенный (*Rhinanthus Crista Galli* L.).

**Хмелевка дикая** } см. Клеверъ полевой (*Trifolium agrarium* L.).

**Хмелекъ**, см. Погремокъ обыкновенный (*Rhinanthus Crista Galli* L.).

**Хмелица**, см. Хмель обыкновенный (*Humulus Lupulus* L.).

**Хмель**, см. Хмель обыкновенный (*Humulus Lupulus* L.).

**Хмель дикій**, см. Вьюнокъ заборный (*Convolvulus sepium* L.).

**Хмель дикій**, см. Донникъ лекарственный (*Melilotus officinalis* Lam.).

**Хмель дикій**, см. Черноголовка обыкновенная (*Prunella vulgaris* L.).

**Хмель дикій**, см. Погремокъ обыкновенный (*Rhinanthus Crista Galli* L.).

**Хмель заячій**, см. Вязиль разноцвѣтный (*Coronilla varia* L.).

**Хмель обыкновенный** (*Humulus Lupulus* L.). Хмель, Хмѣль, Хмиль (Вор.), Хмѣль (Малор.), Горкачъ (Орл.), Цвиль, Хмелица. Двудомная трава изъ семейства крапивныхъ (*Urticaceae* Juss.), распространенная почти по всей Европѣ и почти во всей Россіи, съ высокимъ вьющимся 4-хъграннымъ стеблемъ. Листья супротивные, черешковые, 3—5-ти-лопастные, при основаніи сердцевидные, по краямъ крупно-пильчатые. Тычиночныя цвѣты мелкие, желтовато-зеленые, въ рыхлыхъ метелкахъ; околоцвѣтниківъ о 5 доляхъ; тычинокъ 5; пестичныя цвѣты въ яйцевидныхъ головкахъ, сидящихъ на ножкахъ въ углахъ листьевъ; во время плодосозрѣванія эти головки превращаются въ довольно крупныя (до 3—4 см. длины) зеленовато-желтыя шишки, состоящія изъ разросшихся черешчато-расположенныхъ прицвѣт-



никовъ, въ углахъ которыхъ скрыты плоды-орѣшки. Завязь верхняя одностыльная, съ 2-мя рыльцами. Цвѣтники усыяны желтыми железками, содержащими дупулинъ, горькое ароматическое вещество, которое сообщаетъ пиву горечь и прочность. Растетъ между кустарниками, въ лѣсахъ и по берегамъ рѣкъ. Воздѣлывается въ большомъ количествѣ ради дупулина, употребляемаго въ пивовареніи и въ медицинѣ. Молодые побѣги могутъ употребляться въ пищу, какъ спаржа или зеленые бобы. Стебли могутъ быть обрабатываемы, какъ конопля, для приготовленія пряжи и бумаги. (Табл. XLVI, фиг. 264.)

**МЕДИЦИНСКОЕ УПОТРЕБЛЕНІЕ.** Въ прежнее время хмель считался врачами хорошимъ средствомъ, помогающимъ пищеваренію и дѣйствующимъ противоцинготно; его давали въ отварѣ 0,5—1,0—1,5 грм. (8 гр.—16 гр.—24 гр.) отъ 2—5-ти разъ въ день; также его прибавляли въ припарки для успокоенія болей; изъ него дѣлали ванны, головками хмеля набивали подушки, которымъ приписывалось свойство дѣйствовать усыпляющимъ образомъ.

Въ настоящее время врачи рѣдко выписываютъ чистый хмель; чаще они употребляютъ содержащіяся въ немъ железки, такъ называемыя *glandulae lupuli* (дупулинъ). Эти железки имѣютъ свойство дѣйствовать успокаивающимъ образомъ на тазовые органы и даются при раздраженіи мочевого пузыря и частыхъ позывахъ на мочеиспусканіе. Дупулинъ дается въ видѣ порошка, на приемъ 0,2—0,6 грм. (отъ 3-хъ до 10 гранъ).

Въ ветеринарной медицинѣ хмель употребляется въ тѣхъ-же случаяхъ, какъ и польнь. Но при высокихъ степеняхъ слабости и при водянкѣ хмелю дается предпочтеніе. Чаще всего его даютъ въ отварѣ изъ 30—45 грм. (1 унцъ—1½ унца) на 350 гр. (1 фунтъ) воды.

**Хмель огородный, см. Черноголовка обыкновенная** (*Prunella vulgaris* L.).

**Хмель полевой, см. Купальница европейская** (*Trollius europaeus* L.).

**Хмельникъ, см. Гречиха-вьюнокъ** (*Polygonum Convolvulus* L.).

**Хмелюкъ дикий, см. Скерда кровельная** (*Crepis tectorum* L.).

**Хмилъ, см. Хмель обыкновенный** (*Humulus Lupulus* L.).

**Хмира, см. Синюха обыкновенная** (*Polemonium coeruleum* L.).

**Хмилъ, см. Хмель обыкновенный** (*Humulus Lupulus* L.).

**Хмызокъ, см. Иванъ-чай** (*Epilobium angustifolium* L.).

**Холера** } см. Дурнишникъ колючій (*Xanthium spinosum* L.).

**Холерная трава** }

**Холодецъ** } см. Спаржа обыкновенная (*Asparagus officinalis* L.).

**Холодецъ** }

**Холодецъ заячій** }

**Холодъ а-мята, см. Мята перечная** (*Mentha piperita* Smith.).

**Холодокъ, см. Спаржа обыкновенная** (*Asparagus officinalis* L.).

**Холодокъ, см. Ежевика обыкновенная** (*Rubus fruticosus* L.).

**Холодокъ, см. Ласточникъ обыкновенный** (*Vincetoxicum officinale* Moench.).

**Холодокъ заячій**, см. Спаржа обыкновенная (*Asparagus officinalis* L.).

**Холодянка**, см. Кошачьи лапки (*Antennaria dioica* Gärtn.).

**Хома желтая**, см. Вербейникъ обыкновенный (*Lysimachia vulgaris* L.).

**Хонга**, см. Сосна обыкновенная (*Pinus silvestris* L.).

**Хорохоньки** } см. Ханьки (*Cucurbita olerifera* L.).

**Хорошки**

**Хохлатка**, см. Хохлатка плотная (*Corydalis solida* Smith.).

**Хохлатка**, см. Хохлатка полая (*Corydalis cava* Schw.).

**Хохлатка желтая** (*Corydalis lutea* DC.). Однолѣтнее травянистое растение изъ семейства «дымянковыхъ» (*Fumariaceae* DC.), произрастающее на каменистыхъ мѣстахъ въ южной Европѣ, выш. до 7 вершк. Цвѣты блѣдножелтые. Листья очередные, мелко-разсѣченные. Чашечка двулистная, опадающая. Вѣнчикъ 4-хлепестный, съ короткимъ, широкимъ шпорцемъ. Плодъ — одногнѣздная стручковидная двустворчатая коробка. Иногда разводится въ садахъ. (Рис. 315.)

**Хохлатка плотная** (*Corydalis solida* Smith.). Бобовый корень. Головастикъ (Вор., Екат.), Грыжная (Вятск.), Земляные орѣшкы (Костр., Кал.), Кокорникъ, Горькая рѣпка (Берез.), Растъ, Рясть, Рясъ (Малор.), Растъ петрушковый (Умань) и изм. Арасть, Ласъ, Лосъ, Лпсъ, Изсекъ, Чистикъ (Костр.), Хохлатка, Сардана, Листва. Многолѣтнее травянистое растение изъ семейства «дымянковыхъ» (*Fumariaceae* DC.), распространенное въ средней и сѣверной Европѣ, въ сѣверной и средней Россіи, съ плотнымъ, сплюснутымъ шаровиднымъ подземнымъ клубнемъ, съ двойко-тройственными листьями и съ свѣтло-пурпуровыми цвѣтками въ вѣрхстоящей кисти, съ клиновидными, спереди надрѣзанными, прицвѣтниками. Чашечка 2-листная. Вѣнчикъ 4-хлепестный, неправильный; верхній лепестокъ со шпорой. Тычинки — сросшіяся нитями въ 2 пучка, находящіеся противъ двухъ боковыхъ лепестковъ; нижняя часть каждого пучка несетъ наверху одинъ 2-гнѣздный пыльникъ въ срединѣ, а по сторонамъ 2 одногнѣздные пыльника; завязь одногнѣздная, съ нитевиднымъ столбикомъ. Плодъ — коробочка съ черными блестящими сѣменами. Цвѣтетъ рано весной. Растетъ въ рощахъ и между кустарниками.

**Хохлатъ а полая** (*Corydalis cava* Schw.). Коренья гнилые (Сибирь), Хохлатка, Півника, Кокорички, Рясть бычій (Малор.), Растъ плацнтовой (Умань), Собачка (Орл.). Многолѣтнее травянистое растение изъ семейства «дымянковыхъ» (*Fumariaceae* DC.), распространенное въ средней Европѣ, въ средней и юго-западной Россіи, выш.  $3\frac{1}{2}$  — 7 вершковъ, съ полымъ подземнымъ клубнемъ, принимающимъ видъ широкаго конуса, изъ верхушки котораго выходитъ стебель съ двумя двойко-тройственными листьями; листочки 2 — 3-храздѣльные, съ продолговатыми участками. Грязнопурпуровые, лиловые или бѣлые цвѣты въ кистяхъ, съ травянистыми цѣльными эллиптическими кроющими прицвѣтниками. Чашечка 2-листная; вѣнчикъ неправильный,

4-хлестный, верхній легестокъ со шпорою; тычинки, сросшіяся нитями въ 2 пучка, находящіеся прѣтвъ 2-хъ боковыхъ лепестковъ. Завязь одногвѣдная, съ нитевиднымъ столбикомъ. Плодъ — коробочка. Цвѣтетъ весной. Растетъ въ тѣнистыхъ мѣстахъ.

**МЕДИЦИНСКОЕ УПОТРЕБЛЕНІЕ.** Хохлатка полая прежде употреблялась въ менициѣ, какъ средство, вызывающее остановившіеся мѣсячныя отдѣленія и помогающее правильному отдѣленію послѣ родовыхъ очищеній. Теперь она совсѣмъ оставлена.

**Хохляница** }  
**Хохлянка** } см. Морошка (*Rubus arcticus* L.).  
**Хох. уха** }

**Храбустъ**, см. Чертополохъ курчавый (*Carduus crispus* L.).  
**Храбустъ**, см. Чертополохъ огородный (*Cirsium oleraceum* All.).  
**Хранитель**, см. Борецъ желтый (*Aconitum lycostomum* L.).  
**Хр. повникъ**, см. Чистецъ болотный (*Stachys palustris* L.).  
**Храпунъ**, см. Люперна полевая (*Medicago sativa* L.).  
**Хребовая трава**, см. Желтушникъ левкойный (*Erisimum cheiranthoides* L.).

**Хрѣнь** }  
**Хрѣнь** } см. Хрѣнь (*Armoracia rusticana* Fl.).

**Хрестики**, см. Клеверъ бѣлый ползучій (*Trifolium repens* L.).

**Хрестъ-трава** }  
**Хрестъ-зілле** } см. Вороній глазъ (*Paris quadrifolia* L.).

**Христопроданка**, см. Борецъ желтый (*Aconitum lycostomum* L.).

**Хрищатникъ**, см. Гравіата городская (*Geum urbanum* L.).

**Хрипнякъ**, см. Иванъ-чай (*Epilobium angustifolium* L.).

**Хрінця** }  
**Хрінокъ** } см. Перечникъ широколистный (*Lepidium latifolium* L.).

**Хрінокъ** }  
**Хрінъ** } см. Хрѣнь (*Armoracia rusticana* Fl.).

**Хробостъ**, см. Крушина слабительная (*Rhamnus cathartica* L.).

**Хробустъ** }  
**Хрбустъ** } см. Чертополохъ курчавый (*Carduus crispus* L.).

**Хробустъ** }  
**Хробустъ жовтый** } см. Чертополохъ огородный (*Cirsium oleraceum* All.).

**Хрустаецъ** }  
**Хруставка** } см. Макъ самоейка (*Papaver Rhoeas* L.).

**Хрустальная травка** (*Mesembrianthemum cristallinum* L.).

Дьяникъ, Ледяная трава, Ледянка, Ледякъ, Морозъ. Сочное растение, встречающееся въ садахъ, имѣющее много красиво цвѣтущихъ видовъ и разновидностей.

**Хрыбустъ**, см. Чертополохъ огородный (*Cirsium oleraceum* All.).

**Хрыпнякъ**, см. Иванъ-чай (*Epilobium angustifolium* L.).

**Хрѣнна**, см. Перечникъ широколистный (*Lepidium latifolium* L.).

**Хрѣнина** }  
**Хрѣничникъ** } см. Хрѣнь (*Armoracia rusticana* Fl.).

**Хрѣновица**, см. Тимьянъ обыкновенный (*Carum Carvi* L.).

**Хрѣнь** (*Armoracia rusticana* Fl. sin. *Cochlearia Armoracia* L.). Фарма-

цвѣтическое назв.: *Raphanus rusticus*. Рѣдка бѣлая, Рѣдка полевая, Хрѣнь дикій, Хрѣн (Малор.), Хрѣнь (Пск.), Хрѣнь (Н. вг.), Хрѣнь, Хрѣнчикъ (Шил.). Хрѣнъ, Хрѣня, Водозрѣль. Многолѣтнее травянистое растение изъ семейства крестоцвѣтныхъ (*Cruciferae* Juss.), родомъ изъ юго-восточной Европы, встрѣчающееся изрѣдка почти во всей Россіи, выш. 14—22½ верш. Прикорневые листья большіе, продолговатыя, городковые, съ длинными черешками. Нижніе стеблевые часто гребенчатогораздѣльные, верхніе ланцетовидные. Многочисленные бѣлые цвѣты расположены кистями. Чашечка 4-лиственная. Лепестковъ 4. Тычинокъ 6, изъ которыхъ 2 короче остальныхъ. Плоды—почти шаровидные стручки безъ срединной жилки на створкахъ. Цвѣтеть съ мая по июль. Растетъ на сырыхъ мѣстахъ и по берегамъ рѣкъ. Извѣстенъ, какъ огородное растение, разводится ради мясистыхъ корней, употребляемыхъ въ пищу ввѣтъ приправы. (Рис. 316.)

**МЕДИЦИНСКОЕ УПОТРЕБЛЕНІЕ.** Корни хрѣна собираются осенью и сберегаются на погрѣбахъ въ песокѣ. Они содержатъ въ себѣ вмѣстѣ съ крахмаломъ сахаръ, декстрины, бѣлокъ и эфирное масло, имѣющее общія свойства съ горьчичнымъ масломъ. Въ настоящее время хрѣнь никогда не прописывается врачами и очень рѣдко употребляется въ домашнемъ быту. Разрѣзаннымъ или натертымъ на теркѣ хрѣномъ, смѣшаннымъ съ пивомъ или виномъ, въ народѣ лечатъ отъ цынги, или-же пьютъ смѣсь эту для возбужденія аппетита и для того, чтобы вызвать отдѣленіе мокроты.

**Хрѣнь водяной** (*Nasturtium amphibium* R. Br.). Фарм. цвѣтическое назв.: *Sisymbrium amibium* s. *Raphanus aquaticus* (Herb. et Rad.). Гарюла (Орл.), Желтый цвѣтъ, Жеруха. Кустовникъ (Могил.), Рѣзуха водяная. Многолѣтнее травянистое растение изъ семейства «крестоцвѣтныхъ» (*Cruciferae* Juss.), распространенное почти во всей Европѣ и во всей Россіи. Стебель выш. 11—2½ верш., при основаніи укореняющійся, съ ползучими побѣгами, въ водѣ раздутый, трубчатый. Листья продолговато-ланцетные, нижніе перисто-разсѣченные или широкоромбоидно-надрѣзные. Цвѣты мелкіе, золотисто-желтые, въ кистяхъ. Чашечка 4-лиственная. Лепестковъ 4. Тычинокъ 6, изъ которыхъ 2 короче остальныхъ. Плоды—овальные или почти шаровидные стручки въ 2—3 раза короче цвѣтоножки. Растетъ на сырыхъ, болотистыхъ мѣстахъ, по берегамъ рѣкъ и озеръ, часто въ самой водѣ. Цвѣтеть съ мая до июля. (Рис. 317.)

**МЕДИЦИНСКОЕ УПОТРЕБЛЕНІЕ.** По своему дѣйствию водяной хрѣнь имѣетъ много общаго съ ложечною травой. Собирается онъ въ началѣ іюня или во второй половинѣ мая. Употребляется свѣжій сокъ растенія для т. н. весенняго леченія противъ скорбута, катаръ желудочно-кишечнаго канала и какъ мочегонное, противъ различныхъ болѣзней, какъ-то: водянки, желтухи, подагры, каменной болѣзни и также противъ глистовъ. Свѣже выжатый сокъ принимается столовыми ложками 2—3 раза въ день одинъ или въ смѣси съ сокомъ кервеля, одуванчика, дымянки и

корня цикоріи. Сокъ этотъ принимаютъ въ сыворотѣхъ или зельтерской водѣ.

Отваръ растенія полезенъ для рогатаго скота, страдающаго чахоткою.

**Хрѣнъ водяной**, см. Крессъ водяной (*Nasturtium officinale* L.).

**Хрѣнъ дикій**, см. Хрѣнъ (*Armoracia rusticana* Fl.).

**Хрѣнъ ложечный**, см. Ложечная трава (*Cochlearia officinalis* L.).

**Хрѣнъ лѣсной**, см. Манжетка обыкновенная (*Alchemilla vulgaris* L.).

**Хрѣнъ полевой**, см. Ложечная трава (*Cochlearia officinalis* L.).

**Хрѣнъ собачій**, см. Перечникъ широколистный (*Lepidium latifolium* L.).

**Хрѣпальникъ**, см. Иванъ-чай (*Epilobium angustifolium* L.).

**Худума**, см. Марьянникъ полевой (*Melampyrum arvense* L.).

**Хупавка**, см. Ромашка римская (*Anthemis nobilis* L.).

**Хурма**, см. Финикъ дикій (*Diospyros Lotus* L.).

**Хәнне**, см. Алкална настоящая (*Lawsonia alba* Lam.).

## Ц.

**Цапцелія**, см. Воронецъ колосистый (*Actaea spicata* L.).

**Царапница**, см. Подмаренникъ цѣлкій (*Gallium Aparine* L.).

**Царикъ**, см. Ятрышникъ древлікъ (*Orchis Morio* L.).

**Царица луговъ**, см. Медунца (*Spiraea ulmaria* L.).

**Царскій корень** (*Imperatoria Ostruthium* L.) Фармацевтическое назв.: *Imperatoria* s. *Ostruthium* (R. dix), *Cormus Imperatoriae*.

Царъ зелье, Царскій костыль. Многолѣтнее травянистое растеніе изъ семейства зонтичныхъ» (*Umbelliferae* Juss.), распространенное въ горахъ сре ней Европы, встрѣчающееся въ западныхъ губ. Россіи. Стебель круглый, листья слегка пушистые, двойко-тройственные, съ вздутыми влагалищами, съ крупными 2-3 храздѣльными сегментами и об авно-яйцевидными пальчатыми, спереди двойко-пальчатыми долями. Цвѣты бѣлые въ крупныхъ зонтикахъ; лучи ихъ мелко пушистые. Зубцы чашечки незамѣтны. Лестковъ и тычинокъ по 5. Завязь нижняя двугнѣздная, съ 2-мя столбиками. Плодъ — овальная двусѣмянка, сплюснутая со спинки сѣмлюкъ. Цвѣтетъ во второй половинѣ лѣта. Корень растенія прибавляютъ къ зеленому швейцарскому сыру.

**МЕДИЦИНСКОЕ УПОТРЕБЛЕНІЕ** въ настоящее время совершенно оставлено; въ прежнее время растеніе считалось средствомъ отъ астмы и усиленнаго отдѣленія гнойной мокроты изъ легкихъ. **Царскій костыль**, см. Царскій корень (*Imperatoria Ostruthium* L.).

**Царскія кудри**, см. Кудри царскія (*Lilium Martagon* L.).

**Цар-зілле**, см. Чина черная (*Orobus niger* L.).

- Цар-зілле, см. Лютикъ ядовитый (*Ranunculus sceleratus* L.).  
 Царь, см. Ятрышникъ-дремликъ (*Orchis Morio* L.).  
 Царь-зелье, см. Борецъ желтый (*Aconitum lycoctonum* L.).  
 Царь-зелье, см. Стальникъ пахучій (*Ononis hircina* Jacq.).  
 Царь-зелье, см. Лапчатка серебристая (*Potentilla argentea* L.).  
 Царь-зелье, см. Мать и мачиха (*Tussilago Farfara* L.).  
 Царь-Муромъ, см. Чертополохъ курчавый (*Carduus crispus* L.).  
 Царь-трава, см. Боръ цъ желтый (*Aconitum lycoctonum* L.).  
 Царь-трава, см. Башмачекъ красный (*Cypripedium macranthum* Swartz.).  
 Царь трава, см. Ясенець бѣлый (*Dictamnus Fraxinella* Pers.).  
 Царь-трава, см. Петровъ крестъ (*Lathraea Squamaria* L.).  
 Царь-трава, см. Ятрышникъ-дремликъ (*Orchis Morio* L.).  
 Царь-трава, см. Бѣлокопытникъ лекарственный (*Petasites officinalis* Moench.).  
 Царь трава, см. Лютикъ бѣлый (*Ranunculus acer* L.).  
 Цацки, см. Клеверъ луговой (*Trifolium pratense* L.).  
 Цварское сѣмя, см. Цитваръ настоящая (*Artemisia Sieberl* Bess.).  
 Цвигрій, см. Шалфей мутовчатый (*Salvia verticillata* L.).  
 Цвиль, см. Хмель обыкновенный (*Humulus Lupulus* L.).  
 Цвиль, см. Ряска маленькая (*Lemna minor* Schl.).  
 Цвинтарей } см. Золототысячникъ обыкновенный (*Erythraea*  
 Цвинтарія } *Centaureum* L.).  
 Цвинтарникъ, см. Ясколка обыкновенная (*Cerastium vulgatum* L.).  
 Цвѣтъ малиновый, см. Резеда душистая (*Reseda odorata* L.).  
 Цвѣтловъ лѣсная, см. Василекъ луговой (*Centaurea jacea* L.).  
 Цвѣтки, см. Душица обыкновенная (*Origanum vulgare* L.).  
 Цвѣтки бѣлые, см. Тысячелистникъ обыкновенный (*Achillea Millefolium* L.).  
 Цвѣтки бѣлые, см. Поповникъ обыкновенный (*Chrysanthemum Leucanthemum* L.).  
 Цвѣтки воробьиные, см. Горошекъ мышиный (*Vicia cracca* L.).  
 Цвѣтки голубые, см. Василекъ синий (*Centaurea Cyanus* L.).  
 Цвѣтки красные, см. Травянка (*Lanthus deltoides* L.).  
 Цвѣтникъ, см. Герань луговая (*Geranium pratense* L.).  
 Цвѣтовникъ, см. Бересклетъ европейскій (*Evonymus europaeus* L.).  
 Цвѣтокъ мышиный, см. Васильки погатые (*Delphinium Consolida* L.).  
 Цвѣтокъ пирожки, см. Колокольчикъ персиколлистный (*Campanula persicifolia* L.).  
 Цвѣтокъ синий, см. Циторій обыкновен. (*Cichorium Intybus* L.).  
 Цвѣточникъ, см. Кизильникъ обыкновенный (*Coloneaster vulgaris* Lindl.).  
 Цвѣточникъ, см. Бересклетъ европейскій (*Evonymus europaeus* L.).

- Цвѣточникъ, см. Золотая розга (*Solidago Virgaurea* L.).  
 Цвѣтуха, см. Пунавка красильная (*Anthemis tinctoria* L.).  
 Цвѣтуха, см. Капуста цвѣтная (*Brassica Cauliflora* L.).  
 Цвѣтуха см. Рогоза широколистная (*Typha latifolia* L.).  
 Цвѣтъ безвременный, см. Зимовникъ осенній (*Colchicum autumnale* L.).  
 Цвѣтъ бездушный, см. Поповникъ непахучій (*Matricaria inodora* L.).  
 Цвѣтъ бѣлый, см. Поповникъ обыкновенный (*Chrysanthemum Leucanthemum* L.).  
 Цвѣтъ бѣлый полевой, см. Поповникъ непахучій (*Matricaria inodora* L.).  
 Цвѣтъ воды, см. Ряска маленькая (*Lemna minor* L.).  
 Цвѣтъ водяной, см. Лилія волиная (*Nymphaea alba* L.).  
 Цвѣтъ вознесенскій, см. Истода обыкновенный (*Polygala vulgaris* L.).  
 Цвѣтъ голубиный, см. Герань луговая (*Geranium pratense* L.).  
 Цвѣтъ гранатный, см. Гранатовое дерево (*Punica Granatum* L.).  
 Цвѣтъ гречишный, см. Кошачьи лапки (*Antennaria dioica* Gärtn.).  
 Цвѣтъ елиной, см. Вербейникъ обыкн. (*Lysimachia vulgaris* L.).  
 Цвѣтъ желтый, см. Девясилъ британскій (*Inula britannica* L.).  
 Цвѣтъ жизни, см. Бѣлозоръ болотный (*Parnassia palustris* L.).  
 Цвѣтъ зелеый, см. Василекъ синий (*Centaurea Cyanus* L.).  
 Цвѣтъ земляничныи, см. Реняшокъ обыкновенный (*Agrimonia Eupatorium* L.).  
 Цвѣтъ Ивановъ, см. Поповникъ непахучій (*Matricaria inodora* L.).  
 Цвѣтъ кагалерскій, см. Голубки обыкновенные (*Aquilegia vulgaris* L.).  
 Цвѣтъ коровій, см. Калужница болотная (*Caltha palustris* L.).  
 Цвѣтъ красный, см. Иванъ-чай (*Epilobium angustifolium* L.).  
 Цвѣтъ красный, см. Фасоль огненная (*Phaseolus multiflorus* Willd.).  
 Цвѣтъ кукушкинъ, см. Дрема кукушкинъ цвѣтъ (*Lychnis flos cuculi* L.).  
 Цвѣтъ лимоновыи, см. Коровякъ черныи (*Verbascum nigrum* L.).  
 Цвѣтъ любовныи, см. Амарантъ трехцвѣтныи (*Amarantus melancholicus* L.).  
 Цвѣтъ-лѣпокъ, см. Смолка (*Lychnis Viscaria* L.).  
 Цвѣтъ малиновыи, см. Ресѣда душистая (*Reseda odorata* L.).  
 Цвѣтъ мать и мачихинъ, см. Мать и мачиха (*Tussilago Farfara* L.).  
 Цвѣтъ медвѣжьи, см. Медвѣжье ухо (*Verbascum Thapsus* L.).  
 Цвѣтъ неувядаемый, см. Амарантъ (*Amaranthus caudatus* L.).  
 Цвѣтъ неумирающій, см. Кермекъ татарскій (*Statice tatarica* L.).

- Цвѣтъ Петровъ, см. Петровъ крестъ (*Lathraea Squamaria* L.).  
 Цвѣтъ полевой, см. Снякъ красный (*Echium rubrum* L.).  
 Цвѣтъ ползковый, см. Наперстянка крупно-цвѣтная (*Digitalis grandiflora* L.).  
 Цвѣтъ розовый, см. Шиповникъ (*Rosa canina* L.).  
 Цвѣтъ сиій, см. Астра дикая (*Aster Amellus* L.).  
 Цвѣтъ синій, см. Колокольчикъ крапиволистный (*Campanula Trachelium* L.).  
 Цвѣтъ синій, см. Снякъ обыкновенный (*Echium vulgare* L.).  
 Цвѣтъ синій, см. Шлеманекъ обыкновенный (*Scutellaria galericulata* L.).  
 Цвѣтъ синій во ржи, см. Василекъ синій (*Centaurea Cyanus* L.).  
 Цвѣтъ собачій, см. Ромашка собачья (*Maruta Cotula* Dc.).  
 Цвѣтъ солнцевъ, см. Солнечникъ обыкновенный (*Helianthemum vulgare* Gärtn.).  
 Цвѣтъ татарскій, см. Цикорій обыкновенный (*Cichorium Intybus* L.).  
 Цвѣтъ троицынъ } см. Аютины глазки (*Viola tricolor* L.).  
 Цвѣтъ троичный }  
 Цвѣтъ удивительный, см. Почная красавица (*Mirabilis Jalapa* L.).  
 Цвѣтъ чабрицынъ, см. Повелка клеверная (*Cuscuta Epithymum* Sm.).  
 Цвѣтъ шахматный, см. Рябчикъ обыкновенный (*Fritillaria Meleagris* L.).  
 Цвѣтъ шаховый, см. Рябчикъ обыкновенный (*Fritillaria Meleagris* L.).  
 Цвѣтъ шиповный, см. Шиповникъ (*Rosa canina* L.).  
 Цвѣтъ яичный, см. Селезеночникъ очереднолистный (*Chrysosplenium alternifolium* L.).  
 Цвѣтъ якусовъ, см. Желтуха (*Senecio jacobea* L.).  
 Цвѣтъ бархатный, см. Маргаритка многолѣтняя (*Bellis perennis* L.).  
 Цвѣты зимніе, см. Цминъ (*Helychrisum arenarium* L.).  
 Цвѣты Ивановы, см. Колокольчикъ сборный (*Campanula glomerata* L.).  
 Цебрикъ, см. Богородская трава (*Thymus Serpyllum* L.).  
 Цевдль, см. Цминъ (*Helychrisum arenarium* L.).  
 Цедоаръ, см. Цитваръ настоящая (*Artemisia Sieberi* Bess.).  
 Целастеръ, см. Целастеръ съдобный (*Celastrus edulis* Vahl.).  
 Целастеръ съдобный (*Celastrus edulis* Vahl). Маленькое деревцо съ членистыми вѣточками, родомъ изъ Аравіи, культивируемое въ садахъ въ Аравіи и Абиссиніи. Сушеные листья арабы кипятятъ съ молокомъ или съ водою и пьютъ какъ чай. Въ Портъ-Натали целастеръ извѣстенъ подъ названіемъ «бушменскаго чая».  
 Центаврія } см. Золототысячникъ обыкновенный (*Erythraea*  
 Центурія } *Centaureum* L.).



Церва, см. Резеда желтая (*Reseda Luteola* L.).  
 Цервенецъ, см. Золототысячникъ обыкновенный (*Erythraea Centaurium* L.).  
 Черемха, см. Черемуха (*Prunus P. dus* L.)  
 Церковникъ, см. Василекъ перистый (*Centaurea Scabiosa* L.).  
 Церковникъ, см. Вичица болотная (*Pedicularis palustris* L.).  
 Церковникъ, см. Запникъ клубненосный (*Phlomis tuberosa* L.).  
 Церыца, см. Амарантъ колосистый (*Amaranthus retroflexus* L.).  
 Цибуль, см. Лукъ обыкновенный (*Allium Cepa* L.).  
 Цибулька когья, см. Шпажникъ черепичатый (*Gladiolus imbricatus* L.).

Цибуля, см. Лукъ обыкновенный (*Allium Cepa* L.).

Цидонія, см. Айва (*Cydonia vulgaris* Pers.).

Цикасъ (*Cycas* L.) Саговая пальма, Пальмортниковая пальма. Высокое дерево съ темною корой и перистыми листьями, одно изъ любимыхъ комнатныхъ и тепличныхъ растений. Молодые листья употребляются туземными жителями о-въ Суматры и Явы въ пищу, какъ овощъ; плоды ѣдятъ съ сахаромъ, а изъ мучнистаго вещества ствола пекутъ хлѣбъ и приготовляютъ низшій сортъ саго.

Цикорея } см. Одуванчикъ лекарственный (*Taraxacum Dens*  
 Цикорій } *Leonis* L.).

Цикорій обыкновенный (*Cichorium Intybus* L.). Фармацевтическое назв.: *Cichorium*. Батоги, Батолки, Батогъ Петровъ, Батигъ Петрів (Малор.), Батожекъ Петровъ. Батоги Петровы, Батоги синие, Горчанка осенняя (Тул.), Палавка, Попутникъ черный, Подорожникъ, Придорожная трава Пуговникъ (Вор.), Солнцева трава, Рыло свиное трава, Цикорій полевой, Цихорная трава, Цвѣтъ татарскій (Сарат.), Цвѣтокъ синий (Сар.), Щербакъ (Стар.), Батанья трава, Желтяница, Шкедра (Н.ж.), Серпникъ (Бесс.), Кульбаба, Артишокъ. Многолѣтнее травянистое растение изъ семейства «сложноцвѣтныхъ» (*Compositae* Adans.), распространенное почти во всей Европѣ и во всей Россіи, выши. 7—12½ вершк., шершаво-волосистое, съ растопыренными вѣтвями. Прикорневые листья собраны розеткой; нижніе стеблевые — струговидные, перисто-надрѣзные или раздѣльные, верхніе стеблевые — малые, ланцетные, цѣльные. Голубые, рѣже розовые или бѣлые цвѣты собраны въ одиночныхъ корзинкахъ, сидящихъ на колючихъ вѣтвяхъ и въ углахъ верхнихъ листьевъ по 2—3. Онѣ бываютъ раскрыты до полудня. Вѣнчикъ у всѣхъ цвѣтовъ язычковый. Тычинокъ 5; пыльники ихъ спаяны въ трубочку, черезъ которую проходитъ столбикъ. Завязь нижняя однолѣздная, съ однимъ столбикомъ и раздвоеннымъ рыльцемъ. Плодъ — сѣмянка съ хохолкомъ. Цвѣтетъ лѣтомъ и осенью. Растетъ на сорныхъ мѣстахъ, около дорогъ и канавъ. Разводится ради корней, которые употребляются, какъ примѣсь къ кофе. Листья употребляются на салатъ. (Табл. XLVI фиг. 262.)

МЕДИЦИНСКОЕ УПОТРЕБЛЕНІЕ растенія извѣстно въ народѣ. Изъ него дѣлають припарки на опухоли железъ, отваромъ обмы-

вають червивыя язвы у скота (въ Нижегородской губ.), внутрь принимаютъ отваръ корня отъ боли въ животъ (Таврич. губ.), отъ ломоты и простуды (Екатери. губ.), отъ младенче кой и зубной боли (Воронежской губ.) и отъ слабо ти (въ Саратов кой губ.)

Врачи корень цикорія больнымъ не выписываютъ. Разводится онъ въ большо е количество и служить суррогатомъ кофе. Корни собираются весною и о снуло и высушиваются. Для медицинскихъ цѣлей годятся только корни дико растущаго цикорія.

**Цикорій полевой**, см. Цикорій обыкновенный (*Cichorium Intibus* L.).

**Цикорія**

**Цикорія дикая** } см. Одуванчикъ лекарственный (Taraxacum dens Leonis L.).

**Цикорія желтая** }

**Цикорія полевая**, см. Ястребинка зонтичная (*Hieracium umbellatum* L.).

**Цикорникъ**, см. Горлица ястребинковая (*Pteris hieracitoides* L.).

**Цикута на тощая**, см. Вехъ ядовитый (*Cicuta virosa* L.).

**Цинготная трава**, см. Вероника ручейная (*Veronica Beccabunga* L.).

**Цинготная трава**, см. Ложечная трава (*Cochlearia officinalis* L.).

**Цинобрикъ**, см. Луговой чай (*Lysimachia Nummularia* L.).

**Цинтурия**, см. Золототысячникъ обыкновенный (*Erythraea Centaureum* L.).

**Циперусъ**, см. Циперусъ съѣдобный (*Cyperus esculentus* L.).

**Циперусъ съѣдобный** (*Cyperus esculentus* L.). Съѣд. Ситовникъ съѣдобный, Циперусъ. Травянистое растение изъ семейства «осоковыхъ» (*Cyperaceae* Juss.) родъ мѣ изъ южной Европы, распространенное, главнымъ образомъ, въ Сибири, въ сѣверной Африкѣ и на Востоку; въ древнiя времена культивировалось повсемѣстно въ Италiи и въ Африкѣ ра и съѣд бныхъ корне- выхъ шишекъ, образующихся во множествѣ на развѣтвленiяхъ главнаго корневища и въ настоящее время также употреб- ляемыхъ въ пищу и какъ суррогатъ кофе. Въ Египтѣ изъ нихъ вы- жимають вкусное масло, а рабы ципготовляютъ очень сладкiй вкусный напитокъ «ракагутъ».

**Цитварь настоящая** (*Artemisia Sieberi* Bess.). Цварекое сѣмя, Целозръ. Цыварно сѣмя, Александрийское сѣмя. Травянистое растение изъ семейства «сложноцвѣтныхъ» (*Compositae* Adams), родомъ изъ Азии. Доставляетъ сѣмя, обладающее сильнымъ прянымъ запахомъ и непрiятнымъ горькимъ вкусомъ и извѣстное въ торговлѣ подъ названiемъ «варварiйскаго африканскаго цитварнаго сѣмени». употребляется и отивъ глистовъ.

**МЕДИЦИНСКОЕ УПОТРЕБЛЕНИЕ.** Высушенныя нераспустившiяся цвѣточныя почки содержатъ въ себѣ дѣйствующее вещество сантонинъ, имѣющий способность умерщвлять круглыхъ глистовъ. Большие прiемы сантонина дѣйствуютъ ядовито. Обаки послѣ введенiя 6-ти гранъ (0,4 грм.) сантонина поражаются дрожью въ конечностяхъ, у нихъ появляются судороги, расширение зрачковъ и потеря сознанiя, а послѣ пробужденiя животныя начинаютъ бѣ-

татъ, какъ сонныя, стучаются головой и мордой о встрѣчающіеся предметы. Такіе-же припадки вызываютъ большіе приемы сантонина и у людей. Даже и отъ небольшихъ приемовъ сантонина появляется такъ называемая ксантопсія, причемъ всѣ предметы кажутся окрашенными въ желтый цвѣтъ; отъ большихъ приемовъ наступаютъ головная боль, чувство разбитости, тошнота и рвота. Кишечныя отпавленія задерживаются. Сантонинъ и цитварное сѣмя даются отъ круглыхъ глистовъ и гораздо рѣже отъ ленточныхъ. Цитварное сѣмя дается въ проникъ отъ 0,3—4,0 грм. (отъ 8 гранъ до 1 драхмы). Такихъ ленточекъ принимаютъ 2—3 штуки въ день, въ теченіе 3—4 дней, послѣ чего даютъ слабительное. Если за дни приема сантонина желудокъ не дѣйствуетъ, ставятъ клизмы.

Чистый сантонинъ сѣдуетъ принимать съ большою осторожностью, отъ 0,3—0,15 грм. ( $\frac{1}{2}$  —  $\frac{2}{3}$  гранъ). Последний приемъ дается только бѣлымъ дѣтямъ и взрослымъ. Сантонинныя ленточки приготавливаются изъ неколада. Каждая содержитъ по  $\frac{1}{2}$  граны и по 1 грану. Такихъ ленточекъ принимаютъ 2—3 штуки въ день, въ теченіе 3—4 дней, послѣ чего даютъ слабительное. Если за дни приема сантонина желудокъ не дѣйствуетъ, ставятъ клизмы.

Въ гомеопатіи употребляютъ спиртную настойку цитварнаго сѣмянъ не только отъ круглыхъ глистовъ, но также отъ перемежающагося лихорадки, коклюша, долго длящихся рвотъ, неправильнаго мочеиспусканія и слабости глазъ.

**Цитронная трава**, см. Мелисса лекарственная (*Melissa officinalis* L.).

**Цитронникъ**, см. Маточникъ (*Dracosephalum Moldavica* L.).

**Цитроль**, см. Лимонъ обыкновенный (*Citrus medica* Risso).

**Цитроль-мелисса**, см. Мелисса лекарственная (*Melissa officinalis* L.).

**Цихонъ**, см. Дубровка (*Veronica Chamaedrys* L.).

**Цихорій**, см. Одуванчикъ лекарственный (*Taraxacum Dens Leonis* Desf.).

**Цихорій**, см. Цихорій обыкновенный (*Cichorium Intybus* L.).

**Цихорія** } см. Одуванчикъ лекарственный (*Taraxacum*

**Цихоръ дикій** } *Dens Leonis* L.).

**Цитарское сѣмя**, см. Цитварь настоящая, (*Artemisia Sieberi* Bess.).

**Цидерь**, см. Чечевича овечья (*Cicer Arietinum* L.).

**Цминъ** (*Helichrisum arenarium* DC.) Фа мацвѣтческое названіе: *Stoechas citrina*, s. *Gnaphallum arenarium* s. *Amaranthus luteus*, s. *Immortalia*, s. *Helichrisum* (Flores). Безмертвникъ, Безалертъ, Смертelnикъ, Золото солнечное, Солнце золотое, Золотистка, Зеницвѣтъ, Косанка трава, Кошачьи лапки, Колячи лапки, Коць лапки (Гр. д.), Кашечки желтыя (Кост.), Сухоцвѣтъ, Чмель, Богородская трава, Горлянка, Золотомысличникъ (Полт.), Калка полевая (Пск.), Печерникъ, Шалей полевой (Пск.), Шелковица (Курск.), Гримотчикъ (Вил.), Гримная трава (Пск.), Жасминъ (Астр.), Жманъ (Бесс.), Коногония (Малор.), Чмрь (Черн.), Цинобравъ (Полт.), Ролгенецъ (Полт.), Жолтенецъ,

Цевдль (Хар.), Порецъ длинный (Пск.). Названія, подъ коими чаще всего встрѣчается это растение: Блошки (Полт.), Головокрутъ (Малор.), Горичка жовта (Малор.) Громникъ (Минск.), Желтица (Курск.), Желтинца (Полт.), Жовтушки (Малор.), Золотуха (Кіев.), Золотушникъ мужской (Вит.), Змѣвникъ лѣсной (Вит.), Зубъ (Вол.), Лесанда желтая. М. розъ-трава (Донъ), Полевые овочки (Кіев.), П лынъ ж лтая (П лт.), Радос ь- равка, Сѣроцвѣтъ (Орл., Тар.), Сѣрозелье, Сухозел ь (Гродн.), Суховѣ ка (Гродн.), Сип жать (Подольск.), Сварливѣць (Малор.), Сварка, Цварка (Умань), Тминъ, Тмянъ (Бел. Росс.), Цминъ жовтый (Зап. Росс.), Цмянъ (Мог.), Чминъ (Кіев., Хар.), Цѣтты зимніе (на Дону). Моголь нее травянистое растение изъ семейства «сложноцвѣтныхъ» (*Compositae* Adams), распространенное въ сред. ей Европѣ, въ юж. ой и сред. ной Россіи (на сѣверѣ доходить до Петербурга) и на Алтаѣ, выш. 3<sup>1</sup>/<sub>2</sub>—7 в. рш., съ нѣсколькими прямостоящимъ стеблями. Все растение бѣло-войлочное. Нижкорневые листья продолговато-обратнояйц. видные, ст. блевые—линейно-ланц. тные. Шаровидныя корзинки собраны густой пикивидной метелкой; обертки у корзинокъ состоятъ изъ перепончатыхъ лимонно-желтыхъ, рѣже оранж. левыхъ, листочковъ. Краевые цвѣты въ корзинкахъ немногочисленные, женскіе (язычковые) расположены въ одинъ р дъ; средннне обоеполовые, трубчатые, 5-чизубчатые. Тычинокъ 5; вильничіи съ придатками и ссаяны въ трубочку, ч рзъ которую проходитъ столбикъ съ раздвоеннымъ рыльцемъ; въ в. го пригн. чини я. Завязь нижняя одногнздна. Плодъ—продолг. агтя. с мянк. съ хохолкомъ изъ одного ряда волосковъ. Цвѣтетъ лѣтомъ. Растетъ на песчаныхъ м. стахъ и въ степяхъ. Все растение доставляетъ желтую краску. Положенное въ одежду, оно пр. дохраняетъ отъ моли.

**МЕДИЦИНСКОЕ УПСТРЕБЛЕНІЕ.** Въ народной медицинѣ отваръ растенія употребляется отъ разлитія желчи, отъ грудной боли, кашля, паралича, лишаевъ, отъ укушенія бешеной собакой, отъ венерической болѣзни, отъ простуды, отъ сумашествія и послѣ родовъ.

- Цминъ жовтый, см. Цминъ (*Helychrisum arenarium* Dc.).  
 Цминъ розовый, см. Ромашки ланки (*Antennaria dioica* Gärtn.).  
 Цми ь, см. Цминъ (*Helychrisum arenarium* Dc.).  
 Цмѣнъ  
 Цмѣнъ желтый } см. Цминъ (*Helychrisum arenarium* Dc.)  
 Цмѣнъ лѣсной, см. Сумешница лѣсная (*Gnaphalium silvaticum* L.).  
 Цмянъ, см. Цминъ (*Helychrisum arenarium* Dc.).  
 Цыбрыкъ, см. Богородская трава (*Thymus Serpyllum* L.).  
 Цыбуля жабячая, см. Сусакъ зонтичный (*Antennaria umbellatus* L.).  
 Цыганка, см. Чина черная (*Orobanchia niger* L.).  
 Цыкорія, см. Одуванчикъ лекарств. (*Taraxacum Dens Leonis* Desf.).  
 Цыкорія дикая, см. Золотая розга (*Solidago Virgaurea* L.).  
 Цыкорія желтая, см. Одуванчикъ лекарственный (*Taraxacum Dens Leonis* Desf.).

- Цыкорія полевая, см. Осотъ огородный (*Sonchus oleraceus* L.).  
 Цыпру ъ, см. А. т. мизія (*Artemisia Abrotanum* L.).  
 Цытварное сѣмя, см. Цытварь настоящая (*Artemisia Sieberi* Bess.).  
 Цыхорная трава, см. Цикорій обыкновенный (*Cichorium Intybus* L.).  
 Цытварное сѣмя, см. Цытварь настоящая (*Artemisia Sieberi* Bess.).  
 Цѣвочникъ, см. Кизильникъ обыкновенный (*Cotoneaster vulgaris* Lindl.).  
 Цѣвочникъ, см. Бузина красная (*Sambucus racemosa* L.).  
 Цѣвочникъ, см. Одуванчикъ лекарственный (*Taraxacum Dens Leonis* Desf.).  
 Цѣдильникъ, см. Кирказонъ обыкновенный (*Aristolochia Clematitis* L.).  
 Цѣлистникъ, см. Очитокъ сѣтрый (*Sedum acre* L.).  
 Цѣломудренникъ, см. Перенъ дикій (*Vitex Agnus Castus* L.).  
 Цѣмержица, см. Лютикъ ползучій (*Ranunculus repens* L.).  
 Цы люха, см. Осока цыкая (*Asperula Aparine* Bleb.).  
 Цѣплянка, см. Полмаренникъ цыкій (*Gallium Aparine* L.).  
 Цѣпнякъ, см. Звѣздчатка злач. ая (*Stellaria graminea* L.).  
 Цѣбуля, см. Лукъ обыкновенный (*Allium Cepa* L.).  
 Цюцки, см. Поповникъ обыкновенный (*Chrysanthemum Leucanthemum* L.).  
 Цякунъ, см. Плаунъ булавистый (*Lycopodium clavatum* L.).

## Ч.

- Чаберъ, см. Чаберъ садовый (*Satureja hortensis* L.).  
 Чаберъ, см. Богородская трава (*Thymus Serpyllum* L.).  
 Чабе ъ боровой, см. Верескъ обыкновенный (*Calluna vulgaris* Salisb.).  
 Чаберъ пахатный, см. Дивала однолѣтняя (*Scleranthus annuus* L.).  
 Чаберъ садовый (*Satureja hortensis* L.). Фармацевтическое назв.: *Satureja hort. s. sativa*. Cunil. sativa, s. hyssopus acrescens (Hb.). Чабер (повсюду). Чаборъ (Белор.) и нем. Чабюръ, Чѣбрь, Чабренъ, Чебрецъ, Чебрѣцъ, Чибрець, Чембаръ, Чебчикъ, Чебрчикъ (Полт.) Шеберъ, Шебернякъ. Однолѣтняя душистая трава изъ семейства «губоцвѣтныхъ» (*Labiatae* Juss.), распространенная въ южной Европѣ, встречающаяся въ Крыму, на Кавказѣ и Сибири. Стебель очень вѣтвистый, выш. 3½–7 вершковъ. Листья линейно-ланцетные, острые. Свѣло-лиловые или бѣлые цвѣты сидятъ по 1—5 въ углахъ листьевъ. Чашечка 5-тизубчатая, вѣнчикъ двугубый: тычинокъ 4; завязь верхняя 4-хлостная, 4-хгнздовая, съ однимъ столбикомъ и 2-храздѣльнымъ рыльцемъ. Плоды по созрѣваніи распадается на 4 орѣшка. Цвѣтетъ во второй половинѣ лѣта. Разводится въ садахъ и огородахъ.

Листья и молодые стебли употребляются для приправы въ кушанья. (Рис. 318.)

Чабѣрь } см. Чабѣрь садовый (*Satureja hortensis* L.).

Чаборъ, см. Душица обыкновенная (*Origanum vulgare* L.).

Чаборъ, см. Богородская трава (*Thymus Serpyllum* L.).

Чаборъ московскій, см. Душевикъ остролистный (*Calamintha Aclinos* L.).

Чабрикъ, см. Богородская трава (*Thymus Serpyllum* L.).

Чабрица-трава, см. Повелика клеверная (*Cuscuta Epithymum* Sm.).

Чабуръ, см. Богородская трава (*Thymus Serpyllum* L.).

Чагырь, см. Эстрагонъ (*Artemisia Dracunculus* L.).

Чагы ть, см. Чай чагырскій (*Saxifraga crassifolia* L.).

Чагиръ, см. Гравилатъ городской (*Geum urbanum* L.).

Чаибу ть, см. Богородская трава (*Thymus Serpyllum* L.).

Чай болотный, см. Луговой чай (*Lysimachia Nummularia* L.).

Чай бушменскій, см. Целастеръ съдоб. (*Celaster edulis* Vahl.).

Чай греческій, см. Шалфей лекарственный (*Salvia officinalis* L.).

Чай джемскій, см. Лабрадорскій чай (*Ledum latifolium* L.).

Чай дикий, см. Таволга пволосная (*Spiraea salicifolia* L.).

Чай европейскій, см. Вероника лекарств. (*Veronica officinalis* L.).

Чай зеленый, см. Чай китайскій (*Thea chinensis* Sims.).

Чай Иванъ, см. Иванъ-чай (*Epilobium angustifolium* L.).

Чай лезуитскій, см. Чайное дерево на, аргвайское (*Plex paraguajensis* Lamb.).

Чай кассинскій, см. Чайное дерево ложное (*Plex Gongonha* Lamb.).

Чай китайскій (*Thea chinensis* Sims.). Чай настоящій, Чай тебу или Бартагонъ, Жуланъ, Чай луганъ, Трава китайская. Вечно-зеленяющій кустарникъ, въ дикомъ видѣ достигающій выш. до 3 сажень, онъ вѣтвистый, съ коротко-черешковыми эллиптическими или продолговато-ланцетными, обрѣзанными по краямъ зазубренными, глянцевитыми, гладкими листьями, съ душистыми обильными цвѣтами, распространенный, главнымъ образомъ, въ Китай, Японию, Корей, Суматру и Яву и въ Южной Америкѣ, составляя обширныя плантаціи. Въ культурномъ видѣ кустарникъ подрѣзываютъ для болѣе легкаго сбора листьевъ. Распространяютъ его посредствомъ разбрасыванія семянъ. Сборъ листьевъ производится на 3-емъ году по посѣву, причемъ листья собираются 3 раза въ продолженіе года: въ первый разъ въ мартѣ и апрѣлѣ, и эти первые молодые нежные глянцевитые листочки носятъ названіе: «цвѣточнаго чая». На седьмомъ году кустъ подрѣзываютъ близь къ корню, чтобы получить свѣжіе новые побѣги и остановить его ростъ. Собранные листья проваливаютъ на воздухѣ, подергиваютъ на угляхъ и свертываютъ руками въ болшіе торговые мѣстахъ чай подвергается дальнѣйшей обработкѣ,

послѣ чего поступать въ торговлю. Различаютъ 3 вида китайскаго чая: Чай зеленый, Чай черный, *Thea stricta*, которые различаются отъ времени сбора и отъ различныхъ способовъ обработки чая.

**МЕДИЦИНСКОЕ УПОТРЕБЛЕНИЕ.** Чай, какъ напитокъ, въ настоящее время и вѣстень всюду. Крепкій отваръ чая содержитъ въ себѣ значительное количество возбуждающаго вещества, дѣйствіе вѣстнаго подобно кофеину. Горячій чай полезенъ отъ пр. студи, когда надо хорошо согрѣться, отъ подагрическихъ болѣй, болѣй въ печени, переходящихъ отъ присутствія желчныхъ камней, въ желчномъ пузырьѣ, отъ кашля; вѣсколько стакановъ горячаго чая вызываютъ усиленное отдѣленіе мочи, которое и дѣйствуетъ благотворно на мочевыя какъ острыя, такъ и хроническія заболѣванія, вызывая усиленный притокъ крови изъ внутреннихъ органовъ въ кожу. Злоупотребленіе крепкимъ чаемъ очень вредно отзывается на нервной системѣ, вызывая общее нервное раздраженіе и безсонницу.

Въ ромеопатіи приготавливаютъ спиртную настойку изъ лучшихъ сортовъ зеленого чая и даютъ ее отъ заболѣваній мочевого пузыря и отъ чувства усталости.

Чай копорекій, } см. Иванъ-чай (*Epilobium angustifolium* L.).

Чай курильскій, } см. Иванъ-чай (*Epilobium angustifolium* L.).

Чай дуганъ, см. Чай китайскій (*Thea chinensis* Sims.).

Чай лу овей, см. Луговой чай (*Lysimachia Nummularia* L.).

Чай лесной, см. Яминникъ душистый (*Asperula odorata* L.).

Чай лесной, см. Линнея сѣверная (*Linnaea borealis* L.).

Чай монгольскій, см. Чай чагырскій (*Saxifraga crassifolia* L.).

Чай настоящій, см. Чай китайскій (*Thea chinensis* Sims.).

Чай парагвайскій, см. Чайное дерево парагвайское (*Ilex paraguajensis* Lamb.).

Чай полевой, см. Ленъ дикій (*Linaria vulgaris* Mill.).

Чай сибирскій, см. Чай чагырскій (*Saxifraga crassifolia* L.).

Чай тебу, см. Чай китайскій (*Thea chinensis* Sims.).

Чай чагырскій (*Saxifraga crassifolia* L.). Баданъ, Ботанъ, Раноцитъ. Чай монгольскій, Чай сибирскій, Чагыръ, Чай чагырскій. Многолѣтнее травянистое растеніе изъ семейства «каменноложковыхъ» (*Saxifragaceae* Dc.), распространенное въ Сиб. при. Стебель выш. отъ 7—14 верш. темнокрае аго цвѣта, съ спирально расположенными обратно яйцевидными, длинночерешковыми, тупыми, зубчатыми, кожистыми листьями. Розовато-красныя цвѣты въ полузонтикѣхъ. Чашечка 5-тираздѣльная; лепестковъ 5; тычинокъ 10; завязь верхняя двухгнѣздная, 2-хл. пестная; столбикъ 2. Плодъ—двухгнѣздная многосемянная коробочка. Встрѣчается часто въ садахъ. Листья, старые и пролежавшіе зиму подъ снѣгомъ, употребляются каймаками вмѣсто чая. Кожи имѣютъ свѣтло-розовое противодѣйствіе гниенію.

Чай чагырскій, см. Гравилатъ городской (*Geum urbanum* L.).

Чай черны, см. Чай китайскій (*Thea chinensis* Sims.).

Чайная трава, см. Девясилъ шершавый (*Inula hirta* L.).

**Чайное дерево**, см. Чай китайскій (*Thea chinensis* Sims.).

**Чайное дерево ложное** (*Plex Gongonha* Lamb.). Чай кассинскій. Дерево, произрастающее въ Бразиліи, листья ко ораго служатъ для приготовленія чая, называемаго кассинскій чайъ.

**Чайное дерево парагвайское** (*Plex paraguayensis* Lamb.). Мате, Гонгона. Кустарникъ, или небольшое деревцо, произрастающій въ лѣсахъ Парагвая и Бразиліи. съ продолговато-ланцетными вѣчно-зеленѣющими листьями, настой которыхъ называется «мате» и составляетъ любимый напитокъ большей части южноамериканцевъ. Въ торговлѣ онъ извѣстенъ также подъ названіемъ «езуитскаго чая» или «травы св. Вареолачея» (*Herbe de St. Barthélemy, Folia Picis paraguayensis* s. *Apalagines*).

**Чаканникъ**, см. Касатикъ водяной (*Iris pseudacorus* L.).

**Чаканъ**, см. Рогоза узколистная (*Typha angustifolia* L.).

**Чаканъ**, см. Рогоза широколистная (*Typha latifolia* L.).

**Чаканы**, см. Рогоза широколистная (*Typha latifolia* L.).

**Чаконъ**, см. Рогоза широколистная (*Typha latifolia* L.).

**Чалма**, см. Асфодель (*Asphodelus ramosus* L.).

**Чалма турецкая**, см. Тыкв. фигурная (*Cucurbita Melopepo* L.).

**Чалтыкъ**, см. Рись посѣвной (*Oryza sativa* L.).

**Чамолочъ**, см. Щетинникъ зеленый (*Setaria viridis* Beauv.).

**Чаполочь** } см. Вѣйникъ наземный (*Colamagrostis Epigeios*

**Чалуга** } Both.)

**Чалула**

**Чапуръ бѣлый**, см. Подмаренникъ сѣверный (*Galium boreale* L.).

**Чапутинскій корень**, см. Сассанарель (*Smilax China* L.).

**Чаранъ** см. Вербейникъ обыкновенный (*Lysimachia vulgaris* L.).

**Чарка Божья**, см. Вьюнокъ заборный (*Convolvulus sepium* L.).

**Чарноквиъ**, см. Колдунъ-травя (*Circaea lutetiana* L.).

**Чаропъ**, см. Вербейникъ обыкновенный (*Lysimachia vulgaris* L.).

**Часникъ кінской**, см. Чесночная трава (*Alliaria officinalis* Andr.).

**Часовая**, см. Грушанка круглолистная (*Pirola rotundifolia* L.).

**Частуха**, см. Частуха обыкновенная (*Alisma Plantago* L.).

**Часуха обыкновенная** (*Alisma Plantago* L.). Фармацевтическое названіе: *Plantago aquatica* (Rad. et. Herb.). Бабка водяная, Бишникъ, Болотная трава (Ниж., Сар.), Бѣликъ (Гамб.), Жовникъ (Умань), Кислица собачья (Олон.), Подшильникъ (Вор.), Пуповикъ, Пуповникъ, Пупошникъ, Скотская трава. Съдличка, Ча туха (Моск.), Чемеридъ водяная (Влад.) Шальникъ, Шильникъ водяной (в. б. ч. Росс.), Бѣшаникъ, Лягушечникъ болотный (Ниж.), Лягушечъ трава, Свирѣль вастушеская. Подорожникъ водяной, Попутникъ водяной, Укусникъ, Вахтовникъ (Волог.), Челуха (Гродн.), Ель водяная (Ворон.), Головишникъ (Екат.), Дикарпа (Н. ж.), Простоволось (Орл.). Многолѣтнее травянистое растеніе изъ семейства «частуховыхъ» (*Alismaceae* Juss.), распространенное почти во всей Россіи. Листья прикорневые, длинно-черешковые, яйцевидные или эллиптическіе, цѣльнокрайніе, большею частью семи-нервные. Стебель безлистный,



округло-трехгранный, выш. до 1½ арш. Цвѣты обоеполые, мелкіе, блѣдно-розовые на длинныхъ ножкахъ, собраны мутовчатой метелкой. Чашечка 3-лиственная; вѣнчикъ 3-хлепестный; тычиночекъ 6; пестикъ и въ многихъ плодничковъ, а плодъ — изъ сухихъ односѣмянныхъ плодиковъ. Цвѣтетъ лѣтомъ. Растетъ на болотистыхъ мѣстахъ, прудахъ и канавахъ.

**Частуха плавающая** (*Plantago patens* L.). Многолѣтнее травянистое растение изъ семейства «частуковыхъ» (*Alismaceae* Juss.), распространенное въ средней Европѣ встречающееся въ Литвѣ. Стебель при основаніи съ линейными листьями, собранными розеткой. Цвѣтоносный побѣгъ толкій, ползучій, дл. 3½ вершк., плавающий на поверхности воды; на каждомъ узлѣ онъ несетъ пучокъ черешковыхъ округлыхъ листьевъ и 2—3 блѣлыхъ цвѣтка. Чашечка 3-лиственная; вѣнчикъ 3-хлепестный; тычиночекъ 6. Плодъ состоитъ изъ 6—12 сухихъ односѣмянныхъ плодиковъ. Цвѣтетъ лѣтомъ. Растетъ на прудахъ и озерахъ.

**Чахница**, см. Полынь стенная (*Linum catharticum* L.).

**Чахотая трава**, см. Чихотная трава (*Pteris aquilina* L.).

**Чахоташная трава**, см. Вязель разноцвѣтный (*Coronilla varia* L.).

**Чахоташная трава**, см. Вахта трилистная (*Menyanthes trifoliata* L.).

**Чахоташница**, см. Колокольчикъ раскидистый (*Campanula patula* L.).

**Чачавиця**, см. Чечвица настоящая (*Erythronium Liliaceum* L.).

**Чашечникъ**, см. Пижма (*Tanacetum vulgare* L.).

**Чашки** } см. Мушмула обыкновенная (*Mespilus germanica* L.).

**Чашковое дерево** }

**Чебакъ**, см. Бадма (*Nelumbium Caspium* L.).

**Чебарка** } см. Богородская трава (*Thymus Serpyllum* L.).

**Чеберъ** }

**Чеботки большіе**, см. Колокольчикъ персиколистный (*Campanula persicifolia* L.).

**Чебрекъ** } см. Богородская трава (*Thymus Serpyllum* L.).

**Чебрець** }

**Чебрець**, см. Душевикъ остролистный (*Calamintha Aclinos* L.).

**Чебрець** } см. Чеберъ садовый (*Satureja hortensis* L.).

**Чебрець** }

**Че рець лісової**, см. Дубровникъ (*Teucrium chamaedrys* L.).

**Чебрикъ**, см. Богородская трава (*Thymus Serpyllum* L.).

**Чебрчикъ**, см. Чеберъ садовый (*Satureja hortensis* L.).

**Чебуръ** } см. Богородская трава (*Thymus Serpyllum* L.).

**Чебчикъ** }

**Чебчикъ**, см. Чеберъ садовый (*Satureja hortensis* L.).

**Чев чушникъ**, см. Бузина красная (*Sambucus racemosa* L.).

**Чевика**, см. Чечвица настоящая (*Erythronium Liliaceum* L.).

**Чембаръ**, см. Чеберъ садовый (*Satureja hortensis* L.).

**Чембарникъ**, см. Кермекъ широколистный (*Statice latifolia* L.).

**Чем орекъ** } см. Богородская трава (*Thymus Serpyllum* L.).

**Чембрикъ** }

Чемера, см. Чемерица бѣлая (*Veratrum album* L.).

Чемерида водяная, см. Частуха обыкновенная (*Alisma Plantago* L.).

Чемерика, см. Чемерица бѣлая (*Veratrum album* L.).

Чемериха бѣлая, см. Бѣлозоръ болотный (*Parnassia palustris* L.).

Чемерица, см. Чемерица бѣлая (*Veratrum album* L.).

Чемерица, см. Кушена лекарственная (*Convallaria Polygonatum* L.).

Чемерида, см. Морозникъ бѣлоцвѣтный (*Helleborus niger* L.).

Чемерица бѣлая (*Veratrum album* L.). Фармацевтическое назв.: *Helleborus albus*, s. *Veratrum* (Radix). Волчокъ. Кади о-трава бѣлая, Кукольникъ (А т.), Чемерица, Чемерица (Ма ор.), Чемера (Костр.), Чемерка (Курск., Кал., Орл., Сиб.), Чемерика (Полт., Сар.), Чемериный корень и изм. Череникъ, Черемисъ (Арх.), Черемина (Перм.), Черемца бѣлая (Полт.), Черемига (Перм.), Жимовца (Тул.). Члѣтокъ. Многолѣтнее ядовитое травянистое растение изъ семейства «лилейныхъ» (*Liliaceae* DC.), разпространенное въ средн. Евр-и и почти во всей Россіи. Стебель облиственный, выш. 14 — 22<sup>1</sup>/<sub>2</sub>, верхн. листья эллиптическіе, стебле-объемлющіе, снизу пушистые, нижніе — очень крупныя. Бѣлые или зеленоватыя цвѣты об-азуютъ верхушечное метельчатое соцвѣтіе. Оголоцвѣтникъ 6-лиственный, звездообразный, остающійся; листочки его значительно длиннѣе цвѣтоножекъ, эллиптическіе, мелкозубчатые. Тычинокъ 6, и прикрыленныхъ къ основанію околоцвѣтника; пыльники по ковидные, прикрѣпленные поперекъ и раскрывающіеся лною щелью. Пестикъ состоитъ изъ 3 недолгихъ пчѣлокъ, верхніе концы которыхъ свободны и несутъ отдѣльныя столбикъ. Плодь — коробочка до средины 3-раздѣльная, съ крыльями сплюснутыми съменами. Цвѣтетъ лѣтомъ. Растетъ на влажныхъ лугахъ и между кустарниками. (Табл. XLVI, фиг. 26.)

**М.ДИЦИНОЕ УПОТРЕБЛЕНІЕ.** Чемерица бѣлая содержитъ въ себѣ сильное дѣйствующее алкалоидъ—*в е р а т р и н ѣ*. Растеніе это извѣстно съ давнихъ поръ.

Помощный на кожу ввидѣ мази или спиртнаго раствора вератрина производятъ дѣйствіе, длѣющееся 15—30 минутъ, коющія боли, которыя у чувствительныхъ людей распространяются за предѣлы приложенія средства, причемъ въ цвѣтъ кожи не замѣчается ник. кою измѣненія; послѣ раздраженія наступаетъ періодъ притупленія чувствительности и ошущеніе холода. Послѣ нѣсколькихъ повторныхъ втираній на кожѣ появляеся сыпь, похожая на коевую. Слизистыя оболочки вератриномъ раздражаются еще сильнѣе. При приемѣ вѣтры вмѣстѣ съ острымъ вкусомъ и чувствомъ парананія въ горлѣ по влѣсая ошущеніе теплоты отъ глотка до желудка, затѣмъ появляются тошнота, рвота, сильныя боли въ животѣ и поносъ, который, какъ и рвота, бываетъ обильный и кровянистый. Рвота можетъ наступить и послѣ обильнаго втиранія вератрина, что служить доказательствомъ его всасыванія

изъ кожи въ кровь. Вообще средство это крайне ядовито и въ настоящее время назначается в ачами только снаружи для втираний отъ различнаго рода невралгій; въ прежнее время оное употреблялся и внутрь отъ воспаления легкихъ, тифа, острыхъ воспалений плевры и сердечныя оболочки. Для мазей берутъ 10—15 гранъ (0.5 — 1.0 грм.) вератрина на  $\frac{1}{2}$  унца (15.0 грм.) какого-нибудь жира.

Въ гомеопатіи бѣлая чемерица имѣетъ очень обширное примѣненіе. Ея спиртная настойка дается отъ болей въ суставахъ, параличъ и дрожаній въ члѣвахъ, невралгій и энцефалы, а затѣмъ отъ исхудѣнія, слабости, склонности къ обморокамъ, крапивной сыпи, чесотки, перемежающагося лихорадки, ипохондрии, меланхолическаго отсутствія энергии, усиленной раздражительности, сумасшествія, глупости, приливовъ крови къ головѣ, отъ волненія и паралича вѣкъ, головныхъ болей, шума въ ушахъ, зубной боли, слюнотеченія, отрыжки, икоты, болей въ животѣ, холеры, вздутія живота, поноса, гемофиі, коклюша, астмы и болей въ сердцѣ. Даютъ 1—2 капли 2, 3, 6, 12 разъ наведенія по нѣсколько разъ въ день.

Въ ветеринарной гомеопатіи дается 3-е и 6-е разведеніе лошадямъ отъ безпокойства, рогагому скогу отъ хроническихъ поносовъ, собакамъ и свиньямъ отъ рвоты.

Въ народной медицинѣ порошокъ изъ листьевъ бѣлой чемерицы присыпаютъ на червивыя язвы скоту (въ Тульской и Саратовской губ.). Оваромъ корня моются отъ шилля (Тульск. губ.). Въ Гродненской губ. пьютъ корень отъ волш. бѣсѣи для этого корень заливаютъ водкой.

**Чемерица китайская** (*Veratrum Sabadilla Schiede*) Сабадилла. Произрастаетъ на травянистыхъ склонахъ горъ въ Мексикѣ. Дослѣдуетъ сѣмена, содержащая въ себѣ ядовитый алкалоидъ, употребляющійся при ревматизмѣ и невралгіяхъ, действуетъ одинаково съ вератриномъ; добываемымъ изъ бѣлой чемерицы (см. выше).

**Чемерица луговая**, см. Ланцетный майскій (*Convallaria majalis* L.).

**Чемерица лѣсная**, см. Купена лекарственная (*Convallaria Polyodon* L.).

**Чемерица лѣсная**, см. Гайникъ широколистный (*Epipactis latifolia* Spr.).

**Чемерица лѣсная**, см. Тайникъ овальный (*Listera ovata* R. Br.).

**Чемерица черная**, см. Герань вѣсенняя (*Adonis vernalis* L.).

**Чемерица черная**, см. Морозникъ бѣлоцвѣтный (*Helleborus niger* L.).

**Чемеричникъ**, см. Морозникъ бѣлоцвѣтный (*Helleborus niger* L.).

**Чемеричный корень** } см. Чемерица бѣлая (*Veratrum album* L.).

**Чемерка** }

**Чемерка**, см. Гайникъ широколистный (*Epipactis latifolia* L.).

**Чемерникъ**, см. Донникъ лекарственный (*Mcilious officinalis* Lam.).

**Чемерыця**, см. Морозникъ бѣлоцвѣтный (*Helleborus niger* L.).

- Ченбарникъ, см. Кермекъ широколистный (*Statice latifolia* L.).
- Чепчикъ } см. Богородская трава (*Thymus*
- Чепчикъ богородишный } *Serpyllum* L.).
- Чепчикъ матерзанка }
- Чербалинникъ, см. Шиповникъ (*Rosa canina* L.).
- Чрвогонникъ, см. Ярмолистъ (*Zygophyllum Fabago* L.).
- Червенецъ, см. Подмаренникъ желтый (*Gallium verum* L.).
- Черзень, см. Снякъ красный (*Echium rubrum* L.).
- Червоточникъ, см. Герань луговая (*Geranium pratense* L.).
- Чрвецъ, см. Лапчатка серебристая (*Potentilla argentea* L.).
- Червецъ, см. Лапчатка сѣровая (*Potentilla canescens* Bess.).
- Чрвецъ } см. Дивала многолѣтняя (*Scleranthus annus* L.).
- Червечникъ }
- Червечникъ, см. Репяшокъ обыкновенный (*Agrimonia Eupatorium* L.).
- Червечникъ } см. Лапчатка серебристая (*Potentilla argen-*
- Червивая трава } *tea* L.).
- Червивая трава, см. Молкопестникъ ѣдкій (*Erigeron acris* L.).
- Червивая трава, см. Сушеница болотная (*Gnaphalium uliginosum* L.).
- Червивецъ, см. Антискорпионъ (*Erodium cicutarium* L.).
- Червишникъ, см. Герань кроваво-красная (*Geranium sanguineum* L.).
- Черивка } см. Лапчатка серебристая (*Potentilla argentea* L.).
- Червичникъ }
- Червичникъ, см. Богородская трава (*Thymus Serpyllum* L.).
- Червишникъ, см. Подмаренникъ желтый (*Gallium verum* L.).
- Червишникъ, см. Герань луговая (*Geranium pratense* L.).
- Червишникъ, см. Лапчатка серебристая (*Potentilla argentea* L.).
- Червишникъ аловый, см. Пастушья сумка (*Capsella Bursa pastoris* Moench.).
- Червленный листъ, см. Легочница лекарственная (*Pulmonaria officinalis* L.).
- Червоточина } см. Лапчатка серебристая (*Potentilla argen-*
- Червоточникъ } *tea* L.).
- Червошникъ, см. Лапчатка узикъ (*Potentilla Tormentilla* L.).
- Червянецъ, см. Лапчатка серебристая (*Potentilla argentea* L.).
- Червяница, см. Румянка лекарственная (*Anchusa officinalis* L.).
- Червячникъ, см. Гулявникъ стручатый (*Sisymbrium Sophia* L.).
- Червышникъ, см. Маслинь почной, или дикій (*Philadelphus coronarius* L.).
- Чревецъ, см. Пастушья сумка (*Capsella Bursa pastoris* Moench.).
- Череливая трава, см. Люцерна серповидная (*Medicago falcata* L.).
- Чевеца, см. Подмаренникъ желтый (*Gallium verum* L.).
- ✓ Черевички, см. Башмачки желтые (*Cypripedium calceolus* L.).
- ✓ Черевички, см. Васильки рогатые (*Delphinium consolida* L.).
- ✓ Черевички, см. Ледвенецъ рогатый (*Lotus corniculatus* L.).
- ✓ Черевички, см. Чина весенняя (*Orobus vernus* L.).

**Черевички Божіей Матери**, см. Недотрога желтая (*Impatiens noli me tangere* L.).

**Черевички зозул ны**, см. Борецъ синий (*Aconitum Napellus* L.).

**Черевички зозулины**, см. Башмачки желтые (*Cypripedium calceolus* L.).

**Черевички зозулины**, см. Васильки рогатые (*Delphinium consolida* L.).

**Черевички зозулины**, см. Ленъ дикій (*Linaria vulgaris* Mill.).

**Черевички зозулины**, см. Чина весенняя (*Orobus vernus* L.).

**Черевички зозулины**, см. Анютины глазки (*Viola tricolor* L.).

**Черевички зозулины черны**, см. Чина черная (*Orobus pinger* L.).

**Черевички полевые**, см. Колокольчикъ круглолистный (*Campanula rotundifolia* L.).

**Черевички черепашиныя**, см. Дрема кукушкинъ цвѣтъ (*Lychnis flos cuculi* L.).

**Черевешникъ**, см. Подмаренникъ желтый (*Gallium verum* L.).

**Черевешникъ**, см. Люцерна серповидная (*Medicago falcata* L.).

**Черевешникъ**, см. Котовикъ голый (*Nepeta nuda* L.).

**Черевная т а а** } см. Горлецъ (*Polygonum Bistorta* L.).

**Черевныя коренья** } см. Горлецъ (*Polygonum Bistorta* L.).

**Череда**, см. Репешокъ обыкновенный (*Agrimonia Eupatorium* L.).

**Череда**, см. Череда трехраздѣльная (*Bidens tripartita* L.).

**Череда полевая**, см. Лишучка ренейчатая (*Echinosperrmium Lap-pula* Lehm.).

**Череда трехраздѣльная** (*Bidens tripartita* L.). Фармацевтическое названіе: *Verbesina* s. *Cannabis aquati* a. Золотухиная трава (по употр.), Кошки (Пенз.), Лепница (Рог.), Остючки (аль), Прычела (Малор.) Репешки (Екат.), Собачки. Репьяхи собач., Репехи собачьи, Репьи собачьи, Собашиникъ (Ниж.), Рожки козы, Стрѣлки, Стрѣлки (Малор.), Товстунка, Чедеда, Чернобривецъ болотный, Яждь, Щередникъ, Бадуйки (Пск.), Малина галочья (Влад.), Лоптунъ (Могил.), Калтца (Тул.). Однолѣтнее травянистое растеніе изъ семейства «сложноцвѣтныхъ» (*Compositae* Adans.), распространенное въ сѣверной и средней Европѣ и по тѣмъ во всей Россіи. Стебель вѣтвистый, выш. 7—22" вверхъ. Листья супротивныя, крѣпко-черешковые, обыкновенно 3-храздѣльные. Кореньки исключительно съ трубчатыми желтыми цвѣтами, снабженныя обертками, концы наружные листочки, оттопыренные, листовидные, значительно крупнѣе внутри нихъ. Тычинокъ 5; пыльники ихъ срастаются въ трубочку, черезъ которую проходить столбикъ съ 2-храздѣльнымъ рыльцемъ. Завязь нижняя одногыздная, односѣмянная. Плодъ — сѣмянки, снабженныя на вѣрхушкѣ большою частью 2-мя зубчатыми острыми шипами. Цвѣтеть во второй половинѣ лѣта. Растетъ на сырыхъ мѣстахъ, по канavamъ и болотамъ. Даетъ желтую краску. (Табл. XLVII, фиг. 266.)

**МЕДИЦИНОКСЕ УПОТРЕБЛЕНІЕ.** Череда прежде употреблялась врачами, какъ мочеоное и потогонное средство; теперь упо-

требление ея известно только въ домашнемъ быту. Череду входить въ составъ такъ называемаго аверина чая, который пьютъ дѣтей отъ золотухи. Въ ней-же кунаютъ золотушныхъ дѣтей. Отваръ сушеныхъ листъ ея череды считается полезнымъ отъ кашля и вялаго пищеваженія. Растертую свѣжую траву крестьяне кладутъ на рану отъ укуса змѣи. Сушеные и истолченные въ порошокъ листья череды производятъ чиханіе подобно табаку.

**Чередникъ**, см. Чернокорень обыкновенный (*Cynoglossum officinale* L.).

**Чередникъ**, см. Горлець (*Polygonum Bistorta* L.).

**Чередникъ**, см. Перець водяной (*Polygonum Hydropiper* L.).

**Черегривца**, см. Копытень европейскій (*Asarum europaeum* L.).

**Черемига**

**Черемикъ** } см. Чемерица бѣлая (*Veratrum album* L.).

**Черемисъ**

**Черемица**, см. Подмаренникъ желтый (*Galium verum* L.).

**Черемица**

**Черемица бѣлая** } см. Чемерица бѣлая (*Veratrum album* L.).

**Черемица трава**, см. Чермша (*Allium ursinum* L.).

**Черемичникъ**, см. Вербейникъ обыкн. (*Lysimachia vulgaris* L.).

**Черемошъ**, см. Черемша (*Allium ursinum* L.).

**Черемуха** (*Prunus Padus* L.). Глотуха. Глотиха (Яросл.), Голотуха, Засадиha (Курск., Тамб., Твер., Влад.), Колоколуша (Смол., Курск., Кіев.), Калакалуша, Черемха (Маор.), Чермущина, Черемшина (Пенз.), Черѣмха (Вѣлор.). Кустарникъ или дерево выш. 1—3 саж. изъ семейства «миндалевыхъ» (*Amygdalaceae*), распространенный почти во всей Европѣ и во всей Россіи. Листья продолговато-эллиптическіе, пильчатые, заостренные; черешокъ листа снабженъ двумя железками. Душистые бѣлые цвѣты въ повислыхъ кистяхъ. Чашечка 5-ти листная; пятилепестный вѣнчикъ и многочисленныя тычинки прикрѣплены къ краямъ вогнутого цвѣтоложа. Завязь одногнѣздная, свободная (не сросшаяся съ цвѣтоложемъ). Плоды—черныя шаровидныя костянки. Цвѣтетъ весной. Растетъ въ лѣсахъ и между кустарниками. Разводится въ садахъ, какъ декоративное растеніе. Изъ зеренъ добывается масло горькихъ миндалей. (Табл. XLVII, фиг. 267.)

**МЕДИЦИННОЕ УПОТРЕБЛЕНІЕ** черемухи известно только въ домашнемъ быту и въ народѣ. Настоящій цвѣтовъ употребляется отъ болѣзни глазъ. Кора молодыхъ вѣтвей содержитъ амигдалинъ дубильное начало и синильную кислоту; отваръ ея имѣетъ мочегонное и потогонное свойство и употребляется отъ ломоты, ревматизма и застарѣлаго спливеа. Кромѣ того, отваръ коры дается больнымъ перемежающеюся лихоракою въ тѣхъ случаяхъ, когда хина не помогаетъ. Листья, заваренные ввидѣ чая, даются больнымъ отъ легочныхъ болѣзней. Этимъ-жъ отваромъ полощатъ ротъ отъ гнилостн. зубовъ, а также принимаютъ его отъ поноса. Толчеными черемуховыми ягодами настаиваютъ бѣлое вино, которое получаетъ очень пріятный вкусъ и полезно отъ слабости пищеваженія.

Черемуха вѣчнозеленая, см. Лавровишневое дерево (*Runus Laureocerasus* L.).

Черемуха душистая, см. Кучина (*Prunus Mahaleb* L.).

Черемушина, см. Черемуха (*Prunus Padus* L.).

Черемушка, см. Черемша (*Allium ursinum* L.).

Черемха, см. Черемуха (*Prunus Padus* L.).

Черемх., см. Крушина ломкая (*Rhamnus frangula* L.).

Черемха, см. Бузина черная (*Sambucus nigra* L.).

Черемша (*Allium ursinum* L.). Фармацевтическое назв.: *Allium ursinum latifolium*. Калба (Зам. Сич.), Левурда (Хар., Черн.), Черемша трава, Черемонъ, Черемша трава, Черемушка (Сл. Церк.). Многолѣнее травянистое луковичное растение изъ семейства «лилейныхъ» (*Liliaceae* DC.), распространенное въ средней и южной Европѣ и изрѣдка встрѣчающееся въ средней, юго-западной Россіи и на Кавказѣ. Луковица продолговатая; стебель цилиндрическій наверху угловатый, выш.  $3\frac{1}{2}$ —7 верш., съ двумя длинно-черешковыми продолговато-ланцетными листьями. Цвѣты бѣлые въ плоскомъ зонтикѣ, снабжены 2—3-раздѣльной поволокою (оберткой). Околоцвѣтникъ звѣздчатый, 6-тилистный. Тычинокъ 6. Завязь 3-хгнѣздная, съ 1 столбикомъ и 3-хлопастнымъ рыльцемъ. Плодь—3хгнѣздная коробочка. Цвѣтъ несной. Растетъ на влажной почвѣ въ лѣсахъ. Все растение пахнетъ чеснокомъ. Листья его употребляются въ пищу.

Медицинское употребленіе оставлено; прежде растение считалось за мочегонное средство.

Черемшина, см. Черемуха (*Prunus Padus* L.).

Черетъ, см. Тросніикъ обыкновенный (*Arundo Phragmites* L.).

Черетянка, см. Вѣшникъ наземный (*Calamagrostis Epigeios* Both).

Черецъ, см. Лапчатка-узикъ (*Potentilla Tormentilla* Schrenk.).

Черешня

Черешня бѣлая

Черешня лѣсная

Черешня махровая

Черешня черная

см. Вишня сладкая (*Prunus Avium* L.).

Чермалукъ, см. Ломоносъ цѣлительный (*Clematis Vitalba* L.).

Черная трава, см. Башмачки крапчатые (*Cypripedium macranthum* Swartz.).

Черная трава, см. Подмаренникъ мягкій (*Galium Mollugo* L.).

Черная трава, см. Подмаренникъ мареновидный (*Galium rubioides* L.).

Черная трава, см. Чина черная (*Orobus niger* L.).

Черная трава, см. Золотая розга (*Solidago Virgaurea* L.).

Черная трава, см. Папоротникъ черный (*Struthiopteris germanica* L.).

Черная трава боровая, см. Чина весенняя (*Orobus vernus* L.).

Чернецъ, см. Черника (*Vaccinium Myrtillus* L.).

Чернецъ, см. Воронецъ колосистый (*Actaea spicata* L.).

**Чернижникъ**, см. Черника (*Vaccinium Myrtillus* L.).

**Черника** (*Vaccinium Myrtillus* L.). Фармацевтическое назв.: *Myrtillus* s. *Pseudomyrtus* s. *Vaccinium nigrum*. Черника (Вѣлор.), Чернианикъ, Черничникъ, Чернишникъ, Чернецъ (Гродн.), Чернѣга (В л., Саратов), Черницотъ (Гродн.), Ягода дриетуха (Твер.). Обыкновенный кустарникъ, выш. от  $3\frac{1}{2}$  до 7 вершк., изъ семейства «вересковыхъ» (*Ericaceae* Lindl.), распространенный почти во всей Европѣ, въ сѣверной и средней Россіи, въ Малоросіи, на Кавказѣ и Сиприи, съ прямостоящими остроугольными зелеными вѣтвями и яйцевидными, мелкопильчатыми, съ обѣихъ сторонъ зелеными листьями. Зеленоватые малые цвѣты сидятъ поодиночкѣ въ углахъ листьевъ; окраина чашечки цѣльная; вѣнчикъ шаровидный съ 5-тизубчатой окантовкой съ отточенными зубцами. Тычинокъ 8—10; гнѣзда пыльниковъ удлинены наверху въ трубочку, открывающуюся на верхушкѣ трубки сѣмянми; завязь нижняя 4-5-тигнѣзная, съ шестиграннымъ столбикомъ съ цѣльнымъ рыльцемъ. Плоды—круглыя черныя ягоды, покрытыя сѣловатымъ налетомъ. Цвѣтетъ въ маѣ, въ юнѣ, а ягоды созреваютъ въ юлѣ и августѣ. Плоды употребляются въ пищу, находятъ примѣненіе въ ликерномъ производствѣ и служатъ также для подкраски вина. (Табл. XLVII, фиг. 269.)

**МЕДИЦИНСКОЕ УПОТРЕБЛЕНІЕ** черники извѣстно въ домашнемъ быту. Ей приписывается свойство помогать отъ поноса; для этой цѣли пользуются съ шеною ягодою, изъ которой варятъ супъ или кисель. Свѣжая ягода считается полезною отъ цынги.

**Черника кавказская** (*Vaccinium Arctostaphylos* L.). Брусника кавказская. Кустарникъ или небольшое деревцо выш. до 1 сажени и болѣе изъ семейства «вересковыхъ» (*Ericaceae* Lindl.), распространенный въ Закавказьѣ, много около Батума; съ округлыми вѣтвями и крупными продолговато эллиптическими мелкозубчатыми листьями. Красно-бѣлые цвѣты въ кистяхъ; вѣнчикъ колокольчато-цилиндрическій. Ягоды шаровидныя, черныя, съѣдобныя, вкусомъ напоминающія ягоды черники. Листья употребляются мѣстными жителями вмѣсто чая.

**Черника**  
**Черницотъ**  
**Черничникъ**  
**Чернишникъ** } см. Черника (*Vaccinium Myrtillus* L.).

**Чернобыль**, см. Полынь полевая (*Artemisia campestris* L.).

**Чернобыльникъ**  
**Чернобыль** } см. Чернобыльникъ обыкновенный (*Artemisia vulgaris* L.).

**Чернобровецъ болотный**, см. Черёда трехраздѣльная (*Bidens tripartita* L.).

**Чернобровецъ безсмертнй**  
**Чернобровецъ**  
**Чернобровецъ**  
**Чернобровка** } см. Бархатцы (*Tagetes patula* L.).



**Чернобылецъ**, см. Желтуха (*Senecio jacobea* L.).

**Чернобыль**, см. Чернобыльникъ обыкновенный (*Artemisia vulgaris* L.).

**Чернобыль**, см. Кудрявецъ (*Chenopodium Botrys* L.).

**Чернобыль**, см. Бузина вонючая (*Sambucus ebulus* L.).

**Чернобыль турецкій**, см. Кудрявецъ (*Chenopodium Botrys* L.).

**Чернобыль бѣлая** } см. Полынь полевая (*Artemisia cam-*  
**Чернобыль лѣсной** } *pestris* L.).

**Чернобыль полевая** }

**Чернобыльникъ**, см. Кудрявецъ (*Chenopodium Botrys* L.).

**Чернобыльникъ**, см. Полынь полевая (*Artemisia campestris* L.).

**Чернобыльникъ**, см. Чернобыльникъ обыкновенный (*Artemisia vulgaris* L.).

**Чернобыльникъ обыкновенный** (*Artemisia vulgaris* L.). Фармацевтическое назв.: *Artemisia ru'ra*, *alba*, *vulgaris*. В лица большая (Ряз.), Бильникъ (Могил.), Бильникъ (Пск.), Вильникъ горькій (Вят.), Бурьянъ (Екат.), Будильникъ, Бильникъ (Пск., Твер.), Бѣль (Астр.), Забудьи, Забудки, Забудекъ, Забудка (Полт.), Коника, Нелворощи, Чернобыльникъ, Чернобыль (въ бол. част. Росс.), Чернобыльчикъ, Чернобыль (Мал.), Чернобыль. Многолѣтнее травянистое растеніе изъ семейства «сложнопѣстныхъ» (*Compositae* Adans.), распространенное во всей Европѣ и обыкновенное во всей Россіи. Стебель прямостоящій деревнистый, выш.  $1\frac{1}{2}$ — $1\frac{3}{4}$  а ш. Листья перисто-раздѣльные, съ ланцетовидными, по краямъ пильчатыми или надрѣзными долями, сверху голые, желто-зеленые, снизу бѣло-войлочные. Корзинки продолговатыя или яйъ сводъ вы, мелкія, собранныя длинной, густой метелкѣй; корзинки снабжены войлочно-волосистыми черешчатыми обвертками. Всѣ цвѣты обоеполовые. Внѣшникъ часто красноватый. Тычинокъ 5; за язь нижняя одногнѣздная, съ 1 столбикомъ, съ 2-храздѣльнымъ рыльцемъ. Плодь—сѣмянка. Цвѣтетъ лѣтомъ. Растетъ на необработанныхъ и сорныхъ мѣстахъ, по берегамъ рѣкъ и между кустарниками. (Табл. XLVII, фиг. 263.)

**МЕДИЦИНСКОЕ УДОТРЕБЛЕНІЕ.** Чернобыльникъ извѣстенъ уже давно. Въ Шини и Китаѣ съ древнихъ временъ изъ него приготовляются моксы, и китайцы не только дѣлать это растеніе, что вывѣшиваютъ его надъ дверьми своихъ домовъ и заставляютъ свои подвластные народы вносить дани доставлять имъ это растеніе. Въ новѣйшій медицинѣ чернобыльникъ предложенъ противъ падучей болѣзни; 3,0—40,0 гм. (1 ун.—1 ун. 2 др.) корня отвариваютъ въ бѣломъ винѣ и въ нагрѣтомъ винѣ пьютъ его утромъ въ постели, оставаясь лежать пока потѣнне не прекратится. Въ народѣ корень чернобыльника пьютъ отъ разстройства мнструацій. Немецкое названіе чернобыльника «Bellus» происходитъ отъ того повѣрья, что путешествуя пьютъ мѣ будто-бы не устаютъ отъ самыхъ длинныхъ переходовъ, помышляя это растеніе въ свою обувь.

Въ гомеопатіи спиртная настойка свѣжихъ корней дается

отъ падучей и другихъ хроническихъ нервныхъ болѣзней и также отъ разст. оиства менструац. Дается 1—2 ое развѣшеніе по 2—3 капли 3—4 и 6 разъ въ день. До ко растущій чернобыльникъ дѣйств. тѣ сильнѣе разводиимаго въ са ахъ.

**Черноголовецъ** } см. Черноголовка обыкновенная (*Prunella*  
**Черноголовка** } *vulgaris* L.).

**Черноголовка**, см. Бедренецъ большой (*Pimpinella magna* L.).

**Черноголовка**, см. Черноголовникъ провозхлебковый (*Otterium Sanguisorba* L.).

**Черноголовка обыкновенная** (*Prunella vulgaris* L.). Фармацевтическое назв.: *Prunella s. Consolid. minor*. Божья помощь, Братики, Братики и сестрички, Братъ съ сестрой (Курск.), Брунелка (юго-зап. и зап. Росс.), Бурнель, Бурнелька (Минск.), Брунецъ (Волог.), Бѣшенца, Василекъ лѣсной (Ворон.), Василки полевые (Хар.), Головинки, Горница, Горлянка (почти вездѣ), Горлянка полевая (Могил.), Горлянка черная (Смол.), Горляникъ (Могил.), Горляна помощь, Горловинка (Костр.), Гортанная трава, Гортанная жабная трава, Гортанная помощь, Де, евинка (Гродн.) Еромычъ (Вятск.), Жабная трава, Жребятникъ (Сарат.), Котовая мята или м.е (Ниж.), Костоломъ (Пет.), Кривошейка (Олон.), Лапокъ красный (Курск.), Кукушачій хлѣбъ, Лейникъ (Двиг.), Лицьке, Медунецъ, Межеумокъ (Олон.), Мунки (Олон.), Присовочная (Костр.), Сережки (Черн.), Синій (Волог.), Синеголовка (Арх.), Сине вѣтка, Словейка, Собачникъ (Арх.), Суховелшки (мал. Б. сс.) Сухоросъ (Тверск.) Черноголовка (Моск. и др. г.), Черноголовникъ (Моск. и друг.), Черноголовъ, Черноголовецъ, Хлѣбодка (Вятск.), Хмелекъ (Гродн.), Хмельдикій (Смол., Каз.), Хмель огородный (Перм.) и изм. Чмелиникъ. Многолѣтнее травянистое растеіе изъ семейства «губоцвѣтныхъ» (*Labiatae* Juss.), распространенное во вѣй Еврпѣ и во всей Россіи. Стебель дл. 3½—7 вѣршк., ползучій, съ 4 нподнимаю имися цвѣтоносными вѣтвями. Листья черешковые, продолговато-яйцевидные, цѣльнокрайніе, супротивные. Фиолетовые цвѣты образуютъ сначала головчатое соцвѣтіе, принимающее по днѣ видъ продолговатаго колоса, при основаніи съ двумя почти сидячими листьями. Прицвѣтники широкіе. Чашечка труб. ато-колокольчатая о 5 збцахъ, аздыльных на 2 губы. Внчикъ двугубый; тычинко 4; завязь вѣдняя 4хлобастная, 4-хгнзидная, съ однимъ столбикомъ. не-суущимъ 2-храздѣльн е рыльце. Плодъ при созрѣваніи ас адается на 4 орѣшка. Цвѣтетъ лѣтомъ. Растетъ на лугахъ и опушкѣхъ лѣсовъ.

**МЕДИЦИНСКОЕ УПОТРЕБЛЕНІЕ.** Трава имѣетъ вяжущія свойства и прежде употреблялась въ медицинѣ и въ поносахъ, кровотеченіяхъ и для полосканія полости рта и горла. Теперь растеіе извѣс но только, какъ народ. ое средство, и употребляется отъ поноса, отъ болѣзни горла, оо енно при простудѣ и отъ грудныхъ болѣзней. Отваромъ травы моютъ голову отъ перхоти. Изъ нея же дѣлають припарки на опухоли.

**Черноголовникъ**, см. Черноголовникъ кровохлебковый (*Poterium Sanguisorba* L.).

**Черноголовникъ**, см. Черноголовка обыкновенная (*Prunella vulgaris* L.).

**Черноголовникъ**, см. Подмаренникъ мареновидный (*Galium rubroides* L.).

**Черноголовникъ**, см. Ланчатка серебристая (*Potentilla argentea* L.).

**Черноголовникъ**, см. Кровохлебка лекарственная (*Sanguisorba officinalis* L.).

**Черноголовникъ**, см. Клеверъ средний (*Trifolium medium* L.).

**Черноголовникъ кровохлебковый** (*Poterium Sanguisorba* L.).  
 Фармацевтическое назв.: *Prunella Italica* min. r. s. *hortensis* (Radix et Herba). Водяной. Виноград. Головки жуковы. Кровохлебка (Кал.). Красногловникъ (Кал.). Пимпидилъ. Пимпидилла (у о. ор.). Сивястрыя. Сивяголовникъ. Черноголовникъ. Черноголовка. Многолетнее равнинное растение изъ семейства розоцвѣтныхъ (Rosaceae Hook. et Benth.), распространенное почти повсюду въ Европѣ, и встречающ. ея извѣдка въ южной и юго-западной Россіи. Растеніе немного пушисто или голое, съ гранистымъ стеблемъ, перистыми листьями, съ кругловатыми или овальными тупо-окончато-зубчатыми листочками, снабженными короткими или стоячими железками. Цвѣтки въ кругловатыхъ или продолговатыхъ головкахъ, сперва зеленыхъ, затѣмъ красноватыхъ; нижніе цвѣтки въ головкахъ, тычиночные (внутри)—пестичные, средніе часто обоюродные. Цвѣтоложье при плодахъ 4-хгранное. Чашечка 4-храздѣльная, опадающая послѣ вѣтвля; лепестковъ нѣтъ. Тычинокъ 2—30. Пестикъ состоитъ изъ 2—3 продолговатыхъ, несущихъ верхушечный или свислый столбикъ съ длинными красными рыльцемъ. Плоды состоятъ изъ 2—3 семянокъ, заключенныхъ въ отворѣтломъ 4-хгранномъ цвѣтоложѣ. Цвѣтеть лѣтомъ. Растетъ на каменистыхъ мѣстахъ и на холмахъ. Разводится въ огородахъ, какъ овощъ. Рекомендуются для разведенія на безплодныхъ почвахъ.

Медицинское употребленіе оставлено.

**Черноголовъ**, см. Черноголовка обыкновенная (*Prunella vulgaris* L.).

**Черноголовъ черный**, см. Морковникъ луговой (*Silene pratensis* Bess.).

**Черногузка**, см. Береза обыкновенная (*Betula alba* L.).

**Чернозелье** } см. Чина черная (*Orobus niger* L.).

**Черное зелье** } см. Чина весенняя (*Orobus vernus* L.).

**Чернозаябенникъ**, см. Чистецъ болотный (*Stachys palustris* M.).

**Чернокленъ**, см. Кленъ татарскій (*Acer tataricum* L.).

**Чернокленъ**, см. Кленъ полевой (*Acer campestre* L.).

**Черноклина**, см. Кленъ татарскій (*Acer tataricum* L.).

**Черноклинина**, см. Кленъ полевой (*Acer campestre* L.).

**Чернокорень, см. Чернокорень лекарственный** (*Cynoglossum officinale* L.).

**Чернокорень лекарственный** (*Cynoglossum officinale* L.).  
 Фа мацевитическое назв.: *Cynoglossum majus* s. *Lingua canina*.  
 Апухта (Ряз.), Бѣлена, Бѣлена красная (Орл.), Бѣшенка трава (С ра.), Гавязь, Гавязь, Гавязь, Гавязь, Гобязь (Малор. и южн. Росс.), Живокость, Жывокість (Умань), Живая трава (Ч.), Золотуш ая трава (Тамб.), Казарка (Уф.), Кожушка (Вор.), Клоповецъ (Орл.), Костоломъ (Могил.), Кужуха (Тамб.), Лалушникъ (Са ар.), Ли одѣйка (Ниж.), Мангун (Ниж.), Медуньки, Медунка с бабя (Полт.). Кошачье мыло (Вор.), Мышій, Мышиный духъ (Вят.), Одурь (Вят.), Почечуйная трава, Пошешуй, Полюб мь (Вятск.), Репей (Кал.). Слынякъ степной (Полт.), Слынола куриная, Слынола ку яца, Собачка (Малор.), Собачникъ, Собачникъ аптечный, Собачій языкъ. П сій языкъ, Собачій корень (Вор., Тамб., Полт.), Языкъ воловій, Языкъ воловий, Чередникъ, Черный корень, Чернокорінь (Малор.), Якутка, Шаленець (Минск.), Щелкунъ, Щелкуні, Щелкуно, Щелкуха (Херс.).  
 Двудѣтное травянистое растение изъ семейства «бурачниковыхъ» (*Boraginaceae* Juss.), распространенное въ средней Европѣ и почти во всей Россіи. Стебель мягко-пушистый, выш. 7—14 вершк. Листья ланцетные, покрытые тонкимъ сѣроватымъ войлокомъ, нижніе до 7 вершк. длины. Темно-пурпуровые, рѣдко бѣлые цвѣты въ длинныхъ завѣткахъ, собранныхъ метельчато на верхушкѣ стебля. Чашечка 5-тизубчатая или 5-тираздѣльная; вѣнчикъ спайнолепестный, съ 5-тираздѣльнымъ отгибомъ; тычинокъ 5; завязь верхняя 4-хгнѣздная, 4-хлопастная; столбикъ о ній, съ 2-храздѣльнымъ рыльцемъ. Плодъ сухой, распадающійся по со рваніи на 4 орѣшка; послѣдніе съ выдающимся краемъ, приплюснутые, усаженные по всей поверхности крючковатыми шипами. Цвѣтеть въ маѣ и іюнѣ. Растетъ по безплоднымъ, каменистымъ и сорнымъ мѣстамъ, около дорогъ и по холмамъ. (Т а б л. XIX, ф и г. 276.)

**МЕДИЦИННОЕ УПОТРЕБЛЕНІЕ.** Въ прежнее время все растение, въ особенности же его корень, цѣнилось врачами и прописывалъ съ нимъ больнымъ, какъ средство успокаивающее боли и судороги, также отъ каплія, отдѣленія крови съ мокротой, отъ поноса простого и кроваваго, и отъ обильнаго отдѣленія гноя; сноруши они давали его для пр мочекъ отъ опухолей, зоба, ожоговъ и т. д. Оно также считалось средствомъ отъ укушеній ядовитой змѣей и бѣшеной соб кой. Въ настоящее время средство это врачами оставлено, но им етъ все-таки обширное прим ененіе въ народѣ. Въ Екатеринославской и Воронежской губерніяхъ растение употребляется отъ ломоты, въ Рязанской—отъ бѣшенства у скота, отъ опухолей у лошадей въ Черниговской—отъ обрѣза, въ Киевской—отъ перелома костей и для уменьшенія ломоты въ костяхъ. Въ Саратовской губерніи тра у употребляютъ для изгнанія мышей. Дѣйствительно, мыши не переносятъ апаха свѣжа о растенія и убѣгаютъ изъ дома, гдѣ есть это растение. Насколько онѣ

не выносятъ запаха, что даже бросаются съ кораблей въ воду, если только слышать этотъ запахъ на палубѣ и въ каютахъ. Свѣжій сокъ этого растенія убиваетъ головныхъ насекомыхъ.

**Чернокъ рѣнь обыкновенный**, см. Чернокорень лекарственный (*Synoglossum officinale* L.).

**Чернокудренникъ обыкновенный**, см. Чернокудренникъ черный (*Ballota nigra* L.).

**Чернокудренникъ черный** (*Ballota nigra* L.). Фармацевтическія названія: *Marrulum nigrum*, s. *foetidum*, s. *Ballota* (Herba). Глухая крапива (Малор.), Кудри пестрыя, Маточникъ (Малор.), Мяточникъ, Мята собачья (Кал.), Чернокудренникъ обыкновенный, Шандра (Малор.), Шандра вонючая, Шанта черная. Неприятно пахучая многолѣтняя трава изъ семейства «губоцвѣтныхъ» (*Labiatae* Juss.), распространенная почти во всей Европѣ, въ средней и южной Россіи, съ прямостоящимъ стеблемъ вышиною отъ  $11\frac{1}{4}$ — $22\frac{1}{2}$  вершка. Листья супротивные, черешковые, овальные или сердцевидные, крупно-зубчатые. Грязно-розовые, рѣдко бѣлые цвѣты въ густыхъ, часто одностороннихъ мутовкахъ. Чашечка воронковидная. Вѣнчикъ двугубый, верхняя губа короче 3-хлопстной нижней. Тычинокъ 4; завязь верхняя 4-хлопстная, 4-хлѣбная, съ однимъ столбикомъ, несущимъ 2-хлѣбное рыльце. Плодъ по созрѣваніи распадается на 4 орѣшка. Цвѣтетъ лѣтомъ. Растетъ около дорогъ и на сорныхъ мѣстахъ.

**МЕДИЦИНСКОЕ УПОТРЕБЛЕНІЕ** растенія прежде было извѣстно среди врачей; они назначали его отъ истеріи и психондріи, снаружи отъ подагры. Въ Швеціи оно до сихъ поръ имѣетъ обширное примѣненіе въ ветеринарной практикѣ: почти вѣтъ ни одной болѣзни у скота, при которой-бы тамъ не давали отвара этого растенія.

**Чернолистка**, см. Грушанка круглолистная (*Pirola rotundifolia* L.).

**Чернопалка**, см. Рогоза широколистная (*Typha latifolia* L.).

**Черносливъ**, см. Абрикосъ черный сибирскій (*Armeniaca sibirica* Pers.).

**Черносливъ**, см. Слива обыкновенная (*Prunus domestica* L.).

**Черносливъ ф. ангузовскій**, см. Тернослива (*Prunus institia* L.).

**Ч р оталъ**, см. Ива бѣлая (*Salix alba* L.).

**Черноталъ** (*Salix pentandra* L.). Фармацевтическое названіе *Salix laurea* (Cortex). Бредъ (Смол.), Вербѣ (Екат. Ви.), Вербовникъ, Верболоза, Верболозь (Зап. Росс.) Венига (Тамб.), Лозина (Тамб.), Лоза-золотуха (въ Пол.), Чернолозь, Домашникъ (Нов., Ох.), Ракита (Гро. н.), Синеталь, Тала (Укр., Черн.), Тальникъ (Вятск.), Шалюгъ. Кустарникъ или деревцо, выш. 1—2 сажени, изъ семейства «ивовыхъ» (*Saliceae* Rich.), распространенный почти во всей Европѣ и почти во всей Россіи, съ блестящими свѣтло-бурыми молодыми побѣгами. Листья яйцевидно-эллиптическіе или ланцетные, голые, блестящіе мелко-пильчаты; прилистники яйцевидные, прямые. Цвѣты двудомныя, въ сережкахъ. Тычинокъ большею частью 5, иногда бываетъ до 10

Плодь—одногнѣздная, многосѣмянная, двустворчатая коробочка; сѣмена при основаніи снабжены волосами. Цвѣтъ въ маѣ и въ іюнѣ. Растетъ на влажныхъ, болотистыхъ мѣстахъ. Древесина отличается вязкостью, употребляется для плетенія корзинъ. (Табл. XLVIII фиг. 272.)

**МЕДИЦИНСКОЕ УПОТРЕБЛЕНІЕ.** Кора растенія имѣетъ слегка вязкую свѣтъ а, въ настоящее время въ медицинѣ почти оставлена. Въ Германіи принимаютъ водный отваръ корки или настои въ винѣ отъ легкой формы перемежающейся лихорадки, также иногда отъ поноса простого и кровавого; снаружи отваръ употребляется для обмываній, примочекъ и вырыскиваній отъ нарывовъ, отъ пролежней, отъ лений крови и слизи.

Въ ветеринарной медицинѣ кора употребляется въ тѣхъ-же болѣзняхъ, въ особенності сн наружи: какъ вижущее, для обмыванія ранъ, отъ холеры и ушибовъ.

**Чернотравъ**, см. Кровохлебка лекарственная (*Sanguisorba officinalis* L.).

**Чернотурка**, см. Арнаутка (*Triticum durum* Desf.).

**Черноягодникъ**, см. Крушина слабительная (*Rhamnus cathartica* L.).

**Чернуха** } см. Чернушка обыкновенная (*Nigella sativa* L.).

**Чернушка**

**Чернушка**, см. Тминъ обыкновенный (*Carum Carvi* L.).

**Чернушка**, см. Ласточникъ обыкновенный (*Vincetoxicum officinale* Moench.).

**Чернушка дикая** (*Nigella arvensis* L.). Чернушка полевая.

Однолѣтнее травянистое растеніе изъ семейства «лютиковыхъ» (*Ranunculaceae* Juss.), распространенное въ средней и южной Европѣ, въ юго-западныхъ губерніяхъ Россіи и на Кавказѣ, выши. отъ 2—4 вершк. Листья двояко и тройко-перисто-разсѣченные, съ линейными долями. Цвѣтки одиночные, голубоватыя. Чашечка ихъ 5 лепестковидныхъ отпадающихъ, блѣлыхъ на верхушкѣ, голубоватыхъ листочковъ. Лепестковъ 5—10 маленькихъ, имѣю ихъ ноготокъ и двугубую пластинку; при основаніи пототка медовая ямочка. Тычинокъ много. Пестыки съ длиннымъ остроконечіемъ. Плодь состоитъ изъ 3—10 мелко-бугорчатыхъ листовокъ, сросшихся до середины и несущихъ прямые вѣвѣстоящіе столбики. Цвѣтъ въ лѣтѣ. Произрастаетъ на поляхъ и въ степяхъ. Употребленіе такое-же, какъ «чернушки обыкновенной» (см. ниже).

**Чернушка обыкновенная** (*Nigella sativa* L.). Фармацевтическое названіе: *Nigella Melanthium* s. *Cuminum nigrum* (Semen). Ганусъ (Даль). Мацонъ (Н. Воронцовъ). Клинъ черный (по слав.), а по русски Тминъ. Тимонъ черн. Тминъ черн. Чернуха, Чернушка. Однолѣтнее травянистое растеніе изъ семейства «лютиковыхъ» (*Ranunculaceae* Juss.), распространенное въ южной Европѣ, на югѣ Россіи, въ Крыму, Закавказьѣ и Малой Азіи. Листья двояко и тройко-перисто-разсѣченные, съ широко-линейными долями. Цвѣты одиночные, голубоватыя. Чашечка изъ

5 лепестковидныхъ опадающихъ листочковъ; лепестковъ 5—10, мяющихъ ноголокъ и двугубую пластинку. Т. чинокъ много. П. д. состоитъ изъ сросшихся до верха, на спинѣ ж. л. знегобородавчатыхъ листовыхъ, несущихъ верхешние столбики. Цвѣтеть летомъ. Встрѣчается на сорныхъ мѣстахъ, а также засѣваетъ. На югѣ семенами обсепають хлебъ и на дугъ ихъ въ капусту.

Чернушка полевая, см. Чернушка дикая (*Nigella arvensis* L.).

Чернушникъ темноцвѣтный (*Nigella nigra* L.). Низенькая многолѣтняя (вышин. всего 2—4 верш.) альпійская травка изъ семейства «орхидейныхъ» (*Orchidaceae* Juss.), распространенная на горахъ средней Европы, съ прикорневыми линейно-ланцетными листьями. Темно-красные душистые цвѣты собраны густымъ, короткимъ, почти коническимъ колосомъ. Лепестковидный околоцвѣтникъ состоитъ изъ 3 наружныхъ и 3 внутреннихъ листочковъ; одна изъ послѣднихъ образуетъ цельную яйцевидную губу, набухшую при основаніи короткимъ шпорцемъ. Завязь нижняя, одногиздная. Столбикъ сросшійся съ тычинкой въ одну колонку; рыльце находится на колонкѣ подъ пыльникомъ. Плодъ—коробочка. Цвѣтеть съ іюня до сентября.

Черный корень, см. Чернокорень лекарственный (*Cynoglossum officinale* L.).

Черника, см. Черника (*Vaccinium Myrtillus* L.).

Червоникъ, см. Золототысячникъ обыкновенный (*Erythraea Centaureum* L.).

Черомка полевая, см. Ландышъ майскій (*Convallaria majalis* L.).

Черотъ, см. Тростникъ обыкновенный (*Arundo Phragmites* L.).

Черсаки } см. Бобовникъ (*Amygdalus nana* L.).

Черговъ кустъ, см. Сивецъ луговой (*Scabiosa succisa* L.).

Чертогъ, см. Колючникъ обыкновенный (*Carlina vulgaris* L.).

Чертогонъ, см. Мордовникъ (*Echinops sphaerocephalus* L.).

Чертогонъ, см. Синеголовникъ плосколиственный (*Eryngium planum* L.).

Чертогонъ, см. Девясилъ шершавый (*Inula hirta* L.).

Чертогонъ } см. Сивецъ луговой (*Scabiosa succisa* L.).

Чертогривъ } см. Медунница (*Spiraea ulmaria* L.).

Чертопалочникъ, см. Рогоза узколистная (*Typha angustifolia* L.).

Чертопалочникъ, см. Рогоза широколистная (*Typha latifolia* L.).

Чертополохъ, см. Урушиникъ колючій (*Xanthium spinosum* L.).

Чертополохъ, см. Заникъ клубнеосный (*Phlomis tuberosa* L.).

Чертополохъ, см. Татажникъ колючій (*Onopordon Acanthium* L.).

Чертополохъ, см. Девясилъ подеолочный (*Inula Helenium* L.).

Чертополохъ, см. Синеголовникъ плосколистный (*Eryngium planum* L.).

Чертополохъ, см. Синеголовникъ равнинный (*Eryngium campestre* L.).

- Чертополохъ**, см. Мордовникъ (*Echinos sphaerocephalus* L.).
- Чертополохъ**, см. Чертополохъ полевой (*Cirsium arvense* S. op.).
- Чертополохъ**, см. Чертополохъ ланцетовидный (*Cirsium lanceolatum* Scop.).
- Чертополохъ**, см. Колючникъ обыкновенный (*Carlina vulgaris* L.).
- Чертополохъ**, см. Чертополохъ курчавый (*Carduus crispus* L.).
- Чертополохъ**, см. Чертополохъ пониклый (*Carduus nutans* L.).
- Чертополохъ безстебельный** (*Cirsium esculentum* C. A. M., *Cirsium acaule* All., *sibiricum* Ldb.). Чертополохъ (Бесс.), Губжа (Даур.), Бусурманская трава (Сиб.). Растение колючее многолетнее изъ семейства «сложноцвѣтныхъ» (*Compositae* Adans.), распространенное въ среднихъ, юго-восточныхъ губернияхъ Россіи, въ Прибалтійскомъ краѣ и южномъ Уралѣ. Стебель совсемъ укороченный или невысокій несущій обыкновенно одну, рѣдко нѣсколько, скученныхъ головокъ; листья снизу немного перистые, глубоко-перисто-раздѣльные, съ яйцевидными, обыкновенно трехлопастными долями; цвѣты собраны въ голыя крупныя яйцевидныя головки, снабженныя оберткой или покрываломъ; наружныя листочки послѣдняго прижатые, яйцевидныя, съ остроконечіемъ, внутренніе—линейно-ланцетные, наверху окрашенные. Цвѣтки пурпуровые, обоеполовые; головки—двудомныя. Вѣнчикъ съ глубоко-5-тираздѣльнымъ отгибомъ, трубчатый; тычинокъ 5, съ волосистыми нитями; столбикъ нитевидный, на верхушкѣ неглубоко-двулопастный; завязь нижняя одногнѣздная; плодъ—сѣмянка, сжатая съ боковъ, безъ реберъ, снабженная летучкой изъ зазубренныхъ волосковъ, которые короче вѣнчика. Цвѣтеть въ іюлѣ и августѣ. Растетъ на сыроватыхъ лугахъ и выгонахъ. Въ народѣ въ отварѣ травы кунають дѣтей отъ испуга. (Р и с. 319.)
- Чертополохъ благословенный**, см. Кардобенедиктъ (*Cnicus benedicti* s. Gärtn.).
- Чертополохъ болотный** (*Cirsium palustre* Scop.). Дикій дѣдовникъ (Смол.), Зайчики (Ниж.), Жидовское кресло (Вол.), Колюха (Олон.), Осоть (Вят., Сар.), Мордовникъ (Тамб.), Ренейникъ, Орнейникъ (Курск.), Пуховинникъ (Ниж.). Растение колючее изъ семейства «сложноцвѣтныхъ» (*Compositae* Adans.), двулетнее, распространенное въ средней, сѣверной Россіи, рѣже въ южной, почти во всей Европѣ, за исключеніемъ отдаленнаго сѣвера. Стебель прямой, обыкновенно вѣтвистый, доверху олиственный, вмѣстѣ съ листьями немного паутинисто-пушистый; листья линейно-ланцетные, болѣе или менѣе глубоко-лопастно-перисто-надрѣзные или раздѣльные, съ 2—3 лопастными участками; цвѣты собраны въ довольно мелкія яйцевидныя головки, скученныя на короткихъ бѣло-паутинисто-шерстинистыхъ ножкахъ; снабженныя покрываломъ, коего листочки по краямъ паутинисто-пушистые, на спинкѣ смолисто-ликіе, наружныя—яйцевидно-ланцетные, съ отстоящимъ остроконечіемъ, внутренніе—линейно-ланцетные, на верхушкѣ окрашен-



ные. Вѣнчикъ съ 5-тираздѣльнымъ стеблемъ. Тычинокъ 5, съ в лосистыми нѣтями; столбикъ нитевидный, наверху неглубоко-двулопастный. Завязь нижняя одногнѣзная. Плодь—сѣмянка, снабженная лепестками изъ многорядныхъ перистыхъ волосковъ, по длинѣ не превышающихъ длину вѣнчика. Растетъ на болотахъ. У. отребляется въ качествѣ кормовой травы для скота. (Р и с. 320.)

**Чертополохъ курчавый** (*Carduus crispus* L.). Будякъ (Малор.), Драпьянъ (Даль). Желѣзнякъ (Олон.), Мордвинникъ (Нижег.), Царь Мордвинъ (Нижег.), Мордовникъ, Осотъ (Арх.), Осотъ красный, Пустосель (Вятск.), Репейникъ (Яр.). Татаринъ (Орл.), Храбустъ, Хробустъ, Хробусъ (Малор.), Царь-Муромъ (Кал.). Двудѣтнее травянистое растение изъ семейства «сложноцвѣтныхъ» (*Compositae* Adams.), распространенное во всей Европѣ и почти во всей Россіи, тонкое и не жестко-колючее; стебель прямой, обыкновенно вѣтвистый, немного паутинистый; листья сверху зеленые, снизу обыкновенно сѣровато войлочные, мягкіе, проузловато-ланцетные, неглубоко-выемчато-надрѣзные, съ 2—3 лопастными надрѣзами. Корзинки цвѣтовъ яйцевидно-округлыя, обыкновенно скученныя по 2—3 на концахъ стебля и вѣтвей, довольно мелкія на колюче-крылатыхъ ножкахъ. Цвѣты обоеполовые, пурпуровые, трубчатые; тычинокъ 5; пыльники при основаніи съ шиловидными придатками; столбикъ на верхушкѣ неглубоко-2-лопастный. Завязь нижняя одногнѣзная, односѣмянная. Плодь—сѣмянка съ хохолкомъ изъ зазубренныхъ волосковъ.

**МЕДИЦИНСКОЕ УПОТРЕБЛЕНІЕ.** Свѣжій сокъ растенія употребляется въ народной медицинѣ для истребленія червей на ранахъ у рогатаго скота.

**Чертополохъ ланцетовидный** (*Cirsium lanceolatum* Scop.). Бодякъ (Мог., Вор.). Вѣлосторонная (Костр.), Сакъчака (Орл.), Дѣдъ, Дѣдовникъ (Малор., Ряз.), Дѣдъ, Дѣдовникъ (Вел. Рос.), Дядокъ (Черн.), Колючій дядовникъ (Могил.), Дробчакъ (Малор., Волк.). Колютникъ, (Тотьма), Колючка (Твер., Ржев.), Колунъ (т. е., Колюнъ) (Волог.), Колъ (Нижег.). Курица (Клев.), Мачиха (Костр.), Мордовникъ Мордвинникъ (Каз., Ниж., Саратов.), Татарка (Тв., Ржев.), Татарникъ (Ниж., Курск.), Свиной тернъ, Свиной щавель, Чертополохъ (Ниж., Вор., Гродн.). Растеніе колючее двудѣтнее изъ семейства «сложноцвѣтныхъ» (*Compositae* Adams.), распространенное въ южной и средней Россіи. Стебель высокій, вѣтвистый, паутинисто-пушистый; листья снизу бѣловойлочные, глубоко-перисто-раздѣльные, съ линейно-ланцетными, обыкновенно раздвоенными долями, кончающимися крѣпкой колючкой; цвѣты собраны въ одиночныя крупныя шаровидныя паутинистыя головки на одностебельныхъ ножкахъ, окруженныя при основаніи листьями; листочки покрывала, коимъ снабжены головки, съ отогнутыми шиловато-рѣсничатыми верхушками; средніе—на концѣ лопаточно-расширенные и колюче-остроконечные, внутренніе—тонко-шиловидные съ

мягкимъ окончаніемъ. Цвѣтки пурпуровые, обоюдовые; вѣнчикъ тубчатый, съ 5-раздѣльнымъ отгибомъ. Тычинокъ 5, съ волосистыми нитями. Столбикъ нитевидный, наверху неглубоко-двулопастный; завязь нижняя двогнѣздная. Плодъ—сѣмянка, сжатая съ боковъ безъ реберъ, снабженная летучкой изъ зазубренныхъ вѣлковъ, которые по длинѣ короче вѣнчика. Цвѣтетъ съ юня до сентяб. Растетъ на холмахъ, каменистыхъ мѣстахъ, изрѣдка при дорогахъ. Въ некоторыхъ губерніяхъ употребляется какъ лечебное средство.

**МЕДИЦИНСКОЕ УПОТРЕБЛЕНІЕ.** Известно въ народѣ. Въ Киевской и Ковенской гуо. растеніемъ окуриваютъ дѣтей отъ испуга, въ Костромской облизываютъ порубленные мѣста, въ Казанской губ. отваръ пьютъ отъ коликъ въ животѣ; въ Гродненской—отъ колющей боли въ груди, въ Казанской—отваръ корня кладутъ на вередъ.

**Чертополохъ огородный** (*Cirsium oleraceum* M.). Бодякъ, Дзелзивиръ (Могил.), Двдюшникъ (Вят.), Заячья капуста (Тевл.), Зубцаста (Ниж.), Горная капуста, Студеная капуста (Каз.), Медвѣжникъ болотный (Пск.), Молочникъ (Твер., Ост.), Осотъ (Твер., Ржев.), Храбустъ (Малор.), Желтый храбустъ (Малор., Рогов.), Храбустъ, Хрыбустъ (Гродн.). Растеніе изъ семейства «сложноцвѣтныхъ» (*Compositae* Adans.), многолѣтнее, распространенное въ средней, сѣверной и южной Россіи, въ сѣв. и средн. Европѣ до Фр. нціи, въ сѣв. Италіи. Корневище горизонтальное, съ нитевидными корнями; стебель прямой, какъ и листья, обыкновенно слегка паутинистый; нижніе листья ланцетные, суженные въ крылатый черешокъ, перисто-раздѣльные, съ яйцевидно-ланцетными долями, стеблевые—съ широко-стеблехватывающимъ основаніемъ, верхніе—яйцев. дно-ланц. тные, крупно-зубчатые; все листья снизу зеленые; цвѣты собраны въ яйцевидныя головки средней величины, на короткихъ паутинистыхъ ножкахъ, скупенныя по нѣскольку вмѣстѣ и окутаны яйцевидными блѣдно-желтоватыми верхушечными лисьями; головки снабжены покрываломъ изъ ланцетныхъ шиловидно-заостренныхъ листочковъ, съ отогнутыми слабо-колючими верхушками. Вѣнчикъ желтый съ 5-тираздѣльнымъ отгибомъ. Тычинокъ 5, съ волосистыми нитями; столбикъ нитевидный, наверху неглубоко-двулопастный. Завязь нижняя одногнѣздная. Плодъ—сѣмянка, снабженная летучкой изъ многоридныхъ перистыхъ волосковъ, которые по длинѣ короче вѣнчика. Цвѣтетъ въ юнѣ и въ юлѣ. Растетъ на болотахъ и влажныхъ лугахъ. За границей употребляется въ качествѣ хорошей кормовой травы, замѣняющей, по отзывамъ, даже клеверъ. Въ некоторыхъ губерніяхъ Россіи молодые побѣги и листья употребляются въ борщъ. (Табл. XLVIII, фиг. 271.)

**МЕДИЦИНСКОЕ УПОТРЕБЛЕНІЕ.** Огородный чертополохъ служитъ, какъ лечебное народное средство; въ его отварѣ купаютъ отъ простуды и отъ чесотки.

**Чертополохъ полевой** (*Cirsium arvense* Scop.). Фарм. наз.

*Cirsium haemorrhoidalis*) Асотъ, Булдовникъ, Бодякъ полевой (Мог.), Волчець, Жербий (Рогов.), Желѣзница (Олон.), Жибрий (Мал., Волк.), Живокошь (Полт.), Капустникъ (Черн.), Колунъ (Костр.), Комочки (Вор.), Котелки (Вор.), Наголоватень, Ноголоватки (Малор.), Осотъ (Моск., Смоленск.), Осотъ красный, Осатикъ (Вор.), Пуговникъ снѣій (Вор.), Прострѣльная (Тул.), Серпъ-трава (Новор.), Серпій (Вор., Саратов.), Серпуха полевая, Сторожникъ (Мог.), Чертополохъ (Арх., Олон.), Шинатникъ. Растеніе колючее многолѣтнее изъ семейства «сложноцвѣтныхъ» (*Compositae* Adans.), распространенное почти повсемѣстно до Архангельской губерніи, по всей Европѣ, въ зап. Азии и сѣв. Америкѣ, съ длинными веревчатыми вѣтвистыми корнями, производящими придаточныя почки; стебель вѣтвистый, слегка паутинистый; листья продолговато-ланцетные, шиповаторьсничатые, обыкновенно волнистые, цѣльные, зубчатые или болѣе или менѣе глубоко-выемчато-надрѣзные; головки цвѣтовъ довольно мелкія, яйцевидныя, на паутинисто-войлочныхъ ножкахъ въ неправильно-метельчатомъ соцвѣтіи, съ черепичатымъ покрываломъ изъ наружныхъ яйцевидныхъ, слегка паутинистыхъ, съ отстоящимъ колючимъ остроконечіемъ, и внутреннихъ, удлинненныхъ, окрашенныхъ листочковъ. Цвѣтки однополые (головки двудомныя). Вѣнчикъ блѣдно-красноватаго цвѣта, трубчатый, съ глубоко-5-тираздѣльнымъ отгибомъ, который въ нѣсколько разъ короче его трубочки; тычинокъ 5; нити тычинокъ волосистыя; пыльники при основаніи съ шиповидными придатками; столбикъ нитевидный, на верхушкѣ неглубоко-двулопастный; завязь нижняя одногнѣздная; плодь—сѣмянка, сжатая съ боковъ, безъ реберъ, снабженная летучкой изъ многорядныхъ зазубренныхъ волосковъ, которые въ три раза длиннѣе вѣнчика. Цвѣтетъ въ іюнѣ, іюлѣ и августѣ. Растетъ на поляхъ, сорныхъ мѣстахъ и между кустарниками. Считается очень непріятной сорной травой, встречающейся, однако, нерѣдко на хлѣбныхъ поляхъ и пашняхъ. Въ то-же время во многихъ мѣстахъ эту траву—перемолотую—употребляютъ, какъ прекрасный кормъ, лошадямъ, коровамъ, свиньямъ, гусямъ и т. п.

**МЕДИЦИНСКОЕ УПОТРЕБЛЕНІЕ.** Полевой чертополохъ употребляется въ народной медицинѣ. Отваромъ моютъ голову отъ перхоти и сыпи и дѣлаютъ дѣтямъ ванны отъ худобы.

**Чертополохъ пониклый** (*Carduus nutans* L.). Асотъ, Арепей, Бодякъ красноголовый, Будяки (Малор.), Домовякъ (Вятск.), Дѣдовникъ (Ряз., Кал.), Ежъ (Вятск.), Колючникъ (Курск.), Репой колючій, щедроватый (Вор.), Рипяхъ (Малор.), Рипякъ (Малор.), Рыпьянь, Рыпьякъ (Малор.), Рыпьяхи полевые (Малор.), Татаринъ (Ряз.), Чертополохъ (Вел. Росс.), Чертополохъ (Малор.). Двухлѣтнее травянистое растеніе изъ семейства «сложноцвѣтныхъ» (*Compositae* Adans.), распространенное почти во всей Европѣ, въ средней и южной Россіи, въ Туркестанѣ и въ Сибири, выш. 11—22½ вершк. Листья перисто-раздѣльные, очень

колючіе; края листьевъ нисходятъ на стебель въ видѣ узкихъ колючихъ крылецъ. Корзинки пурпуровыхъ цвѣтовъ круглыя, почти шаровидныя, пониклыя, одиночныя, на войлочко-волосистыхъ ножкахъ. Цвѣтки всѣ обоюболовые, съ трубчатымъ вѣнчикомъ. Тычинокъ 5, съ волосистыми нитями; пыльники при основаніи съ шиловидными придатками, сросшіеся въ трубочку, черезъ которую проходитъ столбикъ на верхушкѣ неглубоко-двулопастный. Плодъ — сѣмянка съ простымъ хохломъ. Цвѣтетъ лѣтомъ. Растетъ на поляхъ, по дорогамъ и на сорныхъ мѣстахъ. (Т а б л. XLVIII, ф и г. 270.)

**Чертополохъ шерстистый** (*Cirsium eriophorum* Scop.). Колючка, Подбѣлъ (Вор.), Татарки (Орл.). Растеніе колючее изъ семейства «сложноцвѣтныхъ» (*Compositae* Adans.), распространенное въ южной и средней Россіи. Стебель высокій, вѣтвистый, паутинисто-пушистый; листья снизу блѣдо-войлочные, глубоко-перисто-раздѣльные, съ линейно-ланцетными, обыкновенно раздвоенными долями, кончающимися крѣпкой колючкой; цвѣты собраны въ одиночныя крупныя головки, шаровидной формы, паутинистыя, на олиственныхъ ножкахъ, и окруженныя при основаніи нѣсколькими листьями, съ оберткой или покрываломъ изъ отогнутыхъ, шиловато-рѣсничатыхъ на верхушкѣ наружныхъ листочковъ, лопатчато-распиренныхъ, и колюче-остроконечныхъ среднихъ и тонко-шиловидныхъ, съ мягкимъ окончаніемъ, внутреннихъ. Головки двудомныя съ запахомъ ванили; цвѣты однополые. Вѣнчикъ трубчатый съ 5-тираздѣльнымъ отгибомъ, который короче его трубочки. Тычинокъ 5, съ волосистыми нитями; столбикъ нитевидный, на верхушкѣ неглубоко-двулопастный; завязь нижняя одногнѣздная; плодъ—сѣмянка, сжатая съ боковъ, безъ реберъ, снабженная легучкой изъ многорядныхъ волосковъ. Волоски короче вѣнчика. Цвѣтетъ съ конца іюня до сентября. Растетъ на холмахъ, каменистыхъ мѣстахъ, при дорогахъ. Молодые побѣги и неразвившееся еще цвѣтоложе употребляются въ пищу. (Р и с. 321.)

**Медицинское употребленіе.** Чертополохъ шерстистый имѣетъ примѣненіе въ области народной медицины. Свѣжій сокъ растенія пьютъ на раковыя язвы. Внутрь свѣже-выжатый сокъ употребляется вмѣстѣ съ другими травами для весенняго леченія, которое, какъ извѣстно, примѣняется отъ худосочія, общаго упадка силъ, слабости и золотухи. Растеніе имѣетъ потогонное и мочегонное дѣйствіе.

**Чертопугальникъ**, см. Синеголовникъ плосколистный (*Eryngium planum* L.).

**Чесалка**, см. Ворсянка сукновальная (*Dipsacus Fullonum* Mill.).

**Чесмина**, см. Падубъ обыкновенный (*Ilex aquifolium* L.).

**Чесновица**, см. Чесночная трава (*Alliaria officinalis* Dc.).

**Чеснокъ**, см. Травянка обыкновенная (*Dianthus deltoides* L.).

**Чеснокъ дикій**, см. Шпажникъ черепачатый (*Gladolus imbricatus* L.).

Чеснокъ дикій, см. Молодиль кровельный (*Sempervivum tectorum* L.).

Чеснокъ дикій } см. Дубровникъ чесночный (*Teucrium*  
Чеснокъ заячій } *Scordium* L.).  
Чеснокъ конскій }

Чеснокъ коневій, см. Сабельникъ болотный (*Comarum palustre* L.).

Чеснокъ лѣсной, см. Чесночная трава (*Alliaria officinalis* DC.).

Чеснокъ полевой, см. Шпажникъ черепичатый (*Gladiolus imbricatus* L.).

Чеснокъ посевной (*Allium sativum* L.). Часникъ, Чеснокъ, Устрой (Малор.), Чесныкъ, Чеснокъ, Чосныкъ. Травянистое луковичное растение изъ семейства «лилейныхъ» (*Liliaceae* DC.), родомъ изъ Остъ-Индіи. Луковица яйцевидная, снаружи съ бѣлыми влагалищами и обыкновенно съ многими сидячими бѣлыми-же луковичками. Листья плоскіе, линейные. Цвѣточный стебель до цвѣтенія часто согнутъ наверху кольцомъ, несущимъ наверху многочисленныя сравнительно мелкіе цвѣты, собранные зонтикомъ, окруженнымъ до цвѣтенія влагалищнымъ, съ длиннымъ остроконечіемъ, покрываломъ, отваливающимся цѣликомъ. На мѣстѣ цвѣточныхъ почекъ въ соцвѣтіи развиваются многочисленныя луковички. Околоцвѣтникъ бѣловатый 6-тилистный; тычинокъ 6; столбикъ нитевидный, съ 3-хлопастнымъ рыльцемъ. Плодъ — 3-хгнѣздная коробочка. Разводится на огородахъ употребляется въ пищу. (Рис. 322.)

**МЕДИЦИННОЕ УПОТРЕБЛЕНІЕ.** Чеснокъ дѣйствуетъ раздражающимъ образомъ на пищеварительный каналъ, потому внутрь, какъ лекарство, употребляется рѣдко. Онъ обладаетъ свойствомъ убивать круглыхъ глисть и дѣйствовать оглушающимъ образомъ на ленточныхъ. Для леченія отъ глисть чеснокъ употребляютъ большею частью въ видѣ клистировъ; для этого одну или двѣ чесночныя головки варятъ въ стаканѣ молока, процеживаютъ и ставятъ изъ него клистиръ. Такіе клистиры повторяютъ 2—3 дня подрядъ. Мелкіе глисты выходятъ вмѣстѣ со стуломъ въ видѣ короткихъ тонкихъ бѣлыхъ нитей. Въ народѣ чеснокъ употребляется внутрь отъ ленточныхъ и глисть; его натираютъ на теркѣ и смѣшиваютъ съ медомъ. Натертый чеснокъ, приложенный на кожу, вызываетъ на ней красноту, какъ горчичникъ.

Употребленіе чеснока извѣстно еще со временъ Гиппократъ, который рекомендовалъ чеснокъ отъ кашля, зависящаго отъ большого скопленія въ бронхахъ густой мокроты. Въ пищу чеснокъ употребляется также давно; онъ считается полезнымъ для цинготныхъ больныхъ и для лицъ, страдающихъ каменною болѣзною и подагрой. Моряки очень охотно ѣдятъ чеснокъ, такъ какъ онъ предохраняетъ ихъ отъ заболѣванія цынгою. Также существуютъ наблюденія, что чеснокъ помогаетъ отъ перемежающихся лихорадокъ. Для этого чеснокъ ѣдятъ каждое утро и каждый вечеръ; прибавляя ежедневно по одной головкѣ, доходятъ до 5-ти головокъ заразы, и продолжаютъ леченіе, пока припадки

# 1044 ЧЕСНОКЪ ПОСѢВНОЙ—ЧЕЧЕВИЦА ВОЛОСИСТАЯ.

не пройти; тогда начинаютъ сбавлять приемы, пока не дойдутъ опять до одной головки на приемъ; все леченіе продолжаютъ 2—3 недѣли. Чеснокъ считается предохранительнымъ средствомъ отъ яда укушенія змѣи, отъ прилипчивыхъ и заразительныхъ болѣзней, особенно отъ чумной заразы. Желая спасти себя отъ чумы, жители во время чумной эпидеміи держали во рту чеснокъ, изрѣдка раскусывали его, выбрасывали и брали новую головку. Чеснокъ составляетъ главную часть противочумнаго уксуса. Въ пѣвѣстный венгерскій напитокъ «коватса», отъ водобоязни, чеснокъ тоже входитъ въ большомъ количествѣ. Крестьяне надѣваютъ чеснокъ, нанизанный на веревку, скотинѣ на шею для предохраненія отъ чумы. Свѣжимъ сокомъ чеснока пользуются для выведенія клоповъ, имъ-же смазываютъ мозоли на ногахъ.

**Чесночка**, см. Чесночная трава (*Alliaria officinalis* Dc.).  
**Чесночная трава** (*Alliaria officinalis* Dc.). Фармацевтическое наз.: *Herba et Semen Alliariae*. Подчайникъ, Свирипка, Свирипка, Свирина, Сурѣница чесночная, Чосникъ конскій, Чесночка, Чесновица. Двудѣтнее травянистое растеніе изъ семейства «крестоцвѣтныхъ» (*Cruciferae* Juss.), распространенное почти во всей Европѣ, въ средней и южной Россіи, а также въ Сибіри. Стебель прямостоящій, выш. 7—22½ вершк.; листья цѣльные, нижніе—почковидные, длинно-черешковые, верхніе—сердцевидно-овальные съ короткими черешками. Цвѣты бѣлые. Стручки почти 4-хгранные. Цвѣтетъ весною, въ началѣ лѣта. Растетъ между кустарниками въ рощахъ и тѣнистыхъ мѣстахъ. При растираніи трава издастъ сильный чесночный запахъ. (Табл. XLVII, ф. и г. 273.)

**МЕДИЦИНОКОЕ УПОТРЕБЛЕНІЕ.** Прежде чесночная трава употреблялась въ медицинѣ при скорбутѣ и глстахъ, а спаружи отъ злокачественныхъ ранъ, теперь оставлена.

**Чесночная трава**, см. Дубровникъ чесночный (*Teucrium Scordium* L.).

**Чесночникъ**, см. Чесночная трава (*Alliaria officinalis* L.).

**Чесношникъ**, см. Желтоцвѣтъ пахучій (*Barbarea vulgaris* R. Br.).

**Чесотная трава** } см. Короставникъ полевой (*Scabiosa arvensis* L.).  
**Чесоточная трава** }

**Чехмерица** } см. Козлобородникъ луговой (*Tragopogon pratensis* L.).  
**Чехрица** }

**Чечевица**, см. Чечевица настоящая (*Ervum Lens* L.).

**Чечевица волосистая** (*Ervum hirsutum* L.). Воробьиный горошекъ (Черн.), Горобьячій горохъ лѣсный (Умань), Мышатникъ (Черн., Хар.), Сочевица лѣсная. Однолѣтнее травянистое растеніе изъ семейства «мотыльковыхъ» (*Papilionaceae* L.), распространенное во всей Европѣ и почти во всей Россіи, покрытое рѣдкими волосами. Стебель тонкій дл. 7—22½ в. Листья сложные. Верхніе листы съ усиками; листочки 6—8-минарные, продолговато-линейные. Цвѣтоносы почти столь-же длинные, какъ и листья, несутъ 2—3, рѣже 5—6, невзрачныхъ голубовато-бѣлыхъ цвѣтковъ. Чашечка 5-тизубчатая. Вѣнчикъ мотыльковый, 5-ти-

лепестный (флагъ, 2 крыла и лодочка изъ 2-хъ сросшихся вмѣстѣ лепестковъ). Тычинокъ 10, сросшихся нитями въ одинъ пучокъ. Плодъ—двусѣмянный бобъ, покрытый пушкомъ съ слегка сплюснутыми сѣменами. Растетъ между посѣвами, на паровыхъ поляхъ и на пустыряхъ. Цвѣтетъ съ мая до августа. Представляетъ хорошій кормъ для скота. (Рис. 323.)

**Чечевица настоящая** (*Ervum Lens* L.). Фармацевтическое назв.: *Semina Lentilium*. Ляпа, Лящъ (П. С.), Лящина, Лещина (Даль), Сочевница полевая, Сачевница (Малор.) и изм. Сачавыця, Шачавыця (Подол.), Чевика, Чечевика, Чечевница (бол. ч. Росс.), Чачавиця (Малор.), Чучевика. Однолѣтнее травянистое растеніе изъ семейства «мотыльковыхъ» (*Papilionaceae* L.), родомъ изъ южной Европы и западной Азии, покрытое тонкимъ пушкомъ. Стебель вѣтвистый, выш.  $3\frac{1}{2}$ —7 вершк. Листья сложные; верхніе листья снабжены усиками; листочки большею частью 6-типарные, продолговато-эллиптические. Мелкіе бѣловатые съ лиловыми жилками цвѣты сидятъ поодиночкѣ или по 2—4 на тонкихъ цвѣтоносахъ, почти равныхъ по длинѣ листьямъ. Чашечка 5-зубчатая; вѣнчикъ мотыльковый, 5-тилепестный (флагъ, крылья и лодочка изъ 2-хъ сросшихся между собою лепестковъ); тычинокъ 10, сросшихся нитями въ одинъ пучокъ. Плодъ—ромбондальные голые бобы, содержащіе по 2 сильно сплюснутыхъ сѣмени. Цвѣтетъ съ мая до іюля. Встрѣчается между посѣвами. Разводится на сѣмена на поляхъ; имѣется много сортовъ ея, различающихся величиною сѣмянъ. Употребляется въ пищу.

**Чечевица овечья** (*Cicer arietinum* L.). Горохъ волошскій, греческій, гречкій, турецкій, Бараній горохъ, Пузырное сѣмя. Однолѣтнее травянистое растеніе изъ семейства «мотыльковыхъ» (*Papilionaceae* L.), родомъ изъ Южной Европы, сѣверной Африки и Малой Азии, железисто-мохнато-пушистое. Стебель прямой; листья сложные, непарно-перистые, безъ усиковъ, съ 7—15 продолговато-эллиптическими, пальчатыми листочками, съ яйцевидно-ланцетными, надрѣзно-крупно-пильчатыми прилистниками. Цвѣты бѣловатые или голубоватые одиночные въ углахъ листьевъ на цвѣтоножкахъ, снабженныхъ сочлененіемъ и 2-мя маленькими прицвѣтничками по срединѣ. При плодахъ цвѣтоножки отвороченныя. Чашечка колокольчатая, при основаніи съ бугромъ, 5-тизубчатая; зубцы ея короче вѣнчика. Вѣнчикъ 5-тилепестный, съ тупой лодочкой. Тычинокъ 10: 9-ть спаяны вмѣстѣ, 10-ая верхняя свободна. Столбикъ нитевидный, голый. Плодъ—продолговатые, немного вздутые, двусѣмянные, двустворчатые бобы. Сѣмена округло-кубическія, съ носикомъ у рубчика, буроватаго цвѣта, съ пунктированной поверхностью. Волоски выделяютъ кислый сокъ, содержащій щавелевую кислоту. Разводится на поляхъ. Цвѣтетъ лѣтомъ. На югѣ Европы и на Востокѣ составляетъ любимую пищу жителей.

**Чечевица овечья**. см. Пузырное дерево (*Colutea arborescens* L.).

**Чечевица четырехгранная** (*Ervum tetraspermum* L.). Вязель

(Сарат.). Однолѣтнее травянистое растение изъ семейства «мотыльковыхъ» (Papilionaceae L.), распространенное въ средней Европѣ и почти во всей Россіи. Стебель слабый, тонкій, длиною  $3\frac{1}{2}$ —14 вершковъ. Листья сложные: верхніе съ усиками, листочки 3—6-типарные, линейные, тупые и заостренные. Цвѣтоносы почти одной длины съ листьями. Свѣтло-фіолетовые цвѣты сидятъ поодиночѣ или собраны малопцѣтными (по 2—4) кистями. Чашечка 5-тизубчатая. Вѣничикъ 5-тилепестный, мотыльковый (флагъ, крылья, лодочка изъ 2-хъ сросшихся лепестковъ). Тычинокъ 10, сросшихся нитями въ одинъ пучекъ. Плодъ—голые, съ 4-мя шаровидными сѣменами, бобы. Цвѣтетъ съ мая до іюля. Растетъ на поляхъ, лугахъ и между кустарниками. (Рис. 324.)

**Чечевичка дикая**, см. Горошекъ мышиный (*Vicia Cracca* L.).

**Чечевичка болотная**, см. Триостренникъ болотный (*Triglochin palustre* L.).

**Чечевичное дерево**, см. Пузырное дерево (*Colutea arborescens* L.).

**Чечина трава**, см. Водяной перекъ (*Polygonum Hydripter* L.).

**Чечотка**, см. Береза обыкновенная (*Betula alba* L.).

**Чечуйная трава**, см. Горчакъ (*Polygonum Persicaria* L.).

**Чешуйникъ**

**Чешуйчатый зубной корень** } см. Петровъ крестъ (*Lathraea Squamaria* L.).

**Чешуха**, см. Частуха обыкновенная (*Alisma Plantago* L.).

**Чиберъ**, см. Богородская трава (*Thymus Serpyllum* L.).

**Чибрецъ**, см. Чаберъ садовый (*Satureja hortensis* L.).

**Чигранъ**, см. Сафлоръ красный (*Carthamus tinctorius* L.).

**Чижикъ**, см. Просо колосистое (*Panicum Crus Galli* L.).

**Чижикъ**, см. Щетинникъ сизый (*Setaria glauca* Beauv.).

**Чижникъ**, см. Просо колосистое (*Panicum Crus Galli* L.).

**Чижовникъ**, см. Щетинникъ сизый (*Setaria glauca* Beauv.).

**Чиканъ**, см. Касатикъ водяной (*Iris Pseudacorus* L.).

**Чилибуха**, см. Копытень европейскій (*Asarum europaeum* L.).

**Чилига**, см. Божье дерево (*Artemisia occra* Willd.).

**Чилига**, см. Акація желтая (*Caragana arborescens* L.).

**Чилига** } см. Орѣхи водяные (*Trapa natans* L.).

**Чилимъ** }  
**Чильчажная трава**, см. Запникъ клубненосный (*Phlomis tuberosa* L.).

**Чильчакъ**, см. Норичникъ узловатый (*Scrophularia nodosa* L.).

**Чина**, см. Чина луговая (*Lathyrus pratensis* L.).

**Чина безлистная** (*Lathyrus Aphaca* L.). Двухлѣтнее травянистое растение изъ семейства «мотыльковыхъ» (Papilionaceae L.), распространенное въ средней и южной Европѣ, въ Новороссійскомъ краѣ, на Кавказѣ и въ Туркестанѣ, выш.  $3\frac{1}{2}$ —7 вершковъ. Черешки листьевъ оканчиваются длиннымъ усикомъ и снабжены при основаніи большими копьевидными прилистниками. Листочковъ нѣтъ. Длинные цвѣтоносы несутъ 1—2 маленькихъ желтыхъ цвѣтка. Чашечка 5-тизубчатая. Вѣничикъ 5-тилепестный.



мотыльковый (флагъ, 2 крыла и лодочка). Тычинокъ 10, сросшихся нитями въ одинъ пучекъ. Плодь—широко линейные, согнутые немного серпомъ бобы, съ сѣтчатыми жилками; сѣмена немного сплюснутыя, бурья. Растетъ на холмахъ и между посѣвами. Цвѣтетъ съ мая до юня. (Рис. 325.)

**Чина весенняя** (*Orobis vernus* L.). Фармацевтическое названіе: *Galega nemorensis verna* (Semina). Виснянки (Укр.), Воронятникъ (Нижег.), Горлянка (Моск.), Горошекъ или Горохъ горобинный (Умань), журавлиный (Вятск.), мышинный (Тамб.), полевой (Пет.), лѣсной (Тверск.), боровой (Вил.), дикий (Полт.), весенний (Пет.), Горногорошникъ весенний, Гороховое дерево вешнее, Гусиница (Вятск.), Гусинецъ лѣсовой (Новг.), Жабница (Волог.), Звѣрицъ (Могил.), Кавка (Кал.), Петровъ крестъ (Нижег.), Коровья ѣда (Костр.), Медуничникъ (Кал.), Мыльная (Олон.), Орловъ коготъ (Черн.), Петрушекъ (Вор.), Пѣвники, Пѣвники (Малор.), Пѣтушки (Гродн.), Ранникъ (Кіев.), Сочевница, Сочевничникъ, Сердечная трава (Малор.), Троицникъ (Волын.), Черевички (Кіев.). Зозулины черевички (Полт.), Зозулины сапожки (Харьк.), Черная трава боровая (Черн.), Черное зелье (Полт.), Чистостлистникъ (Арх.), Чистякъ (Черн.). Многолѣтнее травянистое растеніе изъ семейства «мотыльковыхъ» (*Papilionaceae* L.), распространенное почти во всей Европѣ и во всей Россіи. Стебель голый, вып. отъ 7—13 вершк. Корневище вѣтвистое; стебель гранистый; листья парно-перистые; черешки листьевъ несутъ на концѣ вмѣсто усиковъ зеленый нитевидный отростокъ; листочки 2—3-хпарные, яйцевидные, длинно-заостренные, по краямъ тонко-рѣсчатые. Цвѣтоносы почти одной длины съ листьями; сперва пурпуровые, потомъ синіе цвѣты собраны кистями. Чашечка 5-тизубчатая; вѣтчикъ 5-тилепестный, мотыльковый (флагъ, 2 крыла и лодочка). Тычинокъ 10, сросшихся нитями въ трубочку. Столбикъ 1. Плодь—линейные бобы. Цвѣтетъ весной. Растетъ въ лѣсахъ и между кустарниками.

**МЕДИЦИННОЕ УПОТРЕБЛЕНІЕ** чины весенней извѣстно только въ народѣ. Въ Кіевской губерніи отваръ растенія пьютъ отъ боли сердца и прикладываютъ на раны. Въ Уфимской губерніи лечатъ имъ ногтебду, а въ Воронежской губерніи стручья ѣдятъ отъ зубной боли.

**Чина желтая**, см. Чина луговая (*Lathyrus pratensis* L.).

**Чина клубненоносная** (*Lathyrus tuberosus* L.). Фармацевтическое названіе: *Glandes terrestres*. Березка (Екат.), Земляной горохъ, Горошекъ розовый, Горошекъ красный, Чина розовая, Чина розова, Ласковница (Екат.), Мышки, Мышки земляные, Орѣхи земляные, Свиной хлѣбъ, Королевъ пѣтъ красный (Екат.), Выхлѣмель (Екат.). Многолѣтнее травянистое растеніе изъ семейства «мотыльковыхъ» (*Papilionaceae* L.), распространенное почти во всей Европѣ и почти во всей Россіи, за исключеніемъ сѣвернаго края; тонкое подземное корневище несетъ утолщенные корни (похожіе на рыску); все растеніе голое; стебель гранистый и черешки листьевъ безъ крыльевъ; прилист-

ники узко-ланцентные; листья парно-перистые, съ продолговато-эллиптическими листочками; кисти 3 — 7-мичвѣтковые, значительно превышающія листья; чашечка 5-тизубчатая, вѣнчикъ пурпурово-красный, 5-тилистный, мотыльковый (флагъ, 2 боковыхъ лепестка—крылья и лодочка). Тычинокъ 10, сросшихся нитями въ трубочку. Плодъ — линейные, почти цилиндрическіе бобы, голые, съ почти гладкими сѣменами, снабженными небольшоимъ рубчикомъ. Растетъ на поляхъ и между кустарниками. Цвѣтетъ лѣтомъ. Отличная кормовая трава.

**МЕДИЦИНСКОЕ УПОТРЕБЛЕНІЕ.** Шишковатыя корни растенія употребляются въ народѣ противъ поноса.

**Чина луговая** (*Lathyrus pratensis* L.). Вязель, Вязиль (Вятск.), Горошекъ (въ разн. губ.), Горошекъ гусиный, журавлиный (Костр.), мышинный (Новг., Пет., Тв.), или мышій (Олон., Вят., Тамб.), заячій (Гродн.), желтый (Олон., Ниж.), полевой, дикій (въ разн. мѣст.), Гусинець (Даль), Журавка (Ниж.), Журавлиныя стручки (Екат.), Ладонникъ (Влад.), Лядей лѣсовой (Гродн.), Лютки (Могил.), Медовая (Олон.), Мышьякъ (Арх.), Повелика (Каз.), Сережки Матери Вожіей (Черн.), Стрѣлецъ-трава (Вор.), Королевъ цвѣтъ желтый, Чина, Чина желтая. Многолѣтнее травянистое растеніе изъ семейства «мотыльковыхъ» (*Papilionaceae* L.), распространенное почти во всей Европѣ и во всей Россіи. Стебель пушистый, дл. отъ 7—22½ вершк. Листья съ усиками и одною парю ланцетовидныхъ, заостренныхъ листочковъ; прилистники крупные, стрѣловидные. Цвѣтоносы несутъ 3—10 ярко-желтыхъ цвѣтковъ, въ нѣсколько разъ превышающъ листья. Чашечка 5-тизубчатая; вѣнчикъ 5-тилепестный, мотыльковый (флагъ, крылья и лодочка); тычинокъ 10, сросшихся нитями въ одну трубочку. Плодъ—линейные сплюснутые бобы, зрѣлые—черные, съ сплюснутыми гладкими блестящими бураго цвѣта сѣменами, съ продолговатымъ рубчикомъ. Цвѣтетъ лѣтомъ. Растетъ на лугахъ и между кустарниками. Растеніе весьма медоносное и составляетъ отличную луговую траву, заслуживающую искусственнаго разведенія.

**МЕДИЦИНСКОЕ УПОТРЕБЛЕНІЕ.** Въ Орловской губерніи растеніе употребляется въ народѣ отъ гемера у лошадей.

**Чина лѣсная** (*Lathyrus silvestris* L.). Горошекъ, или горохъ дикій, журавлиный, журавлевый, заячій, мышинный, водчій, лѣсной, полевой, слукипъ (Пск.), Журавинникъ (Орл.), Подорва (Бесс.). Декотъ полевой (Полт.), Люби меня не покинь (Малор.), Укладникъ (Малор.). Многолѣтнее травянистое растеніе изъ семейства «мотыльковыхъ» (*Papilionaceae* L.), распространенное почти по всей Европѣ, и въ Закавказьѣ. Стебель лазящій, дл. 1½—3 аршинъ, съ ребрами, продолженными въ узкія зеленныя крылья; листья съ усиками и съ одною парю ланцетовидныхъ заостренныхъ листочковъ. Крупные темно-розовые цвѣты расположены рыхлыми кистями на длинныхъ ножкахъ. Чашечка 5-тизубчатая; вѣнчикъ 5-тилепестный, мотыльковый (флагъ и лодочка его снаружи зеленоватые). Тычинокъ 10, спаянныхъ

нитями въ трубочку. Плодь—голые, продолговато-линейные бобы съ мелко-бугорчатыми сѣменами съ рубчикомъ. Цвѣтеть лѣтомъ. Растетъ въ рошахъ и между кустарниками. Отличная кормовая трава. (Табл. XLIX, фиг. 274.)

**Чина розовая**, см. Чина клубненосная (*Lathyrus tuberosus* L.).

**Чина черная** (*Orobis niger* L.). Волошка (Курск.), Голудница (Минск.), Горошекъ (Курск.), Горохъ журавлиный (Киев.), Горохъ заячій (Могил.), Горохъ черный, Желѣзная трава (Черн.), Зайчики боровые (Вил.), Кладъ (Черн.), Кустъ солодковый, Окладникъ (Волян.), Укладникъ (Полт.), Сердечникъ (Алб.), Царь зиле (Малор.), Цыганка (Орл.), Зозулины черны черевички (Полт.), Черная трава (Черниг.), Чернозеле (Укр.), Черное зеле, Чорне зиле, Чистикъ розовый (Черниг.). Многолѣтнее травянистое растеніе изъ семейства «мотыльковыхъ» (*Papilionaceae* L.), распространенное почти во всей Европѣ, въ западной средней и южной Россіи. Стебель вѣтвистый, дл. 4—22½ вершк. Листья о 4—8 паряхъ продолговато-яйцевидныхъ, съ нижней стороны сплзыхъ листочковъ. Цвѣтоносы превышаютъ листья; цвѣты сперва пурпуровые, позднѣе грязно фіолетовые, въ короткихъ кистяхъ. Чашечка 5-тизубчатая; вѣнчикъ 5-тилепестный, мотыльковый (флагъ, 2 крыла и лодочка). Тычинокъ 10. Плодь—линейные бобы. Цвѣтеть въ маѣ и въ юнѣ. Растетъ въ лѣсахъ и между кустарниками. (Рис. 326.)

**Чинарь**, см. Букъ обыкновенный (*Fagus silvestris* L.).

**Чинбаракъ**, см. Свербига восточная (*Bunias orientalis* L.).

**Чинбарникъ**, см. Кермекъ широколистный (*Statice latifolia* L.).

**Чинбарокъ**, см. Свербига восточная (*Bunias orientalis* L.).

**Чинородъ**, см. Полѣска многолѣтняя (*Mercurialis perennis* L.).

**Чиганды**, см. Тысячелистникъ обыкновенный (*Achillea Mille-*

**Чипанъ**, *folium* L.).

**Чипорасъ**, см. Шиповникъ (*Rosa canina* L.).

**Чирьевая**, см. Подорожникъ большой (*Plantago major* L.).

**Чирятокъ**, см. Колокольчикъ сборный (*Campanula glomerata* L.).

**Чистецъ**, см. Астрagalъ солодколистный (*Astragalus glycyphyl-*

*lus* L.).

**Чистецъ**, см. Чистотѣль большой (*Chelidonium majus* L.).

**Чистецъ**, см. Подмаренникъ мягкій (*Galium Mollugo* L.).

**Чистецъ**, см. Девясиль пволостный (*Inula salicina* L.).

**Чистецъ**, см. Ленъ дикій (*Linaria vulgaris* Mill.).

**Чистецъ**, см. Зюзникъ европейскій (*Lycopus europaeus* L.).

**Чистецъ**, см. Марьянникъ луговой (*Melampyrum pratense* L.).

**Чистецъ**, см. Чистецъ болотный (*Stachys palustris* L.).

**Чистецъ**, см. Чистецъ прямой (*Stachys recta* L.).

**Чистецъ**, см. Чистецъ лѣсной (*Stachys silvatica* L.).

**Чистецъ болотный** (*Stachys palustris* L.). Фармацевтическое название: *Marrubium aquaticum acutum* s. *Stachys aquatica* (Herba). Блошница раменная, Васильки холостые (Екат.), Гуголь (Вятск.), Колосникъ болотный, Калютикъ (Вятск.), Крапива волчья (Могил.), Чистецъ, Жабрей черный (Вятск.), Чернозябренникъ, Черно-

заябеникъ, Заябра полевая (Вит.), Жабрейникъ луговой (Ниж.), Мята полевая (Волог.), Мята кошачья (Влад.), Живокость (Екат.), Скрипель (Нижег.), Сырпутьникъ (Полт.), Храповникъ (Сарат.). Черёда (Сарат.). Многолѣтнее травянистое растеніе изъ семейства «губоцвѣтныхъ» (Labiatae Juss.), распространенное почти по всей Европѣ и во всей Россіи, съ подземными побѣгами, на концѣ клубнеобразно-утолщенными; стебель прямой, обыкновенно невѣтвистый, болѣе или менѣе жестко-шершавый отъ назадъ обращенныхъ волосковъ. Листья болѣе или менѣе густо-мягко-пушистые, узко-ланцетные, городчато-пильчатые, съ сердцевиднымъ основаніемъ; нижніе — съ короткими черешками, верхніе—сидячіе и полустеблеобхватывающіе; верхушечные листья обыкновенно немного превышаютъ цвѣтки, послѣ цвѣтенья отвороченные грязно-пурпуровые цвѣты по 4—10 расположены мотовчато (т. е., кольцами), нѣсколько сближенными въ длинномъ соцвѣтѣ; чашечка железисто-пушистая, почти двугубая, съ треугольно-пильчатыми отогнутыми зубцами, менѣе длинными, чѣмъ ея трубочка; вѣнчикъ двугубый, съ вогнутой верхнею и нижней 3-лопастной губой, съ болѣе широкой среднею лопастью, съ прямой трубочкой, снабженной внутри при основаніи волосистымъ кольцомъ. Тычинокъ 4, съ расходящимися гнѣздами пыльниковъ. Завязь верхняя 4-лопастная, 4-гнѣздная, съ однимъ столбикомъ, несущимъ 2-храздѣльное рыльце; плодъ—обратно-яйцевидный, почти 3-гранный, немного сжатые орешки. Цвѣтетъ лѣтомъ. Растетъ на болотистыхъ лугахъ и влажныхъ поляхъ. (Рис. 327.)

**МЕДИЦИНСКАЯ ПОПУЛЯЦИЯ.** Чистецъ болотный употребляется въ народѣ отъ боли въ горлѣ и отъ золотухи. Изъ травы дѣлаютъ припарки на затвердѣлыя болящія опухоли. Для отвара берутъ сушеную траву, изъ которой дѣлаютъ настойку на винѣ. Эту настойку съ горячею водою пьютъ отъ удара, отъ остановки мѣсячныхъ очищеній, также отъ истеріи и обмороковъ.

**Чистецъ лѣсной** (*Stachys silvatica* L.). Фармацевтическое назв.: *Galeopsis silvaticus foetidus* s. *Urtica iners foetidissima* (Herba). Бабка (Полт.), Жабникъ, Змѣиная трава, Змѣвиникъ, Змѣевикъ, Колосница лѣсная, Копытце (Вор.), Мята дикая (Курск.), Чистецъ, Шалфей дубровный, Буковица (Хар.), Буковица лѣсная, Крапива глухая (Пск., Минск., Вил.), Крапива дикая. Многолѣтнее травянистое растеніе изъ семейства «губоцвѣтныхъ» (Labiatae Juss.), распространенное почти во всей Европѣ и почти во всей Россіи. Стебель выш. 11¼—22½ вершк., шершаво-волосистый, наверху вѣтвистый, покрытый железистыми волосками. Листья черешковые, широко сердцевидные, заостренные. Темно-пурпуровые цвѣты расположены въ отдаленныхъ другъ отъ друга мотовкахъ, содержатъ по 2—12 цвѣтковъ, образующихъ длинный верхушечный колосъ. Чашечка трубчато-колокольчатая съ 10 жилками съ длинными колючими зубцами; вѣнчикъ двугубый, съ прямой трубочкой, съ вогнутой верхней и нижней 3-лопастной губой, снабженной бѣлыми волнистыми полосками.

Тычинокъ 4, съ расходящимися гнѣздами пыльниковъ. Завязь верхняя 4-хгнѣздная, 4-хлопастная, съ однимъ столбикомъ, несущимъ 2-храздѣльное рыльце. Плодъ по созрѣваніи распадается на 4 почти 3-хгранные орѣшка. Цвѣтетъ лѣтомъ. Растетъ между кустарниками и на влажныхъ мѣстахъ. Все растение обладаетъ непріятнымъ запахомъ. (Т а б л. XLIX, ф и г. 275.)

**МЕДИЦИНСКОЕ УПОТРЕБЛЕНІЕ** чистеца лѣсного въ народѣ то-же, что и предыдущаго растенія (см. чистецъ болотный).

**Чистецъ нѣмецкій** (*Stachys germanica* L.). Фармацевтическое назв.: *Stachys s. Marrubium agreste* (Herba). Крапива глухая, Мохноногъ (Курск.), Полей конскій. Многолѣтнее травянистое растение изъ семейства «губоцвѣтныхъ» (*Labiatae* Juss.), распространенное въ средней и южной Европѣ, въ Привислянскомъ краѣ, въ юго-западной и южной Россіи. Стебель выш. 14—28 вершк., прямостоящій, густо-шерстистый. Листья коротко-черешковые, продолговато-яйцевидные или ланцетные, при основаніи съ слабою сердцевидною выемкой. Многочисленные свѣтло-пурпуровые цвѣты въ густыхъ, отдаленныхъ другъ отъ друга мутовкахъ, образующихъ длинный тонкій колосъ. Чашечка трубчато-колокольчатая, съ 10 жилками и заостренными зубцами. Вѣнчикъ двугубый, съ вогнутой верхней и нижней 3-хлопастной губой. Тычинокъ 4, съ расходящимися гнѣздами пыльниковъ. Завязь верхняя 4-хгнѣздная, 4-хлопастная, съ однимъ столбикомъ, несущимъ 2-храздѣльное рыльце. Плодъ распадается по созрѣваніи на четыре трехгранныхъ орѣшка. Цвѣтетъ лѣтомъ. Растетъ на холмахъ и на сорныхъ мѣстахъ.

**Чистецъ однолѣтній** (*Stachys annua* L.). Фармацевтическое назв.: *Sideritis minor* (Herba). Жабрій (Малор.) и онъ-же Жарбій, Зябрей (Курск.), Счистокъ (Кiev.). Однолѣтнее травянистое голое или наверху пушистое растение изъ семейства «губоцвѣтныхъ» (*Labiatae* Juss.), распространенное въ южной и средней Европѣ, въ южной и юго-западной Россіи. Стебель прямой или вѣтвистый; нижніе листья съ черешками, продолговато-овальные, городчатые, верхніе—продолговато-ланцетные, острые, при основаніи клиновидно-суженные. При цвѣткахъ короткіе линейные прицвѣтники; цвѣты по 3—6 въ мутовкахъ. Чашечка трубчато-колокольчатая, железисто-волосистая, съ ланцето-шиловидными зубчиками. Вѣнчикъ съ трубчатою, желтой, снаружи пушистой, двугубой, съ вогнутой верхней и нижней 3-хлопастной губой. Тычинокъ 4, съ расходящимися гнѣздами пыльниковъ. Завязь верхняя 4-хгнѣздная, 4-хлопастная, съ однимъ столбикомъ, несущимъ 2-храздѣльное рыльце. Плодъ по созрѣваніи распадается на 4 почти 3-хгранныхъ орѣшка. Цвѣтетъ лѣтомъ. Растетъ на сорныхъ мѣстахъ, поляхъ и холмахъ.

**МЕДИЦИНСКОЕ УПОТРЕБЛЕНІЕ.** Въ народной медицинѣ трава эта употребляется на ванны отъ чесотки, струщевъ на тѣлѣ и колтуна. Въ Италіи трава эта называется «колдунной».

**Чистецъ прямой** (*Stachys recta* L.). Фармацевтическое назв.: *Sideritis* (Herba). Водовозъ (Вор.), Живика, Жабрей полевой

(Екат.), Жабрей лѣсовой (Хар.), Иготки (Вор.), Дікі конѳлі (Малор.), Маточникъ (Под.), Питульникъ (Курск.), Прозора (Ворон.), Репяшка (Киев.), Чистикъ, Чистецъ, Чистецъ, Чистнякъ, Счистокъ. Многолѣтнее травянистое шершаво-волосистое растение изъ семейства «губоцвѣтныхъ» (*Labiatae* Juss.), распространенное въ средней и южной Россіи. Стебель выш.  $1\frac{1}{2}$ — $2\frac{1}{2}$  вершк. Листья черешковые, продолговато-ланцетные, городчатые, верхніе— яйцевидные, цѣльнокрайные, заостренные. Цвѣточныя мутовки содержать 6—12 цвѣткѣ и образуютъ длинный колосъ. Чашечка трубчато-колокольчатая, съ треугольными, кончающимися остію зубчиками; вѣнчикъ блѣдно-желтый, въ звѣзду—оранжевый, съ пурпуровыми крапинками, съ трубчатою, не превышающей зубцовъ чашечки, двугубной, съ верхней вогнутой и нижней 3-лопастной губой. Тычинокъ 4, съ расходящимися гнѣздами пыльниковъ. Завязь верхняя 4-гнѣздная, 4-лопастная, съ однимъ столбикомъ, несущимъ 2-храздѣльное рыльце. Плодъ по созрѣваніи распадается на 4 почти 3-хгранныхъ орѣшка. Цвѣтетъ лѣтомъ. Растетъ на сухихъ, каменистыхъ мѣстахъ, на холмахъ и въ степяхъ. Пчелы любятъ запахъ травы, почему ея натираютъ ульи.

**МЕДИЦИНСКАЯ УПОТРЕБЛЕНІЕ.** Отваромъ травы въ народѣ обмываютъ лицо отъ вередовъ и прыщей и моютъ голову отъ перхоти.

**Чистецъ трава**, см. Гравилатъ городской (*Geum urbanum* L.)

**Чистецъ шерстистый** (*Stachys lanata* Jacq.). Живика, Лапа медвѣжья, Перекаатиполе (Екат.). Видъ весьма похожій на «чистецъ нѣмецкій» (*Stachys germanica* L.), опис. см. выше, густо-покрытый сѣбно-бѣлыми волосками. Разводится въ садахъ, дико растетъ на Кавказѣ.

**Чистецъ**, см. Ленъ дикій (*Linaria vulgaris* Mill.).

**Чистикъ**, см. Икотникъ сѣро-зеленый (*Berteroa incana* DC.).

**Чистикъ**, см. Дрокъ красильный (*Genista tinctoria* L.).

**Чистикъ**, см. Ленъ дикій (*Linaria vulgaris* Mill.).

**Чистикъ**, см. Душица обыкновенная (*Origanum vulgare* L.).

**Чистикъ**, см. Очитокъ острый (*Sedum acre* L.).

**Чистикъ**, см. Чистецъ прямой (*Stachys recta* L.).

**Чистикъ**, см. Василистникъ желтый (*Thalictrum flavum* L.).

**Чистикъ**, см. Коровякъ черный (*Verbascum nigrum* L.).

**Чистикъ**, см. Андреевъ крестъ (*Veronica spicata* L.).

**Чистикъ желтый** } см. Чистотѣль большой (*Chelidonium ma-*

**Чистикъ жовтій** } *jus* L.).

**Чистикъ песочный**, см. Ленъ дикій (*Linaria vulgaris* Mill.).

**Чистикъ розовый**, см. Чина черная (*Orobus niger* L.).

**Чистильникъ**, см. Бересклетъ европейскій (*Evonymus europaeus* L.).

**Чистникъ**, см. Чистякъ (*Ficaria ranunculoides* Moench.).

**Чистъ якъ**, см. Чистецъ прямой (*Stachys recta* L.).

**Чистоколъ**, см. Чистотѣль большой (*Chelidonium majus* L.).

**Чистокъ**, см. Звѣздчатка большая (*Stellaria Holostea* L.).

Чистолистникъ, см. Чина весенняя (*Orobus vernus* L.).

Чистоплотъ } см. Чистотѣль большой (*Chelidonium majus* L.).

Чистотѣль

Чистотѣль, см. Чистякъ (*Ficaria ranunculoides* Moench.).

Чистотѣль, см. Борщевикъ сибирскій (*Hieracium sibiricum* L.).

Чистотѣль, см. Фіалка ночная (*Platanthera bifolia* Rich.).

Чистотѣль, см. Шавель обыкновенный (*Rumex Acetosa* L.).

Чистотѣль, см. Шавель длиннй (*Rumex obtusifolius* L.).

Чистотѣль большой (*Chelidonium majus* L.). Фармацевтическое название: *Chelidonium majus*, s. *Herba Hirundinariae*. Бородавникъ, Бородавочникъ, Гладушникъ (Полт.), Гладышникъ (Вол., Под.), Глекопаръ (Малор.). Глечкопаръ, Желтушникъ, Красно-молочникъ, Коровья трава, Кривавикъ, Кровникъ (Могил.) Касаточная или Ластовинная трава, Ластовичникъ, Ластовичная трава, Ластовица, Маслянка (Умань), Молочай, Молочай желтый (Мог., Вор., Нижегород., Под.), Желтомолочникъ (Костр.), Печеночникъ, Пичинково зелье, Подтынникъ (Орл.), Прозорникъ (Полт.), Розопасъ, Розопастъ (Вятск.), Ростопахъ (Кур., Мал.), Ростокащъ (Волын.), Ростопахъ (Мал.), Разнопахъ, Разлопахъ (Вятск.), Свѣтлая (Вят.), Силидоніева трава, Селидонія, Целидонія, Селиномія (Под.), Сѣрое зелье (Умань), Старовина (Полт.), Чистякъ (Тамб., Херс., Курск. и др.), Чистикъ желтый, Чистикъ жовтій (Малор.), Чистецъ (Ворон.), Чистуха (Вят., Ниж., Каз.), Чистотѣль (Малор.), Чистоплотъ\* (Вор.), Чистоколь (Твер., село Гнилицы), Шелкунецъ (Даль), Ясколка, Адамова голова (Полт.), Аксаметь (Екат.), Волосникъ (Хар.), Стародубъ (Волын.), Полевая горчица (Вор.), Дорогая трава (Каз.), Завилецъ, Живокость (Перм.), Курача (Подол.), Куриная слѣнота (Тамб.), Лютикъ (Влад.), Звѣробой (Мев.), Дрокъ (Ниж.). Многолѣтнее травянистое растеніе изъ семейства «маковыхъ» (*Papaveraceae* Dc.), распространенное во всей Европѣ и почти во всей Россіи. Стебель выш. 7—20 вершковъ, вѣтвистый, усаженный разсыянными оттопыренными волосками; листья глубоко-перисто-раздѣльные, съ округлыми или яйцевидными неравномерно надрѣзанными городчатыми участками. Цвѣты не крупные, золотисто-желтые, собранные зонтикомъ. Чашечка 2-хлестная опадающая; вѣнчикъ 4-хлепестный, правильный; тычинки многочисленныя; рыльце небольшое, двулопастное. Плодь—длинная стручковидная одногнѣздная коробочка, раскрывающаяся 2-мя створками. Цвѣтеть съ мая до осени. Растетъ въ тѣнистыхъ мѣстахъ, въ рощахъ, около заборовъ, домовъ и въ садахъ. Млечные сосуды, находящіеся во всѣхъ частяхъ растенія, наполнены весьма ѣдкимъ оранжевымъ сокомъ. Растеніе это считается ядовитымъ, но вмѣстѣ съ тѣмъ лекарственное. (Табл. XLIX, фиг. 279.)

**МЕДИЦИННОЕ УПОТРЕБЛЕНІЕ.** Чистотѣль въ древности имѣлъ очень обширное употребленіе. Древніе полагали, что ласточки собираютъ желтый сокъ этого растенія для возвращенія зрѣнія слѣнорожденнымъ дѣтямъ, поэтому оно и считалось средствомъ

противъ глазныхъ болѣзней. На томъ основаніи, что сокъ чистотѣла желтый, его предлагали противъ желтухи; кромѣ того, его давали отъ золотухи и подагры. Въ настоящее время врачами сокъ чистотѣла не выписывается. Дѣйствуетъ онъ большею частью слабительно или, если не производитъ поноса, то дѣйствуетъ мочегонно. Собирается только свѣжая трава, которая при отжиманіи даетъ острый желтый молочный сокъ. Въ народѣ трава эта до сихъ поръ въ большомъ употребленіи. Въ отварѣ травы купаютъ дѣтей, страдающихъ кожными болѣзнями.

Отваръ листьевъ употребляется отъ веперическихъ ранъ, отъ чесотки, отъ золотухи, имъ обмываютъ червивыя раны у скота. Сокъ этого растения часто употребляется для сведенія бородавокъ и желтыхъ пятенъ. Высушеннымъ растеніемъ подкуриваютъ больныхъ, страдающихъ падучей болѣзью. Внутрь сокъ растенія принимать не слѣдуетъ, вслѣдствіе его большой ядовитости.

Въ гомеопатіи готовится настойка изъ свѣжихъ корней и дается противъ различныхъ заболѣваній внизу живота, также отъ желтухи и желчныхъ камней. Дается 1—2 капли настойки 1—2 раза въ день.

**Чистоустъ**, см. Гроздовикъ обыкновенный (*Botrychium Lunaria* Sw.).

**Чистоустъ**, см. Чистоустъ царскій (*Osmunda regalis* L.).

**Чистоустъ царскій** (*Osmunda regalis* L.). Чистоустъ, Богородичина ручка, Богородичная трава. Папоротникъ изъ семейства «чистоусовыхъ» (*Osmundaceae*). Листья отъ 7—22 $\frac{1}{2}$ , верхш. длиною, дважды-перисто-разсѣченные. Верхній сегментъ плодосный, липень зеленой пластинки, превращенъ въ метелку, несущую спорангии (вмѣстилища для споръ), остальные перисто-раздѣльные, съ продолговатыми дѣльными долями. Распространенъ въ Европѣ, въ сѣверной и южной Африкѣ и Америкѣ. Встрѣчается на болотистой почвѣ, въ лѣсахъ западной окраины Россіи, также на Кавказѣ.

**Чистуха**, см. Береза обыкновенная (*Betula alba* L.).

**Чистуха**, см. Чистотѣль большой (*Chelidonium majus* L.).

**Чистуха**, см. Полѣвка многолѣтняя (*Mercurialis perennis* L.).

**Чистуха**, см. Мыльнянка лекарственная (*Saponaria officinalis* L.).

**Чистушка**, см. Береза обыкновенная (*Betula alba* L.).

**Чистушки**, см. Дрема, кукушкинъ цвѣтъ (*Lychnis flos cuculi* L.).

**Чистякъ**, см. Береза обыкновенная (*Betula alba* L.).

**Чистякъ**, см. Чистотѣль большой (*Chelidonium majus* L.).

**Чистякъ**, см. Хохлатка плотная (*Corydalis solida* Smith.).

**Чистякъ**, см. Дымянка лекарственная (*Fumaria officinalis* L.).

**Чистякъ**, см. Букашникъ горный (*Jasione montana* L.).

**Чистякъ**, см. Ленъ дикий (*Linaria vulgaris* Mill.).

**Чистякъ**, см. Чина весенняя (*Orobis vernus* L.).

**Чистякъ**, см. Лютикъ ѣдкій (*Ranunculus acris* L.).

**Чистякъ** (*Ficaria ranunculoides* Moench.). Фармацевтическое названіе: *Chelidonium minus*, s. *Ficaria*. Жабникъ (Костр.), Куро-



слѣпникъ (Сар.), Пшовка (Умань), Пшинка, Салата (Мал.), Салатъ заячій (Кур.), Салато заяча, Салатникъ (Мал.), Салатка заячья, Чистякъ меньшій, Чистникъ, Чистотѣль. Многолѣтнее травянистое растеніе изъ семейства «лютиковыхъ» (*Ranunculaceae* Juss.), распространенное во всей Европѣ и почти во всей Россіи, выш. 3½ вершк., съ блестящими гладкими сердцевидными листьями и золотисто-желтыми цвѣтами. Корень состоитъ изъ пучка шишекъ. Чашечка 3-лиственная; лепестковъ 8; тычинокъ много. Плодъ состоитъ изъ многочисленныхъ сѣмянокъ. Цвѣтетъ весной. Растетъ въ сырыхъ мѣстахъ, въ лѣсахъ и между кустарниками. Корневые шишки содержатъ крахмалъ и въ вареномъ видѣ съдобны. Цвѣточные почки, приготовленные въ уксусъ, замѣняютъ каперсы. Листья могутъ употребляться въ щи и въ салатъ. Молодые шишечки нерѣдко въ гористыхъ странахъ вымываются дождями изъ земли въ большомъ количествѣ, что даетъ поводъ къ разсказамъ о хлѣбномъ дождѣ. Бѣдными эти шишки собираются подъ именемъ небеснаго ячменя, или небесной манны (Рис. 328.)

Чистякъ меньшій, см. Чистякъ (*Ficaria ranunculoides* Moench.).

Чистякъ меньшій, см. Дымянка лекарственная (*Fumaria officinalis* L.).

Чисцикъ, см. Вербейникъ обыкновен. (*Lysimachia vulgaris* L.)

Чихавецъ } см. Чихотная трава (*Ptarmica vulgaris* Dc.). —

Чиханецъ }

Чихота, см. Чихотникъ сѣро-зеленый (*Berteroa incana* Psc.).

Чихотка, см. Толокнянка обыкновенная (*Arctostaphylos officinalis* Moench.).

Чихотка, см. Чемерица бѣлая (*Veratrum album* L.).

Чихотная трава, см. Мелколепестникъ бѣлый (*Erigeron acris* L.).

Чихотная трава (*Ptarmica vulgaris* Dc.). Фармацевтическое названіе: *Ptarmica* s. *Pyrethrum germanicum* (Rad., Hb. et Fl.). Девятигрызина тр. (Перм.), Девятильникъ бѣлый, Девятиха бѣлая (Арх. губ., Шенкур. у.), Деревей (Вор.), Зоря дикая (Волог.), Змѣвица (Могил.), Кихавецъ трава и пскал. Кихавецъ, Кихавникъ (Волог., Подольск.), Кровавикъ, Кровавникъ, Крупижникъ (Тверск. губ., Осташк. у.), Матрешка (Ниж.), Приозерникъ бѣлый, Романовъ цвѣтъ (Екат.), Рябина дикая Ярослав.), Серпоризъ (Ворон.), Чихавецъ, Чихрица, Чиханецъ. Чихотная трава. Многолѣтнее травянистое растеніе изъ семейства «сложноцвѣтныхъ» (*Compositae* Adans.), распространенное въ сѣверной и средней Европѣ и почти во всей Россіи. Стебель голый, выш. 7—14 вершк. Листья цѣльные, линейно-ланцетные, по краямъ пильчатые; корешки собраны пучковидной метелкой. Краевые цвѣты язычковые, бѣлые, женскіе, въ числѣ 10; внутренніе трубчатые, желтые, обоеполовые. Тычинокъ 5. Завязь нижняя одногнѣзная, односѣмянная, съ однимъ столбикомъ, несущимъ 2-храздѣльное рыльце. Плодъ—сѣмянка. Цвѣтетъ во второй половинѣ лѣта. Растетъ на влажныхъ лугахъ и между кустарниками.

**МЕДИЦИННОЕ УПОТРЕБЛЕНІЕ.** вполнѣ оставлено.

- Чихотникъ**, см. Чихотная трава (*Ptarmica vulgaris* Dc.).  
**Чихранъ**, см. Сафлоръ красильный (*Carthamus tinctorius* L.).  
**Чихрица**, см. Чихотная трава (*Ptarmica vulgaris* Dc.).  
**Чмелыняикъ**, см. Черноголовка обыкновенная (*Prunella vulgaris* L.).  
**Чмель**, см. Цминъ (*Helychrisum arenarium* Dc.).  
**Чмельникъ**, см. Иванъ да Марья (*Melampyrum nemorosum* L.).  
**Чмеръ** } см. Цминъ (*Helychrisum arenarium* Dc.).  
**Чминъ** }  
**Чобитъ удодівъ**, см. Анютины глазки, или фіалка трехцвѣтная (*Viola tricolor* L.).  
**Чоборъ**, см. Чаберъ садовый (*Satureja hortensis* L.).  
**Чоботки малые**, см. Рапунцель огородный (*Campanula Rapunculus* L.).  
**Чобрецъ** } см. Чаберъ садовый (*Satureja hortensis* L.).  
**Чобрецъ** }  
**Чобрикъ** }  
**Чобуръ** } см. Богородская трава (*Thymus Serpyllum* L.).  
**Чобуръ**, }  
**Чобуръ** см. Душевикъ остролистный (*Calamintha Aclinos* Benth.).  
**Човникъ**, см. Стрѣлолистъ обыкновенный (*Sagittaria Sagittaeifolia* L.).  
**Чомберъ** } см. Богородская трава (*Thymus Serpyllum* L.).  
**Чомбиръ** }  
**Чорвошникъ**, см. Вѣтреница лютиковая (*Anemone ranunculoides* L.).  
**Чорне зілле**, см. Чина черная (*Orobus niger* L.).  
**Чорнобилъ** } см. Чернобыльникъ обыкновенный (*Artemisia vulgaris* L.).  
**Чорнобыльникъ** }  
**Чорнобилъ** }  
**Чортово зілле**, см. Осоть огородный (*Sonchus oleraceus* L.).  
**Чортовы орѣхи**, см. Орѣхи водяные (*Trapa natans* L.).  
**Чортополохъ**, см. Чертополохъ пониклый (*Carduus nutans* L.).  
**Чортъ**, см. Рогоза широколистная (*Typha latifolia* L.).  
**Чоснокъ** } см. Чеснокъ посѣвной (*Allium sativum* L.).  
**Чосныкъ** }  
**Чренотополь**, см. Осокоръ обыкновенный (*Populus nigra* L.).  
**Чубрецъ** } см. Богородская трава (*Thymus Serpyllum* L.).  
**Чубрика** }  
**Чубрица** }  
**Чубушникъ**, см. Жасминъ ночной, или дикій (*Philadelphus coronarius* L.).  
**Чу. ашинскій корень**, см. Сассапарель (*Smilax China* L.).  
**Чувель**, см. Щавель обыкновенный (*Rumex Acetosa* L.).  
**Чудотворка**, см. Колосокъ пахучій (*Anthoxanthum odoratum* L.).  
**Чудоцвѣтникъ** } см. Ночная красавица (*Mirabilis Jalapa* L.).  
**Чудоцвѣтъ** }  
**Чужеварникъ**, см. Запникъ клубневосный (*Phlomis tuberosa* L.).  
**Чумный корень**, см. Бѣлокопытникъ обыкновенный (*Petasites vulgaris* Desf.).

Чупрынка лядзка, см. Мятлик луговой (*Poa pratensis* L.).  
 Чучевика, см. Чечевича настоящая (*Ervum Lens* L.).  
 Чыстець, см. Чистець прямой (*Stachys recta* L.).

### III.

Шабольникъ, см. Кувшинка желтая (*Nuphar luteum* Smith.).  
 Шабура, см. Чертополохъ разнолистный (*Cirsium heterophyllum* All.).

Шавлій } см. Шалфей лекарственный (*Salvia officinalis* L.).  
 Шавлія }

Шадрикъ, см. Кошачьи лапки (*Antennaria dioica* Gärtn.).

Шаклакъ, см. Крушина ломкая (*Rhamnus frangula* L.).

Шалашникъ, см. Лапчатка-узикъ (*Potentilla Tormentilla* Schrenk.).

Шалей, см. Дурманъ вонючій (*Datura Stramonium* L.).

Шаленець, см. Чернокорень лекарственный, обыкновенный (*Cynoglossum officinale* L.).

Шаленець, см. Плюнь (*Hedera Helix* L.).

Шаленець, см. Горлець, раковыя шейки (*Polygonum Bistorta* L.).

Шаленець, см. Серпуха красильная (*Serratula tinctoria* L.).

Шалень, см. Бѣлокрыльникъ болотный (*Parnassia palustris* L.).

Шалики болотные, см. Вшивица болотная (*Pedicularis palustris* L.).

Шалобольникъ, см. Василекъ перистый (*Centaurea Scabiosa* L.).

Шалобольникъ, см. Кувшинка желтая (*Nuphar luteum* Smith.).

Шалфей, см. Будра плющевидная (*Glechoma hederacea* L.).

Шалфей, см. Полюнь степная (*Linosyris villosa* Dc.).

Шалфей, см. Шалфей лекарственный (*Salvia officinalis* L.).

Шалфей, см. Андреевъ крестъ (*Veronica spicata* L.).

Шалфей дикий, см. Полюнь степная (*Linosyris villosa* Dc.).

Шалфей дикий, см. Шалфей лѣсной (*Salvia silvestris* L.).

Шалфей клейкій (*Salvia glutinosa* L.). Кадыло (Бесс.). Видъ шалфея, произрастающаго въ средней и южной Россіи, изъ семейства «губоцвѣтныхъ» (*Labiatae* Juss.), съ сѣро-желтымъ вѣнчикомъ, испещреннымъ бурыми крапинками.

Шалфей лекарственный (*Salvia officinalis* L.). Фармацевтическое назв. *Salvia hortensis* s. *officinalis* (Hb.). Шалфей (въ б. ч. Россіи) и изм. Шалфій (Екат.) Шалфія, Шальвія (Югозап. Росс.), Шавлій, Шавлія (Малор.). Полукустарникъ изъ семейства «губоцвѣтныхъ» (*Labiatae* Juss.), распространенный въ южной Европѣ, выш. 7—14 вершковъ, покрытый короткимъ сѣроватымъ пушкомъ; молодые побѣги бѣловато-войлочные. Листья черешковые, продолговатые, морщинистые. Цвѣточныя мутовки содержать по 4—6 цвѣтковъ и собраны верхушечными кистями. Вѣнчикъ двугубый, синевато-фіолетовый, рѣдко бѣлый; внутри его трубочка находится кольцо волосковъ. Тычинокъ 2. Завязь верхняя 4-хлопастная, 4-хгнѣздная. Плодь распадается по созрѣваніи на 4 орѣшка. Разводится всюду въ садахъ. Употре-

бляется въ медицинѣ. На востокѣ его пьютъ подъ названіемъ греческаго чая. (Табл. XLIX, фиг. 280.)

**МЕДИЦИНСКОЕ УПОТРЕБЛЕНІЕ.** Шалфей извѣстенъ съ древнихъ лѣтъ. Многіе греческіе поэты воспѣвали его цѣлебныя свойства. Въ настоящее время употребленіе шалфея крайне ограничено. Шалфей содержитъ въ себѣ дубильное вещество и эфирное шалфейное масло. Внутри шалфей иногда употребляется въ домашнемъ быту, ввидѣ чая отъ простуды, самое-же главное примѣненіе отвара шалфея для полосканія горла при различнаго рода заболѣваніяхъ горла, какъ-то: при ангинѣ простой и фолликулярной съ образованіемъ гнояниковъ на миндалевидныхъ железахъ, при афтахъ на слизистой оболочкѣ губъ и рта у дѣтей. Отваръ шалфея заваривается, какъ чай: берутъ щепотку сушеной травы, заливаютъ ее стаканомъ кипятка, даютъ настояться и процеживаютъ сквозь полотняную тряпочку. Въ отвару шалфея для полосканія горла прибавляютъ крѣпкій отваръ чая и чайную ложку борной кислоты на стаканъ смѣси.

Въ домашнемъ быту приготавливаютъ слѣдующую смѣсь для полосканія рта отъ цынготныхъ десенъ: берутъ одну горсть шалфея, розмарина, чистотѣла, двѣ горсти листьевъ ежевики, 80 грм. (2 драхмы) квасцовъ и 180,0 грм. (6 унцъ) меду, все это кипятятъ въ укусѣ, затѣмъ процеживаютъ. На стаканъ воды кладутъ одну-двѣ стол. ложки отвара и этимъ полощатъ ротъ. Шалфей входитъ въ составъ ароматическаго укуса. Сушеные истертые въ порошокъ листья идутъ въ зубной порошокъ. Кромѣ этого, листья шалфея курятъ отъ астмы.

Въ ветеринарной медицинѣ внутри отваръ шалфея дается отъ хроническихъ катарровъ легкихъ и кишечнаго канала, а также при заболѣваніяхъ тазовыхъ органовъ. Снаружи отваромъ шалфея животнымъ обмываютъ уши отъ кровензліаніемъ, ссадины, холодные нарывы; также имъ обмываютъ ротъ животныхъ при воспаленіи слизистыхъ оболочекъ и при язвахъ во рту.

Листья шалфея собираются въ маѣ до начала полнаго цвѣтенія, высушиваются въ тѣни и сохраняются въ хорошо закупоренныхъ банкахъ.

**Шалфей луговой, см. Шалфей мушкатный** (*Salvia sclarea* L.).

**Шалфей луговой** (*Salvia pratensis* L.). Фармацевтическое названіе: *Salvia pratensis*, s. *Herminum pratense*. Бабка (Вол.), Бабки (Малор.), Буквица синяя (Черниг.), Васильки, Васильки полевые, Васэлки долины (Умань), Васэлокъ, Васэльки (Малор.), Иванъ да Марья (Тул.), Каплуны (Тавр.), Кокнишъ (Умань), Кощеникъ (Вор.), Кукурузка, Матушникъ (Подол.), Меловка (Полт.), Медунки (Кіев.), Подсвитухъ (Умань), Свинушки (Умань), Самосѣй, Сокирки (Малор.), Шальвія (Малор.), Шалфея. Многолѣтнее травянистое пушисто-мохнатое растеніе изъ семейства «губоцвѣтныхъ» (*Labiatae* Juss.), распространенное въ средней и южной Европѣ, въ средней и южной Россіи. Стебель вышиною 3—14 вершк., наверху вмѣстѣ съ прицвѣтниками и чашечкой

железисто-волосистый. Листья яйцевидные, по краямъ двугордчатые, морщинистые, снизу пушистые. Прицвѣтники зеленые. Цвѣточные мутовки большею частью о 6 цвѣткахъ. Чашечка колокольчатая, двугубая, съ 3-хзубчатой верхней и двураздѣльной нижней губой: вѣнчикъ снѣгій, рѣже розовый или бѣлый, съ сжатою съ боковъ шлемообразною верхнею и 3-хлопастной нижнею губой, внутри безъ кольца волосковъ. Тычинокъ 2, съ короткими нитями. Завязь верхняя 4-хгнѣздная, 4-хлопастная, съ однимъ столбикомъ, несущимъ 2-храздѣльное рыльце. Плодъ по созрѣваніи распадается на 4 округлыхъ гладкихъ слегка 3-хгранныхъ орѣшка. Цвѣтеть съ мая до іюля. Растетъ на сухихъ лугахъ и опушкѣхъ лѣсовъ. Обладаетъ не-приятнымъ запахомъ.

**Шалфей лѣсной** (*Salvia silvestris* L.). Бабки, Васильки (Херс., Екат.), Васильки полевые (Екат.), Васильки полевые (Малор.), Васильки степные (Укр.), Василекъ степной, Соколий перелетъ (Сарат.), Суховѣрники (Хар.), Шалфей дикій. Произрастаетъ въ средней и южной Россіи, отличается отъ шалфея лугового (описание см. выше) пурпурово-фіолетовыми прицвѣтниками и снѣжными или фіолетовыми, рѣже розовыми и бѣлыми цвѣтами.

**Шалфей мутовчатый** (*Salvia verticillata* L.). Бабка (Вор.), Буквица (Екат.), Жабрей, Криничникъ (Волын.), Лопушекъ (Укр.), Свинушникъ (Малор.), Цвигрій (Орл.). Отличается отъ шалфея лугового (опис. см. выше) треугольно-сердцевидными листьями и густыми мутовками, содержащими отъ 20 до 40 фіолетовыхъ цвѣтковъ. Распространенъ въ средней и южной Россіи.

**Шалфей мушкатный** (*Salvia Sclarea* L.). Фармацевтическое назв.: *Sclarea v. Horminum salivum, s. Gallitricum* (Herba). Салвея мушкатная, Шалфей луговой. Произрастаетъ въ южной Европѣ и на Востокахъ; имѣетъ особенный весьма ароматичный и нѣсколько одуряющій запахъ. Прибавляютъ его къ пиву и вину для сообщенія мушкатнаго запаха.

**Шалфей полевой**, см. Буквица лекарственная (*Betonica vulgaris* L.).

**Шалфей полевой**, см. Колокольчикъ сборный (*Campanula glomerata* L.).

**Шалфей полевой**, см. Иванъ-чай (*Erodium angustifolium* L.).

**Шалфей полевой**, см. Цминъ (*Helichrysum arenarium* Dc.).

**Шалфей полевой**, см. Шалфей лѣсной (*Salvia silvestris* L.).

**Шалфей полевой**, см. Василистникъ желтый (*Thalictrum flavum* L.).

**Шалфей полевой**, см. Андреевъ крестъ (*Veronica spicata* L.).

**Шалфей поникшій** (*Salvia nutans* L.). Бабка, Бабки (Южн. Росс.), Голымъ, Голымъ (Малор.), Василекъ дикій (Хар.), Василекъ красный (Верон.), Кошачья дремота. Распространенъ въ средней и южной Россіи и отличается отъ шалфея лугового (опис. см. выше) фіолетовыми цвѣтами въ поникшихъ кистяхъ.

**МЕДИЦИНСКОЕ УПОТРЕБЛЕНІЕ.** Въ народѣ этимъ видомъ шалфея лѣчатъ больныхъ отъ опухощей.

**Шалфейникъ**, см. Икотникъ сѣро-зеленый (*Berteroa incana* Dc.).

**Шалфій** } см. Шалфей лекарственный (*Salvia officinalis* L.).

**Шалфія** }

**Шалхвея**, см. Шалфей луговой (*Salvia pratensis* L.).

**Шальвія**, см. Шалфей лекарственный (*Salvia officinalis* L.).

**Шальвія**, см. Шалфей луговой (*Salvia pratensis* L.).

**Шальная трава**, см. Дурманъ вонючій (*Datura Stramonium* L.).

**Шальникъ**, см. Частуха обыкновенная (*Alisma Plantago* L.).

**Шальникъ**, см. Пижма (*Tanacetum vulgare* L.).

**Шалѣлая трава**, см. Дурманъ вонючій (*Datura Stramonium* L.).

**Шампиньонъ** (*Agaricus campestris* L.). Грибъ изъ семейства «шляпныхъ грибовъ», распространенный во всей Европѣ, Азій и сѣверной Америкѣ. Пенекъ до 2½ вершк. выш. несетъ вверху пленчатое кольцо, закрывающее въ молодомъ возрастѣ пластинки со спорами. Шляпка бѣлая, глянцевитая, иногда нѣсколько клочковатая. Пластинки сначала розовыя, подъ конецъ буро-черноватыя. Встрѣчается на лугахъ, пастбищахъ, поляхъ, вообще тамъ, гдѣ лежатъ конскій навозъ. Представляетъ одинъ изъ лучшихъ съѣдобныхъ грибовъ и разводится искусственно въ большомъ количествѣ. (Табл. XLIX, фиг. 277 и 278.)

**Шандра**, см. Живучка ползучая (*Ajuga reptans* L.).

**Шандра**, см. Чернокудренникъ черный (*Ballota nigra* L.).

**Шандра**, см. Пахучка обыкновенная (*Calamintha Clinopodium* Benth.).

**Шандра**, см. Будра плющевидная (*Glechoma hederacea* L.).

**Шандра** } см. Шандра обыкновенная (*Marrubium vul-*

**Шандра бѣлая** } gare L.).

**Шандра вонючая**, см. Чернокудренникъ черный (*Ballota nigra* L.).

**Шандра душистая**, см. Котовикъ кошачій (*Nepeta cataria* L.).

**Шандра обыкновенная** (*Marrubium vulgare* L.). Фармацевтическое назв.: *Marrubium album*, s. *Lamium Mariae*. Былица болотная, Конская мята, Шанта, Шандра бѣлая. Многолѣтнее травянистое растеніе изъ семейства «губоцвѣтныхъ» (*Labiales* Juss.), распространенное въ средней и южной Европѣ, изрѣдка встрѣчающееся въ средней и южной Россіи и въ Туркестанѣ. Стебель выш. 7—14 вершк., бѣловато-шерстистый, при основаніи развѣтвленный. Листья черешковые, округло-яйцевидные, морщинистые, городчатые. Грязно-бѣлые цвѣты собраны въ большомъ числѣ почти шаровидными мутовками. Чашечка съ 10 загнутыми внизъ зубцами. Вѣнчикъ бѣлый, съ заключенною въ чашечкѣ трубкою, двугубый: верхняя губа узкая, прямая, наверху 2-хлопастная, нижняя губа 3-хлопастная, съ болѣе широкою среднею лопастью. Тычинокъ 4, заключенныхъ въ трубочкѣ вѣнчика; заднія изъ нихъ болѣе короткія; гнѣзда пыльниковъ расходящіяся и раскрывающіяся широкою общею щелью. Завязь верхняя 4-хгнѣздная, 4-хлопастная, съ столбикомъ, несущимъ 2-храздѣльное рыльце. Плодъ по созрѣваніи распадается на 4 продолговато-3-гранныхъ орѣшка. Растетъ

обыкновенно около дорогъ и на сорныхъ мѣстахъ. Цвѣтеть лѣтомъ. (Рис. 329.).

**МЕДИЦИНСКОЕ УПОТРЕБЛЕНІЕ.** Трава «шандра обыкновенная» содержитъ въ себѣ вмѣстѣ съ горькимъ веществомъ и небольшое количество эфирнаго масла еще много солей: какъ-то сѣрныхъ, калийныхъ, натренныхъ и др. Собирается трава во время цвѣтенія, отъ іюня до августа, высушивается, нарѣзается и сохраняется въ плотно закупоренныхъ банкахъ. Запахъ травы отъ высушиванія пропадаетъ.

Въ прежнее время трава эта цѣнилась, какъ противолихорадочное и тоническое средство, теперь употребленіе ея осталось только какъ домашнее средство. Ее принимаютъ отъ задержки регуль, происходящей отъ чахотки и другихъ ослабляющихъ организмъ болѣзней, далѣе отъ застоя крови въ печени, отъ желтухи, и для этой послѣдней цѣли пьютъ сокъ, выжатый изъ свѣжаго растенія, отъ 30,0—60,0 грм. (1—2 унцъ) ежедневно съ медомъ или съ другими свѣжими соками растеній.

Сокъ смѣшиваютъ съ розовымъ или деревяннымъ масломъ и кладутъ на ваткѣ въ уши отъ боли въ ушахъ. Изъ сушеныхъ листьевъ готовятъ обыкновенный отваръ, какъ чай: берутъ щепотку травы отъ 15-ти до 30-ти граммъ ( $\frac{1}{2}$  унца до 1 унца) на 180 грм. (6 унц., или 12 стол. лож.) воды. Всю эту порцію выпиваютъ столовыми ложками въ теченіе сутокъ, или-же дѣлаютъ болѣе слабый отваръ, который пьютъ чайными чашками. Въ народѣ сокъ свѣжаго растенія цѣнится, какъ средство отъ малокровія. Пчелы очень любятъ это растеніе.

Въ ветеринарной медицинѣ растеніе дается въ тѣхъ-же случаяхъ, какъ и всѣ горькія травы; оно можетъ замѣнить горечавку, если послѣдняя плохо переносится.

**Шанта**, см. Шандра обыкновенная (*Marrubium vulgare* L.).

**Шанта**, см. Котовикъ кошачій (*Nepeta Cataria* L.).

**Шанта черная**, см. Чернокудренникъ черный (*Ballota nigra* L.).

**Шапка дурачья**, см. Иванъ-чай (*Epilobium angustifolium* L.).

**Шапки болотныя**, см. Купальница европейская (*Trollius europaeus* L.).

**Шапка—дунуть плѣшка**, см. Одуванчикъ лекарственный (*Taraxacum Dens Leonis* Desf.).

**Шапочки**, см. Бѣлогловка (*Trifolium montanum* L.).

**Шапошникъ**, см. Манжетка обыкновен. (*Alchemilla vulgaris* L.).

**Шапошникъ**, см. Василекъ луговой (*Centaurea jacea* L.).

**Шапошникъ**, см. Посконникъ конопляный (*Eupatorium cannabinum* L.).

**Шапошникъ**, см. Желтуха (*Senecio jacobaea* L.).

**Шаптала**, см. Персикъ (*Persica vulgaris* Dc.).

**Шарагъ**, см. Осока дернистая (*Carex caespitosa* L.).

**Шарбарина**, см. Свербига восточная (*Bunias orientalis* L.).

**Шарило**, см. Сныкъ обыкновенный (*Echium vulgare* L.).

**Шарило синяя**, см. Синякъ обыкновенный (*Echium vulgare* L.).

**Шарникъ**, см. Ваида красильная (*Isatis tinctoria* L.).

**Шаружникъ** } см. Пахучка обыкновенная (*Calamintha Clinopodium* L.).  
**Шарушникъ** } *podium* L.).

**Шаста**, см. Мохъ олений (*Cladonia rangiferina* L.).

**Шаторакъ**, см. Касатикъ водяной (*Iris pseudacorus* L.).

**Шатувъ**, см. Сушеница лѣсная (*Gnaphalium sylvaticum* L.).

**Шафлоръ**, см. Сафлоръ красильный (*Carthamus tinctorius* L.).

**Шафранъ**, см. Шафранъ настоящій (*Crocus sativus* L.).

**Шафранъ весенній** (*Crocus vernus* Willd.). Многолѣтнее травянистое растение изъ семейства «касатиковыхъ» (*Iridaceae* Juss.), распространенное въ средней и южной Европѣ, снабженное луковичеобразнымъ маленькимъ клубнемъ, немного крупнѣ лѣсного орѣха, покрытымъ листовыми влагалищами. Зеленые длинные линейно-ланцетные листья окружены при основаніи нѣсколькими перепончатыми чешуйчатыми листьями. Цвѣты голубовато-пурпуровые, рѣдко бѣлые. Околоцвѣтникъ лепестковидный, 6-тираздѣльный, воронковидный, правильный. Тычинокъ 3; завязь нижняя 3-хгнѣздная, съ нитевиднымъ стебелькомъ и 3-мя ярко-оранжевыми лепестковидными, расширенными на верхушкѣ и гребневидно-надрѣзанными рыльцами, вдвое короче отгиба околоцвѣтника. Плодъ—коробочка. Цвѣтетъ весной. Разводится, какъ и многіе другіе виды шафрана, въ качествѣ декоративныхъ растений въ садахъ. (Табл. I. фиг. 281.)

**Шафранъ дикій**, см. Сафлоръ красильный (*Carthamus tinctorius* L.).

**Шафранъ дикій** } см. Зимовникъ осенній (*Colchicum autumnale* L.).

**Шафранъ луговой** } *nale* L.).

**Шафранъ московскій**, см. Бархатцы (*Tagetes patula* L.).

**Шафранъ моровой** } см. Зимовникъ осенній (*Colchicum*

**Шафранъ моровой дикій** } *autumnale* L.).

**Шафранъ настоящій** (*Crocus sativus* L.). Шафранъ, Шафранъ садовый, Свѣтлица (Екат.). Многолѣтнее травянистое растение изъ семейства «касатиковыхъ» (*Iridaceae* Juss.), родомъ съ Востока, снабженное клубнемъ, величиною съ грецкій орѣхъ. Зеленые узкіе острые листья, окруженные при основаніи нѣсколькими перепончатыми чешуйчатыми листьями, во время цвѣтенія одинаковой длины съ фіолетовымъ цвѣткомъ или длиннѣе его. Околоцвѣтникъ воронковидный, лепестковидный, о 6 равныхъ доляхъ. Тычинокъ 3; завязь нижняя 3-хгнѣздная, съ нитевиднымъ столбикомъ и 3-мя лепестковидными ярко-оранжевыми, на верхушкѣ слегка рѣсничатыми, рыльцами, равными отгибу околоцвѣтника. Плодъ — коробочка. Цвѣтетъ осенью. Воздѣлывается въ большомъ количествѣ въ западной Европѣ, на Востокѣ и у насъ въ Закавказьѣ ради цвѣтовъ, высушенныхъ рылецъ которыхъ даютъ «шафранъ», употребляемый въ медицинѣ и, какъ безвредное красящее вещество, въ кондитерскомъ дѣлѣ. (Рис. 330.)

**МЕДИЦИНСКОЕ УПОТРЕБЛЕНІЕ.** Шафранъ принадлежитъ къ числу сильно дѣйствующихъ средствъ. Въ медицинѣ онъ теперь почти никогда не употребляется, въ домашнемъ-же быту имъ



иногда пользуются женщины, у которыхъ почему-либо задержались менструація, такъ какъ извѣстно, что шафранъ принадлежитъ къ числу средствъ, вызывающихъ сокращенія матки, но большіе приемы шафрана могутъ вызвать сильные приливы крови къ головѣ, оглушеніе и даже полную картину удара, потому злоупотреблять имъ не слѣдуетъ.

Въ гомеопатіи шафранъ употребляется отъ истерическихъ припадковъ, отъ судорогъ, отъ наклонности къ выкидышу, женщинамъ онъ дается въ климактерическомъ періодѣ. Кроме того, онъ дается отъ хорей, судорожной эвенты, носовыхъ кровотеченій, воспаления легочной плевры. Даютъ 1 каплю чистой настойки и 1-го, 2-го разведенія черезъ каждыя  $\frac{1}{2}$ , 1, 2, 3 часа.

Въ ветеринарной медицинѣ шафранъ вслѣдствіе своей дороговизны и крайне неопредѣленнаго дѣйствія тоже не употребляется.

**Шафранъ садовый**, см. Шафранъ настоящій (*Crocus sativus* L.).

**Шактутъ**, см. Тutowое дерево, Шелковица черная (*Morus nigra* L.).

**Шачавыця**, см. Чечвица настоящая (*Eryum Lens* L.).

**Шваденъ трава**, см. Мамникъ обыкновенный (*Glyceria fluitans* R. Br.).

**Шведка**, см. Мыльнянка лекарственная (*Saponaria officinalis* L.).

**Шведка приморская** (*Suaeda maritima* Dumort.). Приморская гусиная лапка. Однолѣтняя визьнякая (выш.  $3\frac{1}{2}$ —7 вершк.) сильно вѣтвистая зеленая или красноватая травка изъ семейства «маревыхъ» (*Chenopodiaceae* Vent.), распространенная въ средней и южной Европѣ, въ средней и южной Россіи и въ Сибирѣ; съ очередными, линейными, полуцилиндрическими, мясистыми листьями, въ углахъ которыхъ сидятъ по 1—3 мелкіе зеленые цвѣты. Околоцвѣтникъ травянистый, 5-тираздѣльный; тычинокъ 5; завязь одногнздная, съ однимъ яичкомъ. Плодъ—сѣмянка. Цвѣтетъ осенью. Растетъ на солончакахъ и морскихъ берегахъ.

**Швижавки полевые**, см. Подорожникъ средній (*Plantago media* L.).

**Шеберникъ** } см. Чаберъ садовый (*Satureja hortensis* L.).

**Шеберъ**

**Шевлія**, см. Шалфей лекарственный (*Salvia officinalis* L.).

**Шевошнакъ**, см. Бузина красная (*Sambucus racemosa* L.).

**Шевръ-фейль**, см. Жимолость душистая (*Lonicera Caprifolium* L.).

**Шевское деревцо**, см. Скомпія (*Rhus Cotinus* L.).

**Шегня**, см. Шенъ обыкновенный (*Paeonia officinalis* Retz.).

**Шейки раковыя**, см. Горлець (*Polygonum Bistorta* L.).

**Шейки раковыя**, см. Купена лекарственная (*Convallaria Polygonatum* L.).

**Шейки рачьи**, см. Горлець, раковыя шейки (*Polygonum Bistorta* L.).

**Шейхцерія болотная** (*Scheichzeria palustris* L.). Ситница бо-

лотная. Многолѣтняя болотная трава изъ семейства «ситнико-выхъ» (*Juncaceae* Bartl.), распространенная въ горахъ въ сѣверной и средней Европѣ, въ сѣверной, средней и юго-западной Россіи и въ западной Сибири. Тонкое ползучее корневище погружено въ илстую почву и выпускаетъ нѣсколько густо-облиственныхъ стеблей, выпш.  $5\frac{1}{2}$ — $18\frac{1}{2}$  вершк. Мелкіе зелено-ваго-желтые цвѣты собраны короткою верхушечною кистью; околоцвѣтникъ 6-тилистный, чашечковидный (травянистый). Тычинокъ 6; пестикъ состоитъ изъ 3-хъ сросшихся при основаніи между собой плодolistиковъ. Плодъ сухой, распадающійся при созрѣваніи на 3 плодика. Растетъ на торфяныхъ болотахъ. Цвѣтетъ въ маѣ и въ іюнѣ. (Рис. 331.)

**Шеколадное дерево** } см. Какао (*Theobroma Cacao* L.).

**Шеколадные бобы** } см. Какао (*Theobroma Cacao* L.).

**Шеломайникъ**, см. Козлобородникъ луговой (*Tragopogon pratensis* L.).

**Шелепунъ**, см. Погремокъ обыкновен. (*Rhinanthus Crista Galli* L.).

**Шелестъ**, см. Макъ-самосѣйка (*Paraver Rhoeas* L.).

**Шелестунъ**, см. Стальникъ пахучій (*Ononis hircina* Jacq.).

**Шелкъ крапивный**, см. Повелка клеверная (*Cuscuta Epithy-  
mum* Sm.).

**Шелковица**, см. Осока мохнатая (*Carex hirta* L.).

**Шелковица**, см. Иванъ-чай (*Epilobium angustifolium* L.).

**Шелковица**, см. Цминъ (*Helichrisum arenarium* Dc.).

**Шелковица** } см. Тутовое дерево, Шелковица бѣлая (Мо-  
**Шелковица бѣлая** } *rus alba* L.).

**Шелковица цареградская** } см. Тутовое дерево, Шелковица  
**Шелковица черная** } черная (*Morus nigra* L.). (Табл. I,  
фиг. 281.)

**Шелковичное дерево**, см. Тутовое дерево, Шелковица бѣлая, (*Morus alba* L.).

**Шелковичное растеніе**, см. Асклепась сирійскій (*Asclepias syriaca* L.).

**Шелкунъ**, см. Тутовое дерево, Шелковица бѣлая (*Morus alba* L.).

**Шелобольникъ**, см. Василекъ перистый (*Centaurea Scabiosa* L.).

**Шелюгъ**, см. Черноталъ (*Salix pentandra* L.).

**Шелягъ**, см. Просвирникъ сѣверный (*Malva borealis* Wallm.).

**Шемелина**, см. Легочника лекарственная (*Pulmonaria officina-  
lis* L.).

**Шемширъ**, см. Шиповникъ (*Rosa canina* L.).

**Шень-шень**, см. Жинзеньгъ китайскій (*Panax Ginseng* Meyer).

**Шепишникъ**, см. Шиповникъ (*Rosa canina* L.).

**Шептунъ-дерево**, см. Осина (*Populus tremula* L.).

**Шептуха**, см. Лапчатка-узикъ (*Potentilla Tormentilla* Schrenk.).

**Шепшинникъ**, см. Шиповникъ (*Rosa canina* L.).

**Шерошница**, см. Подмаренникъ цѣлкій (*Gallium Aparine* L.).

**Шерстникъ**, см. Кошачья лапка (*Antennaria dioica* Gärtn.).

**Шестинедѣльникъ**, см. Залчья капуста (*Sedum Telephium* L.).

**Шечевица**, см. Чечевица настоящая (*Ervum Lens* L.).

- Шиворникъ полевой, см. Вишня степная (*Prunus Chamaejasus* Jacq.).
- Шийки ракові, см. Горлецъ (*Polygonum Bistorta* L.).
- Шикта, см. Ерникъ обыкновенный (*Empetrum nigrum* L.).
- Шилабнекъ луговой, см. Короставникъ полевой (*Scabiosa arvensis* L.).
- Шильная трава, см. Дрокъ красильный (*Genista tinctoria* L.).
- Шильникъ, см. Частуха обыкновенная (*Alisma Plantago* L.).
- Шильникъ, см. Истодъ хохлатый (*Polygala comosa* Schk.).
- Шильникъ водяной, см. Частуха обыкновенная (*Alisma Plantago* L.).
- Шильникъ желтый, см. Стрѣлолистъ обыкновенный (*Sagittaria sagittifolia* L.).
- Шильнякъ, см. Дрокъ красильный (*Genista tinctoria* L.).
- Шильца, см. Тростникъ обыкновенный (*Arundo Phragmites* L.).
- Шинникъ, см. Купена лекарственная (*Convallaria Polygonatum* L.).
- Шипецъ } см. Шиповникъ (*Rosa canina* L.).
- Шипижка }
- Шипижникъ, см. Ююба (*Ziziphus vulgaris* L.).
- Шипица }
- Шипичка } см. Шиповникъ (*Rosa canina* L.).
- Шипичникъ }
- Шипичникъ, см. Ююба (*Ziziphus vulgaris* L.).
- Шипишникъ, см. Шиповникъ (*Rosa canina* L.).
- Шипишникъ, см. Ландышъ майскій (*Convallaria majalis* L.).
- Шипишнякъ } см. Шиповникъ (*Rosa canina* L.).
- Шипнякъ }
- Шиповникъ, см. Ландышъ майскій (*Convallaria majalis* L.).
- Шиповникъ (*Rosa canina* L.). Гуляфъ (Астр.), Крыжовникъ дикій (Калуж.), Овсянникъ (Смол.). Пикудникъ (въ нѣк. мѣст. Тверск. губ.), Рожа полевая, косматая или косматка собачья, а по слав. Гордовина трава, Рожа (Херс.), Роза дикая, Сворборина, Сворборинное дерево, Сворборина, Серебаринникъ, Серебаринъ, Серборинникъ, Серберинникъ (Твер.), Серболянина (Твер.), Сербаринникъ (Кал.), Сирбаринникъ (Ряз.), Сербелина, Сербалина (Вор., Кал.), Серболина, Сереболина (Курск.) и изм. Чербалинникъ (Ворон.), Толокняникъ, Толокнянка, Тривьянца (Курск.), Троянда (Малор.), Розовый цвѣтъ, Шиповный цвѣтъ (Вятск.), Чипорасъ (Новг.), Шомширъ (Пег. губ. Луга), Шепишнякъ (Арх.), Шипичникъ (Твер. и др.), Шипишникъ (Арх., Вол.), Шипишнякъ, Шипнякъ (Сиб., Арх., Волог.), Шипажка, Шипичка (Перм., Сиб.), Шипецъ, Шипица (Перм.), Шипынякъ (Олонец.), Шипушникъ (Твер.), Шипишна (Малор., Бѣлор.), Шышина (Умань), Ш(и)пишникъ, Шюпина (Малор.), Шуплина, Шуплица (Кіев.), Ягоды шиповны. Кустарникъ выш. 1—2½ сажень изъ семейства «розовцвѣтныхъ», (*Rosaceae* Hook et Benth.), распространенный почти во всей Европѣ, въ западной, средней и южной Россіи и въ Сибири, съ крѣпко-серповидными, при

основаніи расширенными и сплюснутыми шипами. Листья сложные, непарно-перистые, о 5—7 эллиптических или яйцевидныхъ, остро-пильчатыхъ листочкахъ; верхніе зубчики листочковъ сходящіеся (загнутые на верхушкѣ листочка). Цвѣты розовые, рѣже бѣлые, правильные. Чашечка простая о 5 чашелистикахъ; лепестковъ 5; многочисленныя тычинки прикрѣплены къ краямъ кувшинчатаго цвѣтоложа, на днѣ котораго сидятъ многочисленные односѣмянныя плодники съ длинными столбиками. Плодъ красный, ягодообразный, состоитъ изъ сѣмянокъ, заключенныхъ въ мясистомъ цвѣтоложѣ. Цвѣтетъ въ май и въ іюнѣ. Растетъ между кустарниками, по холмамъ и въ степяхъ.

**МЕДИЦИНСКОЕ УПОТРЕБЛЕНІЕ.** Плоды шиповника имѣютъ применение только, какъ домашнее средство. Ихъ собираютъ позднюю осенью и даже лучше послѣ перваго мороза, потому что тогда они мягче и вкусъ ихъ слаще: высушенныя ягоды берегаются въ хорошо закупоренныхъ банкахъ.

Ягоды шиповника считаются вяжущимъ средствомъ, отваръ изъ нихъ пьютъ отъ поноса и женскихъ болѣзней. Въ Россіи въ народной медицинѣ декоктъ изъ корня шиповника считается средствомъ, помогающимъ отъ расстройства отравленій печени и селезенки, произошедшихъ отъ долго длившейся лихорадки.

**Шиповный цвѣтъ** } см. Шиповникъ (*Rosa canina* L.).

**Шипокъ**

**Шипухи поносныя**, см. Горечавка кружная (*Gentiana Pneumopanthé* L.).

**Шипушникъ**

**Шипшина**

**Шипшинникъ**

**Шипышвякъ**

**Ширка**, см. Василетникъ желтый (*Thalictrum flavum* L.).

**Широкая голова**, см. Купальница европейская (*Trollius europaeus* L.).

**Широколистница**, см. Норичникъ узловатый (*Scrofularia nodosa* L.).

**Шифлоръ**, см. Сафлоръ красильный (*Carthamus tinctorius* L.).

**Шишатникъ**, см. Чертополохъ полевой (*Cirsium arvense* L.).

**Шишебарникъ**, см. Колокольчикъ сборный (*Campanula glomerata* L.).

**Шисечки**, см. Кровохлебка лекарственная (*Sanguisorba officinalis* L.).

**Шисечки**, см. Клеверъ темноцвѣтный (*Trifolium spadiceum* L.).

**Шисечки болотныя**, см. Уруть колосистый (*Myriophyllum spicatum* L.).

**Шишибара**

**Шишибарникъ** } см. Чертополохъ поникшій (*Carduus nutans* L.).

**Шиска винная**, см. Мята полевая (*Mentha arvensis* L.).

**Шискарикъ**, см. Василекъ перистый (*Centaurea Scabiosa* L.).

**Шискачъ**, см. Очитокъ острый (*Sedum Telephium* L.).

- Шишки, см. Мушмула обыкновенная (*Mespilus germanica* L.).  
 Шишки, см. Вшивица хохлатая (*Pedicularis comosa* L.).  
 Шишки, см. Кулальница европейская (*Trollius europaeus* L.).  
 Шишки ворсевальныя, см. Ворсянка красильная (*Dipsacus Fullonum* Mill.).  
 Шишки липучія, см. Лопушникъ большой (*Lappa major* Gärtn.).  
 Шишки раковыя, см. Плакунъ-трава (*Lythrum Salicaria* L.).  
 Шишковникъ, см. Кирказонъ обыкновенный (*Aristolochia Clematidis* L.).  
 Шишковникъ } см. Мушмула обыкновенная (*Mespilus*  
 Шишковое дерево } *germanica* L.).  
 Шишобаръ, см. Лопушникъ большой (*Lappa major* Gärtn.).  
 Шкабіоза, см. Короставникъ полевой (*Scabiosa arvensis* L.).  
 Шкерда, см. Цикорий обыкновенный (*Cichorium Intybus* L.).  
 Шламда, см. Медунца (*Spiraea ulmaria* L.).  
 Шлемникъ копьевидный (*Scutellaria hastifolia* L.). Акулька (Хар.), Чебрець простой. Многолѣтнее травянистое растение изъ семейства «губоцвѣтныхъ» (*Labiatae* Juss.), распространенное почти во всей Европѣ, въ южной и юго-западной Россіи, рѣдко встрѣчается сѣвернѣе. Стебель невѣтвистый, тонкій и слабый, какъ и листья, почти голый. Листья коротко-черешковые, продолговато-ланцетные, при основаніи тупые съ 1—2 зубцами; голубые, снизу блѣловатыя цвѣты находятся въ углахъ, къверху уменьшающихся листьевъ и сближены одностороннею не длиною кистью на концѣ стебля. Прочее,—какъ у «шлемника обыкновеннаго» (см. см. ниже.)

**МЕДИЦИНСКОЕ УПОТРЕБЛЕНІЕ.** Шлемникъ копьевидный употребляется въ народѣ отъ колтуна.

**Шлемникъ обыкновенный** (*Scutellaria galericulata* L.). Фармацевтическое назв.: *Tortianaria* v. *Trientalis* (Herba). Бабка (Курск.), Звѣробой полевой (Вятск.), Мариновка (Екат.), Расходникъ (Екат.), Маточникъ (Вор.), Сердечная-трава (Вят.), Синій цвѣтъ (Екат.). Многолѣтнее травянистое растение изъ семейства «губоцвѣтныхъ» (*Labiatae* Juss.), распространенное почти по всей Россіи. Стебель прямостоящій, вѣтвистый, выш. 3½—11½ вершк. Листья продолговато-ланцетные, при основаніи сердцевидные, по краямъ городчатые. Лазуревые или фіолетовые цвѣты сидятъ по 2 въ углахъ листьевъ. Чашечка двугубая, на спинкѣ съ чешуевидными, полымъ внутри, отросткомъ, коротко-пушистая; вѣнчикъ съ длиною, спереди расширенною трубкою и двугубымъ отгибомъ, верхняя губа его вогнутая, почти шлемовидная, а въ серединѣ выемчатая, 2-хлопастная при основаніи; нижняя губа цѣльная. Тычинокъ 4; завязь верхняя 4-хлопастная, 4-гнѣздная. Плодъ по созрѣваніи распадается на 4 почти шаровидныхъ мелко бугорчатыхъ орѣшка. Цвѣтетъ лѣтомъ. Растетъ на влажныхъ мѣстахъ, по берегамъ рѣкъ и прудовъ и по канавамъ.

Прежде растение употреблялось отъ лихорадки, теперь оставлено.

- Шлясь, см. Просвирникъ курчавый (*Malva crispa* L.).  
 Шмерка, см. Пихта европейская (*Abies pectinata* Lond.).  
 Шнитка, см. Сныть обыкновенная (*Aegopodium Podagraria* L.).  
 Шнитлукъ, см. Рѣзанецъ (*Allium Schoenoprasum* L.).  
 Шнить, см. Сныть обыкновен. (*Aegopodium Podagraria* L.).  
 Шовкова трава, см. Тростникъ канареечный (*Phalaris arundinacea* L.).  
 Шовкова трава, см. Ковыль перистый (*Stipa pennata* L.).  
 Шовковица  
 Шовковица бѣлая } см. Тутовое дерево, шелковица бѣлая (*Morus alba* L.).  
 Шовкунъ }  
 Шолковица  
 Шолкотуха, см. Хлопушка (*Silene inflata* Smith.).  
 Шолудивникъ, см. Вшивица хохлатая (*Pedicularis comosa* L.).  
 Шомпольникъ, см. Кизильникъ обыкновенный (*Cotoneaster vulgaris* Lindl.).  
 Шора, см. Норичникъ узловатый (*Scrofularia nodosa* L.).  
 Шоркунцы, см. Хлопушка (*Silene inflata* Smith.).  
 Шпажная трава } см. Шпажникъ обыкновенный (*Gladiolus communis* L.).  
 Шпажникъ }  
 Шпажникъ, см. Шпажникъ черепичатый (*Gladiolus imbricatus* L.).  
 Шпажникъ обыкновенный (*Gladiolus communis* L.). Фармацевтическое названіе: *Victorialis rotunda* (Radix). Зрядникъ (Черн.), Зрядникъ (Кіевск.), Зрочникъ (Гродн.), Косарикъ (Екат.), Кочетки (Курск.), Медучки (Балта), Мечникъ трава. Многолѣтнее травянистое растеніе изъ семейства «касатиковыхъ» (*Iridaceae* Juss.), распространенное въ южной Европѣ, въ Крыму и на Кавказѣ, выш. 11½—18 вершк.; клубень покрытъ волокнистой оболочкой (листовыя влагалища). Листья линейно-ланцетные, короче стебля. Крупные пурпуровые цвѣты собраны однобочнымъ колосомъ. Околоцвѣтникъ неправильный, почти двугубый. Тычинокъ 3; завязь нижняя 3-гнѣздная, съ нитевиднымъ столбикомъ и 3-мя ланцетовидными рыльцами. Плодъ—овальная свѣрху 3-хгранная съ острыми ребрами коробочка. Цвѣтетъ въ маѣ и въ іюнѣ. Растетъ на лугахъ и въ лѣсахъ. (Табл. I, фиг. 284).

**МЕДИЦИНСКОЕ УПОТРЕБЛЕНІЕ.** Въ народѣ отваръ травы шпажника обыкновеннаго пьютъ кормящія женщины, у которыхъ мало молока.

**Шпажникъ черепичатый** (*Gladiolus imbricatus* L.). Сняла вода (Волинск.), Дробивка (Волинск.), Дзвонокъ (Волинск.), Зрядникъ (Мал.), Кульчиберъ (Гродн.), Лукъ дикій, Котья цибулька (Вил.), Дикій чеснокъ (Волинск.), Чеснокъ полевой (Вит.), Овсянка (Орл.), Пивоникъ (Харьк.), Пітушки красні (Малор.), Ризецъ (Вол.), Сипѣлка (Екат.), Шпажникъ (Могил.). Многолѣтнее травянистое растеніе изъ семейства «касатиковыхъ» (*Iridaceae* Juss.), распространенное въ западной и средней Россіи и на Кавказѣ; весьма походитъ на предыдущій видъ «шпажникъ обыкновен-

ный» (*Gladiolus communis* L.), описаніе см. выше, отъ котораго отличается болѣе мелкими (вдвое) цвѣтами и обратно-яйцевидной, тупо-3-хгранной, сверху вдавленной коробочкой.

**МЕДИЦИННОЕ УПОТРЕБЛЕНІЕ.** Въ Вятской губерніи корень растенія употребляютъ отъ зубной боли.

**Шпарагы**, см. Спаржа обыкновенная (*Asparagus officinalis* L.).

**Шпарышъ**, см. Гречиха-спорышъ (*Polygonum aviculare* L.).

**Шпергель**, см. Торица полевая (*Spergula arvensis* L.).

**Шпинатъ**, см. Спаржа обыкновенная (*Asparagus officinalis* L.).

**Шпинатъ**, см. Шпинатъ огородный (*Spinacia oleracea* Mill.).

**Шпинатъ американскій**, см. Ягода чечевичная (*Phytolacca decandra* L.).

**Шпинатъ индѣйскій**, см. Американскій шпинатъ (*Basella alba* L.).

**Шпинатъ огородный** (*Spinacia oleracea* Mill.). Двудомная однолѣтняя и двулѣтняя трава, родомъ съ Востока, изъ семейства «маревыхъ» (*Chenopodiaceae* Vent.). Стебель прямостоящій, выш. 7—22 вершк. Листья черешковые, треугольно-копьевидные, цѣльнокрайніе или зубчатые. Цвѣты липкіе, зеленые, собранные клубочками въ углахъ листьевъ. Околоцвѣтникъ травянистый, 5-тираздѣльный; тычинокъ 5; завязь одногнѣздная, съ однимъ яичкомъ и съ 2-мя столбиками. Плодъ заключенъ въ отвердѣвшій околоцвѣтникъ. Цвѣтетъ лѣтомъ. Всюду разводится на огородахъ, какъ овощъ. (Рис. 332.)

**МЕДИЦИННОЕ УПОТРЕБЛЕНІЕ.** Шпинатъ считается очень полезною пищею отъ общей нервности, малокровія и запоровъ, потому и прописывается врачами больнымъ, какъ лекарство, ежедневное употребленіе соуса изъ шпината, въ особенности въ лѣтнее время.

**Шпорышъ**, см. Гречиха-спорышъ (*Polygonum aviculare* L.).

**Шпорцвѣтникъ красный** (*Centranthus ruber* Dc.). Валериана красная. Многолѣтнее травянистое растеніе изъ семейства «валериановыхъ» (*Valerianaceae* Dc.), распространенное въ южной Европѣ, выш. 11½ вершк. Листья цѣльные, округло-яйцевидные или ланцетные. Цвѣты красные, мелкіе, въ полузонтикахъ. Вѣнчикъ спайнолепестный, съ шпорцемъ; тычинка 1. Завязь нижняя 3-гнѣздная; плодъ сухой, одноствянный. (Табл. I. фиг. 283.)

**Шпоры кавалерскіе**, см. Васильки рогаые (*Delphinium consolida* L.).

**Шпорышъ**, см. Гречиха-спорышъ (*Polygonum aviculare* L.).

**Штанодранъ**, см. Азалея желтая (*Azalea pontica* L.).

**Штонунъ-трава**, см. Дягиль лѣсной (*Angelica silvestris* L.).

**Шумира**, см. Гайникъ широколистный (*Epipactis latifolia* L.).

**Шушина**  
**Шулица**  
**Шупшина** } см. Шповникъ (*Posa canina* L.).

**Шущия**, см. Подмаренникъ сѣверный (*Galium boreale* L.).

**Шуя**, см. Ростеръ ржаной (*Bromus secalinus* L.).

**Шполкунецъ**, см. Хлопушка (*Silene inflata* Smith.).

**Шышьяна** } см. Шиповникъ (*Rosa canina* L.).

**Шюпшина** }

**Шырець**, см. Амарантъ метельчатый (*Amaranthus paniculatus* L.).

### Ш.

**Щабѣръ**, см. Верескъ обыкновенный (*Calluna vulgaris* Salisb.).

**Щавей воробѣвъ** } см. Щавель малый (*Rumex Acetosella* L.).

**Щавей малый**

**Щавелекъ**, см. Щавель малый (*Rumex Acetosella* L.).

**Щавель** } см. Щавель обыкновенный, или кислый (*Rumex Ace-*

**Щавель** } *tosa* L.).

**Щавель**, см. Щавель малый (*Rumex Acetosella* L.).

**Щавель**, см. Щавель конскій, или домашній (*Rumex domesti-*

**Щавель** } *cus* L.).

**Щавель благовонный**, см. Кислица обыкновенная (*Oxalis Ace-*

**Щавель** } *tosella* L.).

**Щавель водяной**, см. Щавель рѣчной (*Rumex Hydrolapathum*

**Щавель** } Huds.).

**Щавель водяной** (*Rumex aquaticus* L.). Фармацевтическое назв. въ Сѣверной Америкѣ: *Rumex Britannicae* s. *Lapathum aquaticum*, s. *Hydrolapathum* (*Radix et Herba*). Горлець, Грыжная трава (Сл. Церк.), Змеевикъ, Одолѣвъ водяной. Многолѣтнее травянистое растение изъ семейства «гречишныхъ» (*Poligonaceae* Juss.), распространенное въ сѣверной и средней Европѣ и почти во всей Россіи. Стебель выш. до 1 саж. Листья очередные: нижніе—сердцевидно-лицевидные, неравнобѣрно-городчатые или почти цѣльнокрайніе, на верхушкѣ острые, при основаніи расширенныя; верхніе листья—ланцетные. Черешки сверху желобчатые. Мелкіе обоеполовые зеленые цвѣты въ пучкахъ, образующихъ крѣпкую, до 5 вершк. длинн. метелку, почти безлистную. Околоцвѣтникъ 6-тираздѣльный, съ 3-мя наружными и 3-мя внутренними лицевидно-сердцевидными, цѣльнокрайними или слегка зубчатыми долями. Тычинокъ 6; завязь одногнѣздная, съ однимъ яичкомъ и 3-мя нитевидными столбиками съ кистистыми рыльцами. Плодъ—трехгранная сѣмянка, заключенная между разросшимися долями околоцвѣтника. Цвѣтетъ въ іюль и августъ. Растетъ на болотистыхъ лугахъ, по берегамъ рѣкъ и прудовъ. (Р и с. 333.)

**МЕДИЦИННОЕ УПОТРЕБЛЕНІЕ.** Растеніе обладаетъ сильно вяжущими свойствами. Употребленіе его извѣстно только въ домашнемъ быту и въ народной медицинѣ. Корни собираютъ весной и осенью, обмываютъ, разрѣзываютъ и высушиваютъ въ легкомъ теплѣ. Корни растенія или прежде въ составъ такъ наз. кровеочищающаго чая. Стваръ корней и настойка употребляются для обмыванія кожи отъ различныхъ болѣзней. Свежий выжатый сокъ въ количествѣ 20—60—90 грам. (1—2—3 унц.) принимается съ



бульономъ при такъ наз. весеннемъ леченіи; иногда соѣтъ щавеля смѣшиваютъ съ сѣками другихъ растений.

Въ ветеринарной медицинѣ щавель водяной употребляется, какъ хорошо дѣйствующее укрѣпляющее средство, при слабости и плохой дѣятельности кишечнаго канала и отъ застарѣлаго кашля; отваромъ корня щавеля или свѣжеватымъ сокомъ обмываютъ животнымъ лишаи, засохшія корки и червивыя раны. Внутрь сушеный корень даютъ лошадямъ и рогатому скоту отъ 30 до 60 грам. (1—2 унцъ), овцамъ и свиньямъ 12—24 грам. (3 драхмъ до 6), собакамъ 2—6 грм. (1½ драхмы до 1½) 2—3 раза въ день. Свѣжаго сока дается въ три раза больше. Изъ сока приготавливаютъ лепешки и пилюли, въ отваръ прибавляютъ другія растенія, какъ-то: можжевельникъ и прірый корень. Для приготавленія обмываній берутъ 30 грам. (1 унцъ) сушенаго корня на 300 грам. (1 фунтъ) воды. Для приготавленія мази толченый корень смѣшиваютъ пополамъ со свинымъ саломъ. Для обмываній коросты и лишаевъ приготавливаютъ еще слѣдующую смѣсь: 4 щепотки нарѣзаннаго корня щавеля водяного, столько-же корня чистотѣла, 120 грам. квасцовъ (4 унца) и 2½ литра уксуса, все это вмѣстѣ кипятится въ теченіе 2½ час., затѣмъ жидкость процеживается. Эту жидкостью смазываютъ мѣста съ коростою или лишаи 5—6 разъ въ день.

Щавель воробьеѣвъ } см. Щавель малый (*Rumex Acetosella* L.).  
Щавель воробьиный }  
Щавель горобиный, см. Щавель курчавый (*Rumex crispus* L.).

Щавель горобьячій } см. Щавель малый (*Rumex Acetosella* L.).  
Щавель гусиный }

Щавель гусиный, см. Кислица обыкновен. (*Oxalis Acetosella* L.).

Щавель дикій (*Rumex obtusifolius* L. sin. *Rumex acutus*). Фармацевтическое назв.: *Lapathum acutum* s. *Oxylapathum* (Radix). Конечки (Тамб.), Конякъ (Ряз.), Конятникъ (Ряз.), Конюшина, Щавель человѣчій, Чистотѣль. Многолѣтнее травянистое растеніе изъ семейства «гречишныхъ» (*Polygonaceae* Juss.), распространенное почти во всей Европѣ и въ Россіи. Стебель обыкновенный, наверху вѣтвистый; листья супротивные, нижніе—сердцевидно-яйцевидные или продолговатые, тупые, верхніе—продолговато-ланцетные или ланцетные острые. Мелкіе зеленые обоюполовые цвѣты въ пучкахъ, нѣсколько отдаленныхъ другъ отъ друга, въ длинныхъ безлистныхъ или при основаніи облиственныхъ метелкахъ. Околоцвѣтникъ 6-тираздѣльный, съ 3-мя наружными и 3-мя внутренними продолговаго-треугольными, снабженными всѣ посерединѣ бугромъ, долями; тычинокъ 1; завязь однократная, съ однимъ яичкомъ и 3 столбиками, съ кистистыми рыльцами. Плодь—3-хгранная сѣмянка, заключенная между разросшимися долями околоцвѣтника. Цвѣтетъ въ іюлѣ и августѣ. Растетъ при дорогахъ, на лугахъ и въ рощахъ.

**МЕДИЦИННОЕ УПОТРЕБЛЕНІЕ.** Растеніе имѣетъ тѣ-же вяжущія свойства и употребляется, какъ и «щавель водяной». Сѣмена въ

народѣ считаются полезнымъ средствомъ отъ поноса, корни—отъ лихорадки и слабости пищеварительныхъ органовъ. Снаружи отварами обмываются мѣста, покрытыя сыпью и корками.

**Щавель дикий**, см. Щавель обыкновенный, или кислый (*Rumex Acetosa* L.).

**Щавель заячій**, см. Щавель малый (*Rumex Acetosella* L.).

**Щавель заячій**, см. Кислица обыкновенная (*Oxalis Acetosella* L.).

**Щавель кислый** см. Щавель обыкновенный (*Rumex Acetosa* L.).

**Щавель кобылій**, см. Макъ мексиканскій (*Argemone mexicana* L.).

**Щавель конскій, или домашній** (*Rumex domesticus* L.). Коновикъ (Вятск.), Грыжная, Злосчастная, Огневка (Арх.), Кислица коневая или конская, Щавель. Весьма походить на «щавель водяной» (опис. см. выше), отъ котораго отличается сверху плоскими черешками и листьями волнистыми или курчавыми, изъ которыхъ нижніе продолговатые или широко-ланцетные, съ округлымъ или слегка сердцевиднымъ основаніемъ, а верхніе—узко-ланцетные. Растетъ на сорныхъ мѣстахъ, около дорогъ и въ посявахъ.

**МЕДИЦИНСКОЕ УПОТРЕБЛЕНІЕ.** Въ Архангельской губ. отваръ конскаго щавеля пьютъ отъ грыжи, чесотки и горячки. Порошкомъ корня, смѣшаннымъ съ порошкомъ сушеныхъ цвѣтовъ, присыпаютъ сыпи.

**Щавель конскій**, см. Щавель обыкновенный (*Rumex Acetosella* L.).

**Щавель курчавый** (*Rumex crispus* L.). Фарм. названіе: *Rad. Lapathi crispi*. Щавель горобиній, Конюшина, Огневка, Чистотѣль (Волог., Перм.). Многолѣтнее травянистое растеніе изъ семейства «гречишныхъ» (*Polygonaceae* Juss.), распространенное во всей Европѣ и во всей Россіи. Стебель выш. 14—22½ верш. Листья супротивные, ланцетные, острые, по краямъ курчавые; нижніе—при основаніи тупые или слегка сердцевидные. Многочисленные пучки красновато-зеленыхъ мелкихъ цвѣтовъ снабжены кистями, собранными длинною, узкою метелкой. Околоцвѣтникъ состоитъ изъ 3-хъ наружныхъ и 3-хъ внутреннихъ, округло-яйцевидныхъ, цѣльно-крайнихъ или слегка зубчатыхъ долей, изъ которыхъ или только одна, или всѣ съ буграми посерединѣ. Тычинокъ 6; завязь одногнѣздная, съ однимъ яичкомъ, съ 3-мя столбиками и кистистыми рыльцами. Плодъ—3-хгранныя сѣмянка, заключенная между разросшимися долями околоцвѣтника. Цвѣтетъ лѣтомъ. Произрастаетъ на дугахъ, сорныхъ мѣстахъ, около дорогъ и въ посявахъ. (Рис. 334.)

**МЕДИЦИНСКОЕ УПОТРЕБЛЕНІЕ.** Этотъ видъ щавеля, какъ и всѣ другіе, принадлежитъ къ народнымъ средствамъ. Въ Архангельской губерніи отваръ щавеля курчаваго пьютъ отъ грыжи, чесотки и горячки. Порошкомъ корня, смѣшаннымъ съ его-же цвѣтами, присыпаютъ сыпи.

**Щавель луговой**, см. Щавель обыкновенный, или кислый (*Rumex Acetosa* L.).

**Щавель малый** (*Rumex Acetosella* L.). Щавель воробьевъ, Волосатикъ (Вятск.), Воробьятникъ (Кал.), Щавель воробьиный (въ бол. ч. Россіи), Щавель горобячій, Квасецъ горобинный (Полт.), Дидиль (Вятск.), Дидель, Заячья капуста, Воробьиное сѣмя (Нижегор.), Воробьева кислота (Вятск.), Квасецъ (Малор.), Киселка, Кисленка (Вятск.), Кивичная (Олон.), Кислуха (Новг.), Кислица-трава, Кислица щавельная, Красная трава (Перм.). Пустошная, Пикана, Соломоничка (Пст., Новг.), Шавей малый, Щавель, Щавель сорочій (Полт.), полевой (Вятск.), гусиный, заячій или мелкій, овечій (Черн.), насыкй (Малор.), Шавелекъ (Моск.), Шавникъ (Подол.), Шавлюкъ (Курск.), Шавлюкъ полевой (Могил.), Шшавель (Вор.). Прямостоящая или приподнимающаяся травка, вып. до  $5\frac{1}{2}$  верш., часто съ красноватымъ стѣбкомъ, изъ семейства «гречишныхъ» (*Polygonaceae* Juss.), распространенная почти во всей Европѣ и весьма обыкновенная въ Россіи. Листья супротивные, концевидные, узко-ланцетные, съ основными лопастями, направленными вбокъ. Раструбъ бахромчато-надрѣзанный (прилистники срослись въ трубочку). Цвѣты мелкіе, двудомные, собраны верхушечной метелкой. Околоцвѣтникъ состоитъ изъ 3-хъ наружныхъ и 3-хъ внутреннихъ долей; тычинокъ 6; завязь одногнѣздная, съ 1-мъ яичкомъ и 3-мя нитевидными столбиками съ кистистыми рыльцами. Плодъ — сѣмянка, заключенная въ разросшіеся доляхъ околоцвѣтника. Цвѣтеть лѣтомъ. Растетъ на песчаныхъ мѣстахъ, лугахъ, паровыхъ поляхъ и въ степяхъ.

**МЕДИЦИНСКОЕ УПОТРЕБЛЕНІЕ.** Въ Пермской губ. отваръ растенія считается полезнымъ отъ кровотеченій у женщинъ. Также его употребляютъ отъ задержки мочи, ломоты въ костяхъ и отъ поноса у дѣтей.

**Щавель мелкій**, см. Щавель обыкновенный, или кислый (*Rumex Acetosa* L.).

**Щавель морской** (*Rumex maritimus* L.). Однолѣтнее травянистое растеніе изъ семейства «гречишныхъ» (*Polygonaceae* Juss.), распространенное въ средней Европѣ и почти во всей Россіи. Стебель вѣтвистый, вып.  $3\frac{1}{2}$ —12 вершк. Листья супротивные, узколанцетные или линейные, суженные въ черешокъ; самые нижніе дл. до  $5\frac{1}{2}$  вершк. Цвѣты мелкіе, очень многочисленные, въ сближенныхъ шаровидныхъ пазушныхъ пучкахъ, образующихъ метельчатое, сверху одностебельное соцвѣтіе. Околоцвѣтникъ состоитъ изъ 3-хъ наружныхъ и 3-хъ внутреннихъ долей; послѣднія продолговато-ромбическія, съ бугромъ, по краямъ съ длинными, тонкими зубцами. Тычинокъ 6; завязь одлогнѣздная, съ 1-мъ яичкомъ и съ 3-мя нитевидными столбиками, съ кистистыми рыльцами. Плодъ — сѣмянка, заключенная между разросшимися долями околоцвѣтника. Все растеніе (особенно цвѣты) часто принимаетъ ярко-желтую окраску. Цвѣтеть лѣтомъ. Произрастаетъ на болотистыхъ мѣстахъ, по берегамъ морей, рѣкъ и прудовъ. (Рис. 335.)

**Щавель насыкй** } см. Щавель малый (*Rumex Acetosella* L.).  
**Щавель овечій** }

**Щавель овецій**, см. Жеруха болотная (*Nasturtium palustre* DC.).  
**Щавель обыкновенный**, или кислый (*Rumex Acetosa* L.). Фарм. назв.: *Acetosa officinalis* s. *pratensis*, s. *nostras* (Rad., Herba et Semina). Былка (Кал.), Квасецъ (Волын.), Кислица (въ б. ч. Вост. Россіи) и изм. Кислинка, Киследь (Оренб.), Кислица (Арх.), Кисленца (Вит.), Кислядка (Оренб., Перм.), Кислянка (Томск.), Кислуха (Новг., Тихв., Ят.), Кислушка, Кислушки (Арх., Волог.), Кислецъ (Волог.), Киселька, Кислинка (Пск.), Кислядь (Орл.), Шлетка (Вятск.), Пучки (Арх.), Столбвики (Костр.), Столбунцы (Влад.), Щавъ (Стар. Рус.), Щавель (б. ч. Россіи), Щавель наскій (Малор.), кислый, конскій, полевой, луговой, мелкій, дикій, русскій (въ разн.), Щевель (Кал.), Щавель (Тамб.), Щовель (Пенз.), Щавникъ (Гродн.), Щавнокъ (Волын.), Чувель (Тамб.), Чистотѣль (Арх.). Многолѣтнее травянистое растение изъ семейства «гречишныхъ» (*Polygonaceae* Juss.), распространенное почти во всей Европѣ и во всей Россіи. Стебель выш. 7—14 вершк., слабобѣтвистый. Листья супротивные, концевидные или стрѣловидные, съ широкими внизъ направленными основными лопастями. Кислые на вкусъ; раструбъ (перепончатые прилистники, сросшіеся въ трубочку, обхватывающую стебель) бахромчато-надрѣзной. Цвѣты мелкіе, двудомные, зеленые или красноватые, въ пучкахъ, сближенныхъ кистями, образующими метельчатое соцвѣтіе. Околоцвѣтникъ 6-тираздѣльный, съ 3-мя наружными и 3-мя внутренними долями. Тычинокъ 6; завязь одногнѣздная, съ 1-мъ яичкомъ и 3-мя нитевидными столбиками съ кистевидными рыльцами. Плодъ—3-гранная сѣмянка, заключенная между разросшимися долями околоцвѣтника. Цвѣтетъ въ маѣ и въ юнѣ. Произрастаетъ на лугахъ и опушкѣ лѣсовъ. Разводится на огородахъ, какъ шпинатное растение. (Табл. I, фиг. 23.).

**Медицинское употребленіе** Щавель обыкновенный имѣетъ тѣ-же вкушныя свойства, какъ и предыдущіе виды, и употребляется, главнымъ образомъ, въ пищу.

**Щавель полевой**, см. Щавель малый (*Rumex Acetosella* L.).

**Щавель полевой** } см. Щавель обыкновенный (*Rumex Acetosa*

**Щавель русскій** } L.).

**Щавель рѣчной** (*Rumex Hydrolapathum* Huds.). Фарм. назв.: *Rumex acutus* (Rad. et Hb.). Воронья пучки (Арх.), Кобылякъ, Лошадникъ (Пск., Твер.), Кобылій щецъ (на Иртышѣ), Конскій себѣчъ, Щавель водяной. Многолѣтнее травянистое растение изъ семейства «гречишныхъ» (*Polygonaceae* Juss.), распространенное въ сѣверной и средней Европѣ, въ средней и западной Россіи. Стебель выш. отъ 1½ арш. до 1 сажени, бороздчатый, слабобѣтвистый. Листья супротивные, ланцетные, острые, при основаніи суженные въ черешокъ, по краямъ слегка волнистые; самые нижніе дл. 5—9 вершк. Черешки сверху плоскіе. Мелкіе зеленоватые двудомные цвѣты образуютъ длинную, пустую метелку. Околоцвѣтникъ раздѣльный, пѣзъ 3-хъ наружныхъ и 3-хъ внутреннихъ яйцевидно-треугольныхъ долей, послѣднія всѣ съ бугромъ. Тычинокъ 6; завязь одногнѣздная, съ 1-мъ яичкомъ,

съ 3-мя питевидными столбиками съ листовидными рыльцами. Плодь — 3-хгранная сѣмянкa. Цвѣтеть въ юль и августъ. Растетъ на бологахъ по берегамъ рѣкъ и ручьевъ. (Рис. 336).

**МЕДИЦИНОНОЕ УПОТРЕБЛЕНІЕ.** Сѣмена этого вида щавеля на-  
стаиваются на водкѣ и принимаются отъ перемежающейся лихо-  
радки.

**Щавель свиной, см.** Чертополохъ ланцетолистный (*Cirsium lan-*  
*-ceolatum* Scop.).

**Щавель сорочій, см.** Щавель малый (*Rumex Acetosella* L.).

**Щавель троицкій, см.** Кислица обыкновенная (*Oxalis Aceto-*  
*sella* L.).

**Щавель человѣчій, см.** Щавель конскій или домашній (*Rumex*  
*domesticus* L.).

**Щавлюкъ** } см. Щавель малый (*Rumex Acetosella* L.).

**Щавникъ** }  
**Щавникъ** } см. Щавель обыкновенный (*Rumex Acetosa* L.).

**Щавнокъ** }  
**Щавухъ заячій, см.** Кислица обыкновенная (*Oxalis Aceto-*  
*sella* L.).

**Щавъ, см.** Щавель обыкновенный, или кислый (*Rumex Acetosa* L.).

**Щебелюкъ, см.** Прищинецъ (*Ranunculus Flammula* L.).

**Щевелюкъ - трава, см.** Вахта трилистная (*Menyanthes tri-*  
*foliata* L.).

**Щеберъ, см.** Чаберъ садовый (*Satureja hortensis* L.).

**Щебрецъ, см.** Богородская трава (*Thymus Serpyllum* L.).

**Щелкуна, см.** Чернокорень обыкновенный (*Cynoglossum offic-*  
*inale* L.).

**Щелкунецъ, см.** Чистотѣль большой (*Chelidonium majus* L.).

**Щелкунецъ, см.** Иванъ-чай (*Epilobium angustifolium* L.).

**Щелкунецъ, см.** Хлопушка (*Silene inflata* Smith.).

**Щелкунецъ, см.** Чистецъ болотный (*Stachys palustris* L.).

**Щелкунецъ большой** } см. Хлопушка (*Silene inflata* Smith.).

**Щелкунцы** }  
**Щелкунъ, см.** Чернокорень обыкновенный (*Cynoglossum offic-*  
*inale* L.).

**Щелкунъ, см.** Пикульникъ длинноцвѣтный (*Galeopsis Lada-*  
*num* L.).

**Щелкунъ, см.** Порремокъ обыкнов. (*Rhinanthus Crista Galli* L.).

**Щелкунъ, см.** Хлопушка (*Silene inflata* Smith.).

**Щелкунъ, см.** Василѣтникъ желтый (*Thalictrum flavum* L.).

**Щелкуны, см.** Чернокорень обыкн. (*Cynoglossum officinale* L.).

**Щелкуха, см.** Чернокорень обыкнов. (*Cynoglossum officinale* L.).

**Щелкушечная трава, см.** Хлопушка (*Silene inflata* Smith.).

**Щелкушникъ, см.** Гравилатъ водяной (*Geum rivale* L.).

**Щелчокъ, см.** Ленъ дикий (*Linaria vulgaris* Mill.).

**Щемелина** } см. Лещица лекарственная (*Pulmonaria offic-*  
**Щемелица** } *inalis* L.).

**Щена, см.** Истокъ холматый (*Polygala comosa* L.).

**Щенельнякъ, см.** Медовникъ (*Galeopsis Tetrahit* L.).

- Щепету́ха, см. Кунальница европейская (*Trollius europaeus* L.).
- Щербо́в, см. Репяшокъ обыкновенный (*Agrimonia Eupatorium* L.).
- Щербакъ, см. Цикорій обыкновенный (*Cichorium Intybus* L.).
- Щередникъ, см. Череда трехраздѣльная (*Ridens tripartita* L.).
- Щерица, см. Амарантъ колосистый (*Amaranthus retroflexus* L.).
- Щерыца, см. Амарантъ метельчатый (*Amaranthus paniculatus* L.).
- Щетина, см. Овсяница овечья (*Festuca elatior* L.).
- Щетина са́нная, см. Бѣлоусъ обыкновенный (*Nardus stricta* L.).
- Щетинникъ зеленый́ (*Setaria viridis* Beauv.) Боръ зеленый, Боръ полевой, Брица (Курск.), Колосьянка, Колоска (Уф.). Липучка (Ставр.), Мышей (Курск.), Мишей, Мишій (Малор.) Мышій, Мѣшей (Могил.), Мушій (Под.), Мышья трава, Прослика, Просьянка, Плоскуша, Прадз, Чаполочъ (Полт.), Щетинникъ. Однолѣтнее травянистое растение изъ семейства «злаковыхъ» (*Gramineae* Juss.), распространенное въ южной и средней Европѣ, почти по всей Россіи, въ Сибири и Туркестанѣ. Стебель прямой, подъ соцветіемъ шероховатый, развѣтвленный, съ зелеными широколинейными шероховатыми листьями. Колоски овальные, окруженные зазубренными щетинками, въ 2—3 раза длинѣ колосковъ, образующихъ густое цилиндрическое зеленое, иногда темное фиолетовое, соцветіе. Околоцветникъ состоитъ изъ 2-хъ чешуй; тычинокъ 3; столбиковъ 2, несущихъ перистыя рыльца. Плодъ—зерновка. Цвѣтетъ во второй половинѣ лѣта. Растетъ на поляхъ и на сорныхъ мѣстахъ.
- Щетинникъ сизый́ (*Setaria glauca* Beauv.) Брица, Брица (Малор.), Мышей, Мышій, Мишей (Малор.), Мишея (Полт.), Мушій (Вол., Пол.), Мѣшей, Мышинный хвостикъ (Подол.), Плоскуша, Просьянка, Чижики, Чижевникъ. Отличается отъ щетинника зеленого (опис. см. выше) голубовато-зелеными листьями; стебель подъ соцветіемъ гладкій. Соцветіе желтоватое или оливково-бурое. Тяжелая сорная трава въ огородахъ и на яровыхъ поляхъ на югѣ.
- Щетинникъ трава, см. Щетинникъ зеленый́ (*Setaria viridis* Beauv.).
- Щетинница, см. Бѣлоусъ обыкновенный (*Nardus stricta* L.).
- Щетка, см. Ворсянка сукновальная (*Dipsacus Fullonum* Mill.).
- Щетка, см. Овсяница овечья (*Festuca ovina* L.).
- Щетовникъ, см. Ястребинка зонтичная (*Hieracium umbellatum* L.).
- Щеть, см. Хвощъ зимній (*Equisetum hiemale* L.).
- Щеть, см. Хвощъ зимній (*Equisetum hiemale* L.).
- Щеть, см. Бѣлоусъ обыкновенный (*Nardus stricta* L.).
- Щецъ, см. Облѣпиха обыкновенная (*Hippophaë rhamnoides* L.).
- Щецъ кобылій, см. Щавель рѣчной (*Rumex Hydrolapathum* Huds.).
- Щиковщикъ, см. Киреазонъ обыкновенный (*Aristolochia Clematidis* L.).
- Щипальникъ, см. Желтуха (*Senecio jacobea* L.).
- Щиперъ, см. Лютикъ ядовитый (*Ranunculus sceleratus* L.).

**Щипецъ**, см. Овсяница овечья (*Festuca ovina* L.).

**Щирей**, см. Амарантъ колосистый (*Amarantus retroflexus* L.).

**Щирей, или амарантъ обыкновенный** (*Amarantus Blitum* L.)  
 Фармацевтическое названіе: *Blitum album*. Жминда, Зминда, Бросовая или негодная трава, Илодь-трава, Щирца (Малор.), Ярмусъ. Однолѣтнее травянистое растеніе изъ семейства «амарантовыхъ» (*Amarantaceae* R. Br.), распространенное въ средней Европѣ, въ средней и южной Россіи. Стебель выш. отъ  $3\frac{1}{2}$ —7 вершк., голый, развѣтвленный, съ растопыренными и приподнимающимися вѣтвями. Листья яйцевидно-ромбическіе, тупые, выемчатые. Цвѣты зеленые, въ пазушныхъ клубочкахъ; верхніе собраны густыми безлистными колосьями. Околоцвѣтніи пленчатый, 3—5-тилистный. Тычинокъ 5; Завязь верхняя 1-гнѣздная, съ 2—3-мя нитевидными рыльцами. Плодъ—мѣшечекъ. Цвѣтетъ въ іюлѣ и августѣ; растетъ на поляхъ, сорныхъ мѣстахъ и около дорогъ. Листья употребляются въ пищу во Франціи и Италіи, а семена Амаранта обыкновеннаго вполнѣ хорошо замѣняютъ просо.

**Щирецъ**, см. Амарантъ метельчатый (*Amaranthus paniculatus* L.).

**Щирца**, см. Щирей, амарантъ обыкновенный (*Amarantus Blitum* L.).

**Щирца**, см. Амарантъ колосистый (*Amaranthus retroflexus* L.).

**Щирца садовая**, см. Амарантъ метельчатый (*Amaranthus paniculatus* L.).

**Щиръ**, см. Амарантъ колосистый (*Amarantus retroflexus* L.).

**Щиръ**, см. Амарантъ (*Amarantus caudatus* L.).

**Щиръ червонный**, см. Амарантъ метельчатый (*Amarantus paniculatus* L.).

**Щитникъ большой** (*Aspidium Filix mas* L.). Фармацевтическое назв.: *Filix mas*. Папоротникъ черновой или черный. Папоротникъ мужской, Папороть, Перекусъ (Тамб.), Блѣдская трава. Многолѣтнее папоротниковое растеніе, распространенное по сѣверному полушарію. Корневище толстое, листья крупныя (отъ 7—22 $\frac{1}{2}$  вершк. длины), перисто-разсѣченныя, съ перисто-раздѣльными долями. Кучки спорангіевъ (вмѣститель для споръ) прикрыты почковидными покрывалами, расположены въ 2 ряда по бокамъ средней жилки долей листа. Растетъ въ лиственныхъ лѣсахъ. (Табл. LI, фиг. 288.)

**МЕДИЦИНСКАЯ УПОТРЕБЛЕНІЕ.** Корни папоротника извѣстны своими глистогонными свойствами; отъ внутренняго употребленія ихъ изгоняются какъ ленточныя, такъ и маленькіе круглые глисты. Изъ корня папоротника въ аптекахъ приготавливаютъ жидкій экстрактъ, который дѣйствуетъ сильнѣе, чѣмъ самъ корень. Взрослому человѣку на приемъ экстракта папоротника дается отъ 1,0 до 4,0 грм. (15 гранъ до 2 драхмъ), его смѣшиваютъ съ такимъ-же количествомъ порошка сушеннаго корня папоротника и приготавливаютъ кашку или пилюли. Въ пилюляхъ папоротникъ принимается легче. Вся порція берется на тощій желудокъ въ теченіе  $\frac{1}{2}$ —1 часа, черезъ 1 часъ принимается слабительное, именно, касторовое

масло. Наканунѣ соблюдается дѣта, принимается только жидкая пища, больной очищаетъ себя желудокъ хотя-бы клизмой, на ночь съѣдаетъ нѣсколько кусочковъ селедки. Средняа хорошо дѣйствующая порція экстракта панортника считается въ  $\frac{1}{2}$  драхмы (2.0 грм.). Вліяніе лекарства сказывается черезъ 3—4 часа.

**Щитникъ остроzubчатый** (*Aspidium spinulosum* Sw.). Сходенъ съ щитникомъ большимъ (опис. см. выше), отъ котораго отличается листьями, въ общемъ очертаціи яйцевидно-продолговатыми или почти треугольными, дважды или трижды перисторазсѣченными съ остроzubчатыми долями. Встрѣчается въ сырыхъ лѣсахъ средней и сѣверной Россіи и въ Сибири.

**Щитоноска**, см. Пельтигера (*Peltigera venosa* L.).

**Щить помурный**, см. Стѣнница лекарственная (*Parietaria officinalis* L.).

**Щовель**, см. Щавель обыкновенный (*Rumex Acetosa* L.).

**Щука** } см. Луговикъ дернистый (*Aira caespitosa* L.).

**Щучка** }

**Щучная трава**, см. Стрѣлолистъ обыкновенный (*Sagittaria sagittaeifolia* L.).

**Щучникъ**, см. Луговикъ дернистый (*Aira caespitosa* L.).

**Щучья трава**, см. Гречиха земноводная (*Polygonum amphibium* L.).

**Щырецъ**, см. Амарантъ метельчатый (*Amarantus paniculatus* L.).

## Ъ.

**Ъда коровья**, см. Чина весенняя (*Orobis vernus* L.).

**Ъдная трава**, см. Астра дикая (*Aster Amellus* L.).

## Э.

**Эбеновое дерево антильское зеленое** } см. Кедръ бѣлый  
**Эбеновое дерево бѣлое** } (*Bignonia Leucoxy-*  
**Эбеновое дерево желтое** } lon L.).

**Эбеновое дерево черное, настоящее** (*Diospyros ebenum* Retz.). Высокое дерево въ сѣверной Африкѣ и на Востокѣ. культивируется въ южной Европѣ. Шаровидныя, величныя почти съ вишню, синеvато-черныя ягоды съѣдобны и употребляются въ пищу. Изъ нихъ приготавливаютъ сиропъ и рѣвина. Древесина доставляетъ хорошій строительный и подблочный матеріалъ.

**Эдельвейсъ**, см. Сушеница альпійская (*Gnaphalium Leontopodium* Scop.).

**Эммеръ** (*Triticum dicoccum* Schrenk). Двузернянка, Лускница. Пишеница крахмальная. Однолѣтнее травянистое растение изъ семейства «злаковыхъ» (*Gramineae* Juss.), разводится въ восточныхъ губерніяхъ Европейской Россіи подъ неправильнымъ



названіемъ полбы, вып. до 22 $\frac{1}{2}$  вершковъ. Колосъ сжатый съ боковъ, почти двугранный, довольно плотный, съ ломкимъ стержнемъ. Колоски почти наполовину прикрываютъ другъ друга и содержатъ большею частью по 2 плодущихъ цвѣтка и одинъ безплодный. Створки заостренныя, большею частью съ 2-мя зубцами. Колосъ распадается такимъ образомъ, что каждый колосокъ несетъ находящееся непосредственно подъ нимъ колѣно стержня. Зрѣлыя зерновки заключены въ пленкахъ. Цвѣтетъ лѣтомъ.

**Эндивій** (*Cichorium Endivia* Willd.). Фармацевтическое названіе: *Endivia*. Эндивель, Эндивій. Листъ весьма похожій на цикорій обыкновенный (*Cichorium Intybus* L., опис. см. выше), отъ котораго отличается тѣмъ, что верхніе стеблевые листья широко-яйцевидные и обхватываютъ стебель сердцевиднымъ основаніемъ. Эндивій разводится въ огородахъ въ нѣсколькихъ сортахъ, листья идутъ на салатъ.

**Эскулапова трава**, см. Асклепась (*Asclepias osthmatica* L.).

**Эспарсеть**, см. Эспарсеть кормовой (*Onobrychis sativa* Lam.).

**Эспарсеть кормовой** (*Onobrychis sativa* Lam.). Буркунъ красный (Курс., Черн.), Васильки бѣлые (Хар.), Буркунъ (Ворон.), Воронецъ (Волын.), Горохъ заячій (Малор.), Дрокъ красный (Екат.), Кишечки (Полт.), Конешникъ гребенчатый, Одолень (Арх., Костр.), Спини гаря (Курск.), Стругъ (Курск.), Эспарсеть, Вика, Викъ, Витрихъ, Голова пѣтушья, Гребешокъ пѣтушій, Пѣтушникъ, Руда козья трава, Дятлина пѣтушья, Сладкій духъ, Конешникъ, Ослянка турецкая, Подковникъ, Санфоень. Многолѣтнее травянистое растение изъ семейства «мотыльковыхъ» (*Papilionaceae* L.), распространенное въ средней и южной Россіи и въ южной Сибири, на сѣверъ дальше южной части Петербургской губерніи (Луга) не заходитъ, вып. 7—14 вершковъ. Листья непарно-перистые о 13—25 продолговато-ланцетовидныхъ листочкахъ. Цвѣты расположены густыми, длинными колосьями; чашечка коротко-колокольчатая, съ длинными, почти равными зубцами. Вѣтчикъ мотыльковый (флагъ, крылья, лодочка), розовый, съ темно-красными жилами. Тычиночекъ 10, верхняя свободная. Плодъ—не раскрывающійся односѣмянный, сплюснутый, сѣтчато-морщинистый, величину съ горошину, бобъ. Цвѣтетъ съ мая до октября. Растетъ на поляхъ, лугахъ и въ степяхъ, преимущественно на изветковомъ почвѣ. Разводится, какъ хорошая кормовая трава. (Табл. LI, фиг. 291.).

**Эспарсеть цвѣточный**, см. Конешникъ (*Medysarum esculentum* Led.).

**Эстрагонъ** (*Artemisia Dracunculus* L.). Фармацевтическое названіе: *Dracunculus*. Астроговъ, Драгунъ-трава, Змѣевикъ, Острогонъ (Малор.), Острогонъ (Малор., Бѣлор.), Таргунъ, Торгунъ, Торгунъ, Перець душистый Чагырь. Многолѣтнее травянистое голое растение изъ семейства «сложноцвѣтныхъ» (*Compositae* Adans.), встрѣчающееся дико въ нѣкоторыхъ губерніяхъ южной Россіи, въ Сибири и Туркестанѣ. Стебель прямой, съ безплод-

ными вѣточками. Листья линейно-ланцетные цѣльные; бѣловатые цвѣты въ мелкихъ шаровидныхъ, поникающихъ корзинкахъ, снабженныхъ каждая голой оберткой, собранныхъ кистями, образующими узкое метельчатое соцвѣтіе. Краевые цвѣты женскіе, тонко-трубчатые, срединные—безплодные. Тычинокъ 5; завязь нижняя одногвѣздная, съ однимъ столбикомъ, съ кистистыми притупленными лопастями. Плодъ—сѣмянка. Цвѣтеть во 2-ой половинѣ лѣта. Разводится въ садахъ и огородахъ. Употребляется, какъ приправа, для соленья огурцовъ и приготовления эстрагоннаго уксуса. Въ прежнее время т. ава эстрагона употреблялась противъ водянки и цынги, теперь оставлена.

## Ю.

**Ювія**, см. Американскій орѣшникъ (*Bertolletia excelsa* St. B.).

**Юзерликъ**, см. Рута дикая (*Peganum Harmala* L.).

**Юзефа** } см. Иссопъ лекарственный (*Hyssopus officinalis* L.).

**Юзефы** }

**Юзюрлюнъ**, см. Рута дикая (*Peganum Harmala* L.).

**Юморка** } см. Люцерна серповидная (*Medicago falcata* L.).

**Юморкай** }

**Ююба** (*Zizyphus vulgaris* L. sin. *Rhamnus Zizyphus*). Грудной ягодникъ, Грудныя ягоды, Грудная придорожная игла, Крушина красная, Кизиль, Шиповникъ, Шиповникъ (Чалыжикъ, Даль). Кустарникъ изъ семейства «крушиновыхъ» (*Rhamnaceae* R. Br.), выш. 1½ арш. до 1 саж., родомъ изъ Сиріи или Персіи. Плоды его, мясистые, очень сладкіе, по виду напоминаютъ сливы, употребляются въ Италіи и въ Малой Азіи въ пищу, какъ овощъ.

**Медицинское употребленіе.** Плоды ююбы извѣстны подъ именемъ испанскихъ или французскихъ грудныхъ ягодъ; ягоды эти вкусны и употребляются въ народѣ отъ катарра въ груди.

## Я.

**Яблоки**, см. Картофель (*Solanum tuberosum* L.).

**Яблоки**, см. Яблоня (*Pirus Malus* L.).

**Яблоки волчьи**, см. Мордовникъ (*Echinops sphaerocephalus* L.).

**Яблоки волчьи**, см. Кушена лекарственная (*Convallaria Polygonatum* L.).

**Яблоки земляныя**, см. Дряква европейская (*Cyclamen europeum* L.).

**Яблоки земляныя**, см. Картофель (*Solanum tuberosum* L.).

**Яблоки золотыя**, см. Яблоня (*Pirus Malus* L.).

**Яблоки кумашныя**, см. Кирказонъ обыкновенный (*Aristolochia Clematitis* L.).

**Яблоки кутяшьи**, см. Кирказонъ обыкновенный (*Aristolochia Clematidis* L.).

**Яблоки пѣтушковые**, см. Иванъ-чай (*Epilobium angustifolium* L.).

**Яблоко**, см. Картофель (*Solanum tuberosum* L.).

**Яблоко гранатовое**, см. Гранатовое дерево (*Punica Granatum* L.).

**Яблоко жидовское**, см. Вишня жидовская (*Physalis Alkekengi* L.).

**Яблоко земное**, см. Кирказонъ обыкновенный (*Aristolochia Clematidis* L.).

**Яблоко крыжачель**, см. Айва (*Cydonia vulgaris* L.).

**Яблоко любовное**, см. Помидоры (*Lycopersicum esculentum* Mill.).

**Ябло о пигвовое**, см. Айва (*Cydonia vulgaris* L.).

**Яблоко райское** (*Citrus decumana* L.). Помпельмусъ. Родомъ изъ Малой Азіи и Остъ-Индіи. Плоды очень велики, до 10 фунтовъ вѣсомъ, круглыя и кислыя.

**Яблоко райское, или адамово** (*Citrus Pomum Adami* Risso). Плодъ продолговатый, зеленый или желтый, весьма шероховатый и въ верхней части вдавленный или усѣченный, какъ-бы откушенный. Кожа идетъ на приготовленіе вареньевъ, а мякоть не употребляется въ пищу. По повѣрью, это — запрещенный плодъ, отъ котораго откусилъ часть Адамъ.

**Яблоко райское, или адамово**, см. Бананъ (*Musa paradisiaca* L.).

**Яблоко водомское**, см. Картофель (*Solanum tuberosum* L.).

**Яблоко сухое, или любовное**, см. Бальзаминное дерево (*Momordica Balsamina* L.).

**Яблоко чертово**, см. Картофель (*Solanum tuberosum* L.).

**Яблоко яичное**, см. Яичное дерево (*Solanum ovigerum* L.).

**Яблонь**, см. Яблоня (*Pirus Malus* L.).

**Яблонька лѣсная**, см. Грушанка круглолистная (*Pirola rotundifolia* L.).

**Яблоня** (*Pirus Malus* L.). Яблоки, Яблоки золотыя, Яблонь, Яблоко. Дерево выш. до 5 сажень, изъ семейства «яблоневыхъ» (*Pomaceae* Lindl.); происхожденіе культивируемыхъ сортовъ его не выяснено. Листья яйцевидныя, коротко-заостренныя, по краямъ городчатые, снизу войлочные, пушистыя или голыя, черешокъ вдвое короче пластинки. Цвѣты бѣлые съ розоватымъ оттѣнкомъ. Чашечка 5-тираздѣльная; лепестковъ 5, многочисленныя тычинки вмѣстѣ съ лепестками сидятъ на дискѣ, находящемся на краю вогнутого цвѣтоложа. Завязь 5-тигнѣздная, съ 5 столбиками, спаянными при основаніи; срастающаяся съ цвѣтоложемъ и разрастающаяся вмѣстѣ съ нимъ, она даетъ листовидный или овальный мясистый плодъ, со впадиной при основаніи. Цвѣтетъ весной. Изъ яблоковъ готовятъ напитокъ, извѣстный подъ именемъ «сидра»; они-же идутъ на выдѣлку уксуса и водки.

Кора яблони и дерево полезны для фабричных цѣлей. Кору употребляютъ для краски, кора яблони съ квасцами даетъ прекрасную красную краску, изъ дерева въ столярныхъ мастерскихъ выдѣлываютъ красивую мебель. (Табл. II, фиг. 289.)

**МЕДИЦИНСКОЕ УПОТРЕБЛЕНИЕ.** Лекарственное значеніе яблокъ цѣнится въ домашнемъ быту. Яблочному отвару приписывается свойство дѣйствовать смягчающимъ образомъ на кашель и хрипоту, въ особенности, если они произошли отъ простуды и сопровождаются повышеніемъ температуры. Одно или два хорошихъ сочныхъ яблокъ нарезаютъ ломтиками, кладутъ въ чайники, заливаютъ кипяткомъ и даютъ немного настояться. Яблочный чай—очень пріятный напитокъ, слегка кисловатый, освежающій; его пьютъ горячимъ два-три раза въ день по чайникъ. Въ яблочный отваръ можно по вкусу положить лимона и сахара.

Печенныя яблоки служатъ хорошимъ десертомъ для выздоравливающихъ, также они очень полезны для людей, имѣющихъ вялое отравленіе кишечника и страдающихъ запорами. Также хорошо дѣйствуютъ на отравленіе желудка и сырые яблоки. Ежедневное употребленіе сырыхъ яблокъ на тощій желудокъ исправляетъ вялое пищевареніе. Яблоки полезны не только взрослымъ людямъ, но и дѣтямъ. Даже годовалыя дѣти ихъ хорошо переносятъ. Если они не умѣютъ жевать сырые яблоки, имъ некутъ ихъ, или же натираютъ на теркѣ и смѣшиваютъ съ сахаромъ. Также яблоки варятъ съ сахаромъ, приготовляя яблочный компотъ, къ которому иногда прибавляютъ чернослива и апельсинновъ. При ожогѣ для утоленія жара на обожженное мѣсто кладутъ кусокъ яблока; точно также яблоки прикладываютъ къ замороженнымъ тканямъ. Сокъ кислыхъ яблокъ идетъ на приготовленіе известнаго между врачами препарата желѣза подъ именемъ «яблочно-кислаго желѣза».

**Яблоня дикая** (*Pirus L.*). Кислица, Лѣсковка. Встрѣчается въ лѣсахъ и между кустарниками въ Европейской Россіи, въ Закавказьѣ и Туркестанѣ; сѣверная ея граница распространенія проходитъ черезъ южную Финляндію, пересѣкаетъ Новгородскую губернію и спускается къ Казани. Она отличается колючими вѣтвями и мелкими, частью сладковатыми или кисловатыми плодами. Отъ дикой яблони, постепенно, путемъ многолѣтней культуры, произошли многочисленныя сорта, часто столь резко отличающіеся другъ отъ друга.

**Яблоня крыжаль**, см. Айва (*Cydonia vulgaris L.*).

**Яблоня райская, сибирская, татарская** (*Pirus baccata L.*). Янтарка. Древо изъ семейства «яблоневыхъ» (*Rosaceae Lindl.*), родомъ изъ восточной Сибири. Листья голые, эллиптическіе или округло-эллиптическіе, острые, пильчатые. Цвѣты обильные съ розоватымъ оттѣнкомъ, въ щиткахъ. Разводится въ садахъ.

**Яблочки**, см. Яблоня (*Pirus Malus L.*).

**Яблочки**, см. Картофель (*Solanum tuberosum L.*).

**Яблучка**, см. Клеверъ луговой (*Trifolium pratense L.*).

- Яблущка, см. Клеверъ бѣлый, ползучій (*Trifolium repens* L.).
- Яверовый корень } см. Аиръ обыкновенный (*Acorus Cala-*  
Яверъ } mus L.).
- Явіръ, см. Яворъ (*Acer Pseudoplatanus* L.).
- Яворъ (*Acer Pseudoplatanus* L.). Кленъ пѣмекій, Сикоморъ, Явиръ.  
Высокое красное дерево изъ семейства «кленовидныхъ» (*Ace-*  
*gineae*), произрастающее въ средней и южной Европѣ, въ юго-  
западныхъ губерніяхъ Россіи и въ Закавказьѣ, съ выпуклымъ шат-  
ромъ. Листья 5-тилопастные; лопасти заостренныя, съ нерав-  
ными зубцами. Зеленоватые цвѣты собраны длинными висячими  
кистями. Цвѣтики разнородные; чашечка 5-тираздѣльная, ле-  
пестковъ и тычинокъ столько-же. Въ мужскихъ цвѣтахъ ты-  
чинки съ болѣе длинными нитями. Завязь двуплодная, дву-  
гипзидная, съ 2-ми столбиками. Плодъ—двукрылатка, съ крыльями,  
расположенными почти подъ прямымъ угломъ. Цвѣтетъ съ  
апрѣля до юня. Древесина доставляетъ прекрасный матеріалъ  
для столярныхъ и токарныхъ издѣлій. (Рис. 337.)
- Яворъ, см. Аиръ обыкновенный (*Acorus Calamus* L.).
- Яворъ, см. Тополь пирамидальный (*Populus pyramidalis* L.).
- Ягель дикий, см. Дягель лѣсной (*Angelica silvestris* L.).
- Ягель, см. Олений мохъ (*Cladonia rangiferina* L.).
- Ягель красноголовый, см. Кладонія красноголовая (*Cladonia*  
*coccifera* L.).
- Ягиль, см. Дягель лѣсной (*Angelica silvestris* L.).
- Ягиль, см. Стальникъ пахучій (*Ononis hircina* Jacq.).
- Ягиль, см. Валериана лекарственная (*Valeriana officinalis* L.).
- Ягидки, см. Волчье лыко (*Daphne Mezereum* L.).
- Ягидки вовчі, см. Толокнянка обыкновенная (*Arctotaphylos offi-*  
*cialis* Moench.).
- Ягидникъ, см. Земляника лѣсная (*Fragaria vesca* L.).
- Ягилица, см. Стальникъ пахучій (*Ononis hircina* Jacq.).
- Ягилица } см. Сныть обыкновенная (*Aegopodium Podagra-*  
Ягилица } ria L.).
- Ягница, см. Дымянка лекарственная (*Fumaria officinalis* L.).
- Ягода, см. Земляника лѣсная (*Fragaria vesca* L.).
- Ягода бабья, см. Александрійскій лавръ (*Ruscus Hypophyl-*  
*lum* L.).
- Ягода бросквинная, см. Помидоры (*Lycopersicum esculentum*  
Mill.).
- Ягода бѣшеная, см. Белладонна (*Atropa Belladonna* L.).
- Ягода волчья, см. Помидоры (*Lycopersicum esculentum* Mill.).
- Ягода вороня трава, см. Вороній глазъ (*Paris quadrifolia* L.).
- Ягода дристуха, см. Голубика (*Vaccinium uliginosum* L.).
- Ягода красная, см. Земляника лѣсная (*Fragaria vesca* L.).
- Ягода листовая (*Ruscus Hypoglossum* L.). Фармацевтическое  
назв. *Herba Uvulariae*, s. *Bislinguae*, s. *Bonifacii*. Язык конскій,  
Лошадино-язычная трава. Растеніе, произрастающее на югѣ  
Европы. Сѣмена составляютъ лучший изъ суррогатовъ кофе.
- Ягода снѣжная (*Symphoricarpus racemosus* Mich.). Снѣжное де-

рево, Жимолость американская бѣлая. Биліе ягоды. Сѣверо-американскій кустарникъ съ кроваво-красными цвѣтами и свѣжнобѣлыми круглыми, величиною съ вишню, ягодами, остающимися и на зиму. Разводится въ садахъ, какъ декоративное растеніе.

**Ягода чечевичная** (*Phytolacca decandra* L.). Жирная трава, Лаконность, Почная тѣнь, Индійскій плющъ, Шпинатъ американскій. Многолѣтняя трава съ яйцевидно-продолговатыми цѣльнокрайними листьями и черными ягодами и съ цвѣтами, собранными кистями, изъ семейства «*Phytolaccaceae*», родомъ изъ сѣверной Америки, въ дикомъ состояніи встрѣчающаяся въ южной Европѣ. Листья, ягоды и особенно молодые корни остры и пріятны на вкусъ, вареные—употребляются, какъ овощъ. Красный сокъ ягодъ служитъ для подкрашиванія вина.

**Ягоды вовчі, см. Бирючина обыкновенная** (*Ligustrum vulgare* L.).

**Ягоды вовчі, см. Пасленъ сладко-горькій** (*Solanum dulcamara* L.).

**Ягодица, см. Бересклетъ бородавчатый** (*Evonymus verrucosus* L.).

**Ягоди вовчі, см. Воронецъ колосистый** (*Actaea spicata* L.).

**Ягоди вовчі, см. Бирючина обыкновенная** (*Ligustrum vulgare* L.).

**Ягодки, см. Волчье лыко** (*Daphne Mezereum* L.).

**Ягодки дубовыя, см. Омела обыкновенная** (*Viscum album* L.).

**Ягодникъ, см. Земляника лѣсная** (*Fragaria vesca* L.).

**Ягодникъ волчій, см. Купена лекарственная** (*Convallaria Polygonatum* L.).

**Ягодникъ грудной, см. Ююба** (*Zizyphus vulgaris* L.).

**Ягоды бирючьи, см. Спаржа обыкнов.** (*Asparagus officinalis* L.).

**Ягоды бирючьи, см. Волдырникъ ягодный** (*Cucubalus bacciferus* L.).

**Ягоды бирючьи, см. Хвойникъ обыкновенный** (*Ephedra vulgaris* Rich.).

**Ягоды волчьи, см. Спаржа обыкновенная** (*Asparagus officinalis* L.).

**Ягоды волчьи, см. Воронецъ колосистый** (*Actaea spicata* L.).

**Ягоды волчьи, см. Белладонна** (*Atropa Belladonna* L.).

**Ягоды волчьи, см. Ландышъ майскій** (*Convallaria majalis* L.).

**Ягоды волчьи, см. Купена лекарственная** (*Convallaria Polygonatum* L.).

**Ягоды волчьи, см. Волчье лыко** (*Daphne Mezereum* L.).

**Ягоды волчьи, см. Бересклетъ бородавчатый** (*Evonymus verrucosus* L.).

**Ягоды волчьи, см. Бирючина обыкновенная** (*Ligustrum vulgare* L.).

**Ягоды волчьи, см. Жимолость обыкновенная** (*Lonicera Xylosteum* L.).

**Ягоды волчьи, см. Вороній глазъ** (*Paris quadrifolia* L.).

**Ягоды волчьи, см. Крушина ломкая** (*Rhamnus frangula* L.).

**Ягоды волчьи, см. Пасленъ сладко-горькій** (*Solanum dulcamara* L.).

- Ягоды волчьи, см. Пасленъ черный (*Solanum nigrum* L.).
- Ягоды вороновы, } см. Купена лекарственная (*Convallaria Po-*  
Ягоды вороньи, } *lygonatum* L.).
- Ягоды вороньи, см. Воронецъ колосистый (*Actaea spicata* L.).
- Ягоды вороньи, см. Вербейникъ обыкновенный (*Lysimachia vulgaris* L.).
- Ягоды вороньи, см. Вороній глазъ (*Paris quadrifolia* L.).
- Ягоды вороньи, см. Пасленъ сладко-горькій (*Solanum dulcamara* L.).
- Ягоды вороньи, см. Пасленъ черный (*Solanum nigrum* L.).
- Ягоды гадючьи, см. Пасленъ сладко-горькій (*Solanum dulcamara* L.).
- Ягоды галочьи, см. Норичникъ узловатый (*Scrophularia nodosa* L.).
- Ягоды грудныхъ, см. Ююба (*Zizyphus vulgaris* L.).
- Ягоды дереновыя, см. Кизиль обыкновенный (*Cornus mas* L.).
- Ягоды жидовскія, см. Бальзаминное дерево (*Momordica Balsamina* L.).
- Ягоды журавлиныя, см. Спаржа обыкновенная (*Asparagus officinalis* L.).
- Ягоды злыя, см. Воронецъ колосистый (*Actaea spicata* L.).
- Ягоды испанскія, см. Ююба (*Zizyphus vulgaris* L.).
- Ягоды медвѣжьи, см. Вороній глазъ (*Paris quadrifolia* L.).
- Ягоды медвѣжьи, см. Малина (*Rubus idaeus* L.).
- Ягоды медвѣжьи, см. Воронецъ колосистый (*Actaea spicata* L.).
- Ягоды медвѣжьи, см. Пасленъ сладко-горькій (*Solanum dulcamara* L.).
- Ягоды медвѣжьи, см. Пасленъ черный (*Solanum nigrum* L.).
- Ягоды пѣтушьи, см. Шиповникъ (*Rosa canina* L.).
- Ягоды рябковые } см. Майникъ двулистный (*Majantemum*  
Ягоды рябчиковыя } *bifolium* L.).
- Ягоды скворцовыя, см. Лапчатка серебристая (*Potentilla argentea* L.).
- Ягоды соколиныя, см. Майникъ двулистный (*Majantemum bifolium* L.).
- Ягоды собачьи, см. Бирючина обыкновен. (*Ligustrum vulgare* L.).
- Ягоды собачьи, см. Крушина слабительная (*Rhamnus cathartica* L.).
- Ягоды собачьи, см. Пасленъ сладко-горькій (*Solanum dulcamara* L.).
- Ягоды собачьи } см. Пасленъ черный (*Solanum nigrum* L.).
- Ягоды сорочьи }
- Ягоды сорочьи, см. Пасленъ сладко-горькій (*Solanum dulcamara* L.).
- Ягоды сорочьи, см. Жминда лозная (*Blitum capitatum* L.).
- Ягоды сорочьи, см. Купена лекарственная (*Convallaria Polygonatum* L.).
- Ягоды сорочьи, см. Вербейникъ обыкновенный (*Lysimachia vulgaris* L.).

Ягоды сорочьи, см. Крушина ломкая (*Rhamnus frangula* L.).  
 Ягоды сурочьи, см. Жминда лозная (*Blitum capitatum* L.).  
 Ягоды тетеревицныя, см. Можжевельникъ обыкновенный (*Juniperus communis* L.).  
 Ягоды ядовитыя, см. Белена черная (*Hyoscyamus niger* L.).  
 Ягель, см. Олений мохъ (*Cladonia rangiferina* L.).  
 Ягресь, см. Крыжовникъ (*Ribes Grossularia* L.).  
 Ядловецъ, см. Можжевельникъ обыкновенный (*Juniperus communis* L.).  
 Ядовитая трава, см. Ятрышникъ широколистный (*Orchis latifolia* L.).  
 Ядренецъ, см. Очитокъ острый (*Sedum acre* L.).  
 Ядрокорень, см. Ятрышникъ-дремликъ (*Orchis Morio* L.).  
 Ядроръзъ, см. Тыловъзъ сабуровидный (*Stratiotes aloides* L.).  
 Ядрушки, см. Кокушникъ (*Gymnadenia conopsea* Rich.).  
 Ядрышки, см. Ятрышникъ мужской (*Orchis mascula* L.).  
 Ядрушки, см. Фиалка ночная (*Platanthera bifolia* L.).  
 Ядъ, см. Белена черная (*Hyoscyamus niger* L.).  
 Ядъ волчій, см. Борецъ синий (*Aconitum Napellus* L.).  
 Ядъ волча, см. Борецъ синий (*Aconitum Napellus* L.).  
 Яеръ, см. Аиръ обыкновенный (*Acorus Calamus* L.).  
 Яждъ, см. Череда трехраздѣльная (*Bidens tripartita* L.).  
 Яжевичникъ, см. Ежевика (*Rubus caesius* L.).  
 Язвенная трава, см. Многоножка тройчатая (*Polypodium Dryopteris* L.).  
 Язвенникъ, см. Язвенникъ обыкновенный (*Anthyllis Vulneraria* L.).  
 Язвенникъ обыкновенный (*Anthyllis Vulneraria* L.). Фарм. назв.: *Anthyllis s. Vulneraria rustica* (Herba). Желтый заячій клеверъ, Зольная трава, Зольное зелье, Зольникъ, Сольникъ, Сольное зелье, Луководоръ тр., Перелеть, Перелетникъ, Язвенникъ (Двиг., Соболев.), Дѣвичій пальчикъ, Корички (Арх.), Нетубицъ (Гродн.), Смолквица (Могил.), Откосникъ (Кіев.), Котикое (Полт.), Олущай (Вол.). Многолѣтнее травянистое растение изъ семейства «мотыльковыхъ» (*Papilionaceae* L.), распространенное почти во всей Европѣ и въ большей части Европейской Россіи. Стебель со многими лежащими или приподнимающимися вѣтвями, дл. 2—7 вершк. Все растение покрыто шелковистыми прижатыми волосками. Листья непарно-перистые; конечный листочекъ значительно крупнѣе боковыхъ. Головки цвѣтовъ расположены обыкновенно попарно на концахъ вѣтвей и снабжены при основаніи оберткой, состоящей изъ пальчато-раздѣльных листочковъ. Чашечка вздутая. 5-тизубчатая. Вѣнчикъ желтый или оранжевый, мотыльковый (флагъ, крылья и лодочка). Тычинокъ 10, сросшихся въ одинъ пучокъ. Плодъ—бобъ. Цвѣтетъ съ мая до августа. Растетъ на холмахъ, на лугахъ и въ лѣсахъ. Даетъ хорошее сѣно. (Табл. LI, фиг. 290.)

**МЕДИЦИННОЕ УПОТРЕБЛЕНІЕ.** извѣстно только въ народѣ. Въ Гродненской губ. растение употребляется отъ холеры, въ Кіев-



ской — отъ укушенія бѣшеной собаки и отъ водобоязни. Внутрь пьютъ отваръ травы; снаружи изъ нея дѣлають припарки.

Языкъ воловій, см. Окопникъ лекарственный (*Symphytum officinale* L.).

Языкъ волівъ, см. Нанерстнянка крупноцвѣтная (*Digitalis grandiflora* L.).

Язички собачи, см. Подорожникъ ланцетный (*Plantago lanceolata* L.).

Языки коровьи, см. Серлуха вѣщелосная (*Serratula coronata* L.).

Языки свиные, см. Манжетка обыкновенная (*Alchemilla vulgaris* L.).

Языки собачьи, см. Букушкины слезки (*Orchis maculata* L.).

Языкъ, см. Сивецъ луговой (*Scabiosa succisa* L.).

Языкъ бараній, см. Бараній языкъ (*Onosma echinoides* L.).

Языкъ бычачій, см. Румянка лекарственная (*Anchusa officinalis* L.).

Языкъ бычачій желтый, см. Бараній языкъ (*Onosma echinoides* L.).

Языкъ воловій, см. Румянка лекарств. (*Anchusa officinalis* L.).

Языкъ воловій, см. Чертополохъ разнолистный (*Cirsium heterophyllum* All.).

Языкъ воловій, см. Чернокорень обыкновенный (*Cynoglossum officinale* L.).

Языкъ воловій, см. Снякъ обыкновенный (*Echium vulgare* L.).

Языкъ воловій, см. Легочница лекарственная (*Pulmonaria officinalis* L.).

Языкъ воловій, см. Окопникъ лекарственный (*Symphytum officinale* L.).

Языкъ гадинъ, см. Кудило пахучее (*Melittis Melesophyllum* L.).

Языкъ змиевый, см. Ужовникъ обыкновенный (*Ophioglossum vulgare* L.).

Языкъ змійный, см. Стрѣлолистъ обыкновенный (*Sagittaria sagittaeifolia* L.).

Языкъ козій, см. Жимолость вьющаяся (*Lonicera Periclymenum* L.).

Языкъ конскій, см. Ягода листовая (*Ruscus Hypoglossum* L.).

Языкъ коровій, см. Сивецъ луговой (*Scabiosa succisa* L.).

Языкъ лѣсной, см. Ландышъ майскій (*Convallaria majalis* L.).

Языкъ песій, см. Чернокорень обыкновенный (*Cynoglossum officinale* L.).

Языкъ свиной } см. Ландышъ майскій (*Convallaria majalis* L.).

Языкъ собачій } см. Ландышъ майскій (*Convallaria majalis* L.).

Языкъ собачій, см. Чернокорень обыкновенный (*Cynoglossum officinale* L.).

Языкъ собачій, см. Снякъ красный (*Echium rubrum* L.).

Языкъ собачій, см. Подорожникъ большой (*Plantago major* L.).

Языкъ собачій, см. Легочница лекарственная (*Pulmonaria officinalis* L.).

- Языкъ ужовый, см. Ужовникъ обыкновенный (*Ophioglossum vulbatum* L.).
- Язычекъ бычачій трава, см. Румянка лекарственная (*Anchusa officinalis* L.).
- Язычекъ венжовый, см. Подорожникъ оредній (*Plantago media* L.).
- Язычки воловьи, см. Блошница пропосная (*Inula dysenterica* L.).
- Язычки трава, см. Подорожникъ ланцетный (*Plantago lanceolata* L.).
- Язычникъ, см. Ландышъ майскій (*Convallaria majalis* L.).
- Язычникъ, см. Ужовникъ обыкновенный (*Ophioglossum vulgatum* L.).
- Язычекъ лѣсной, см. Сивецъ луговой (*Scabiosa succisa* L.).
- Яйца вороньи, см. Дождевикъ шиловатый (*Lycoperdon gemmatum* L.).
- Яйца котовы, см. Бересклетъ европейскій (*Evonymus europaeus* L.).
- Яйца котовы, см. Ленъ дикій (*Linaria vulgaris* Mill.).
- Яйца котовы, см. Заячья капуста (*Sedum Telephium* L.).
- Яйца котовы, см. Фиалка опушенная (*Viola hirta* L.).
- Яйца курячьи, см. Яичное дерево (*Solanum ovigerum* L.).
- Яйца поповы } см. Ятрышникъ мужской (*Orchis mascula* L.).
- Яички }
- Яички котовы, см. Клеверъ пашенный (*Trifolium agrarium* L.).
- Яичникъ, см. Селезеночникъ очереднолистный (*Chrysosplenium alternifolium* L.).
- Яичникъ, см. Яичное дерево (*Solanum ovigerum* L.).
- Яичное дерево (*Solanum ovigerum* L. sin. *Solanum Melongena* Murr.). Яичникъ, Яйца курячьи трава, Свинка, Свиная трава, Яичное яблоко, Огурецъ сермянскій. Травянистое растеніе изъ семейства «пасленовыхъ» (*Solanaceae*), родомъ изъ Африки и Южной Америки, съ огурцевидными фиолетовыми или красными сочными плодами, которые, будучи сварены, теряютъ свое ядовитое свойство и употребляются, какъ овощъ во всѣхъ тропическихъ странахъ, въ южной Европѣ, преимущественно же въ Испаніи, въ Римѣ и Неаполѣ.
- Якарандовое дерево, см. Палисандровое дерево (*Jacaranda* Juss.).
- Якова трава } см. Желтуха (*Senecio jacobea* L.).
- Якубовъ цвѣтъ }
- Якутка, см. Чернокорень обыкновен. (*Cynoglossum officinale* L.).
- Ялапъ, см. Ночная красавица (*Mirabilis Jalapa* L.).
- Яловень, см. Серпуха красильная (*Serratula tinctoria* L.).
- Яловень боровой, см. Сивецъ луговой (*Scabiosa succisa* L.).
- Яловидъ } см. Можжевельникъ обыкновенный (*Juniperus communis* L.).
- Яловицъ }
- Ямура } см. Люцерна серповидная (*Medicago falcata* L.).
- Ямурокъ }

Яновецъ, см. Дрокъ красильный (*Genista tinctoria* L.).

Яновецъ, см. Дрочникъ тонкій (*Spartium junceum* L.).

Ярабина } см. Рябина обыкновенная (*Sorbus Aucuparia* L.).

Ярина }

Яридя } см. Пшеница обыкновенная (*Triticum vulgare* L.).

Ярлюжникъ, см. Гайникъ широколистный (*Epiractis latifolia* Spr.).

**Ярмолистъ** (*Zygophyllum Fabago* L.). Бобковая трава, Верблюжий кормъ, Вонючка, Двудлистникъ, Каперсы стручковые, Могильная трава (Мосил.), Паролистникъ, Червогонникъ. Многолѣтнее голое травянистое растение изъ семейства «парнолистниковыхъ» (*Zygophylleae* R. Br.), распространенное въ южной Европѣ, въ южной Россіи. Стебель вѣтвистый; листья супротивные съ прилистниками; пластинка ихъ мясистая, состоящая изъ 2-хъ косяхъ продолговато-обратно-яйцевидныхъ листочковъ, болѣе длинныхъ, чѣмъ черешокъ листа. Бѣловатые цвѣтки въ верхушечныхъ двухъцвѣтковыхъ зонтичкахъ, находящихся въ развилкахъ стебля или кажущихся боковыми. Чашелистиковъ 4—5, длиннѣе цвѣтопожкн; лепестковъ столько-же, клиновидныхъ, тупыхъ и при основаніи вмѣстѣ съ тычинками оранжевыхъ. Тычинокъ 8—10, прикрѣпленныхъ къ основанію диска; нити ихъ снабжены при основаніи рѣсничатой чешуйкой. Завязь 5-тигивзная, съ однимъ столбикомъ. Плодь—призматическая повислая 4—5-тигранная коробочка, раскрывающаяся гнѣздоразрывно, съ продолговатыми мористо-морщинистыми сѣменами. Растетъ на песчаныхъ и на солончаковыхъ мѣстахъ. Цвѣточныя почки употребляются, какъ каперсы.

**МЕДИЦИНСКОЕ УПОТРЕБЛЕНІЕ.** Киргизы употребляютъ корень ярмолиста съ бараньимъ саломъ, какъ средство для заживленія ранъ. Считается противогнилостнымъ и антисифилитическимъ средствомъ.

Ярмусъ, см. Щирей (*Amarantus Blitum* L.).

Яровникъ, см. Иванъ-чай (*Epilobium angustifolium* L.).

Ярутка, см. Пастушья сумка (*Capsella Bursa pastoris* Moench.).

**Ярутка полевая** (*Thlaspi arvense* L.). Фармацевтическое назв.: *Thlaspi*. Вередникъ (Малор.), Волоски (Малор.), Волосника (Екат.), Вѣнничекъ (Ниж.), Голичокъ, Горчица (Олон.), Гремуха (Курск.), Гречичка (Умань), Донникъ (Вор.), Жабная трава (Вятск.), Занозка (Ниж.), Денежка (Олон.), Денежникъ, Денежница (Арх.), Дзвонецъ (Малор.), Позвонокъ (Влад.), Клопецъ (Твер.), Клопикъ, Клопникъ (Нижег.), Клоповникъ, Комелекъ, Лопаточникъ, Лягушникъ, Маловенецъ, Расходникъ (Вор.), Розечникъ (Олон.), Талабонъ (Малор.), Червичникъ (Пет.), Чорве ребра (Малор.). Однолѣтняя весьма обыкновенная съ неприятнымъ запахомъ трава изъ семейства «крестоцвѣтныхъ» (*Cruciferae* Juss.), распространенная во всей Европѣ и во всей Россіи, вып. 3½—7 вершковъ. Стебель прямоходящій съ сидячими, продолговатыми, при основаніи стрѣловидными, зубчатыми

листьями и прикорневыми продолговато-овальными, сужеными при основании въ черешокъ, листьями, собранными розеткой. Былыя малкіе цвѣты въ удлинённыхъ кистяхъ. Чашечка изъ 4-хъ паръ опадающихъ листочковъ; въничіи 4-хлестный. Тычинокъ 6; пестикъ состоитъ изъ 2-хъ плодолистиковъ. Плодь—округлые сплюснутые узко-перегородчатые «стручки»; створки ихъ снабжены на спинкахъ крыломъ. Цвѣтеть съ апрѣля до іюня. Произрастаетъ на поляхъ, при дорогахъ и сорныхъ мѣстахъ. Сѣмена содержатъ масло.

**МЕДИЦИНСКОЕ УПОТРЕБЛЕНІЕ.** Растеніе употребляется только въ народной медицинѣ и то крайне рѣдко. Въ Малороссіи его пьютъ отъ лихорадки, въ Екатеринбургѣ и губ. прикладываютъ на ноги при язвахъ, которыя въ народѣ зовутся «волосатниками».

**Ясакаръ, см. Осокоръ обыкновенный** (*Populus nigra* L.).

**Ясенецъ, см. Ясенецъ бѣлый** (*Dictamnus Fraxinella* Pers.).

**Ясенецъ бѣлый** (*Dictamnus Fraxinella* Pers.). Фармацевтическое назв.: *Dictamnus albus* s. *officinalis*, s. *Fraxinella*, s. *Fraxina rumila*, s. *Dictamnus*. Анистъ, Баланъ, Бадьянъ, Вадыанъ дикій (Спб.), Волкана (Ставр.). Глистый корень, Диктамя бѣлый, Диктаминъ, Ломоносъ (Подол.), Охватка благовонная, Корень олень меньшій, Ясень-трава, Ясенишная трава, Ясенецъ, Ясеникъ, Ясеница душистая, Эфирникъ, Царь-трава. Многолѣтнее травянистое, выш. 11½—22½ вершк., растеніе изъ семейства «рутовыхъ» (*Rutaceae* Juss.), распространенное въ средней и южной Европѣ, изрѣдка встречающееся по всему югу Европейской Россіи и въ южной Сибири. Стебель прямостоящій, железисто-клейкій. Листья очередные, парно-перистые, 5—7 мелко-пильчатыхъ листочкахъ, нижняя поверхность которыхъ усыяна просвѣчивающими точечными железами. Розоватыя съ темно-красными жилками цвѣты въ длинной верхушечной кисти на верхушкѣ стебля. Чашечка 5-тилистная, опадающая; лепестковъ 5, неодинаковыхъ, острыхъ, суженныхъ при основаніи въ ноголокъ; тычинокъ 10, согнутыхъ ввизъ; завязь 5-тилопастная. Плодь—коробочка съ сѣтчатоморщинистыми лопастями и съ черными блестящими сѣменами. Цвѣтоножки, чашечки и коробочка съ темно-красными железами, наполненными легко воспламеняющимся эфирнымъ масломъ. Цвѣтеть въ маѣ и въ іюнѣ. Растетъ въ лѣсахъ. Разводится въ садахъ. (Табл. LI. ф и г. 293 и 294.).

**МЕДИЦИНСКОЕ УПОТРЕБЛЕНІЕ.** Въ прежнее время корень растенія употреблялся врачами, какъ средство противосудорожное, противоспазматическое, противонестерическое, открывающее мѣсячное и мочегонное. Вода, перегнанная черезъ зерна, употреблялась внутрь при чумѣ, а снаружи, какъ косметическое средство. Въ настоящее время растеніе употребляется только въ народѣ. Корень употребляется отъ лихорадки, въ Подольской губ. листья прикладываютъ къ пульсу отъ лихорадки. Въ Сибири листья представляютъ суррогатъ чая.

**Ясенина**, см. Ясень обыкновенный (*Fraxinus excelsior* L.).  
**Ясеница душистая** } см. Ясенецъ бѣлый (*Dictamnus Fraxi-*  
**Ясенишная трава** } *nella Pers.*).  
**Ясеницъ**, см. Зубница луковичная (*Dentaria bulbifera* L.).  
**Ясеникъ**, см. Ясень обыкновенный (*Fraxinus excelsior* L.).  
**Ясеникъ**, см. Икотникъ сѣро-зеленый (*Berteroa incana* DC.).  
**Ясенокъ**, см. Воронецъ колосистый (*Actaea spicata* L.).  
**Ясенокъ**, см. Ломоносъ прямой (*Clematis cretica* All.).  
**Ясенокъ**, см. Ясень обыкновенный (*Fraxinus excelsior* L.).  
**Ясень трава**, см. Ясенецъ бѣлый (*Dictamnus Fraxinella Pers.*).  
**Ясень**, см. Ясень обыкновенный (*Fraxinus excelsior* L.).  
**Ясень китайскій**, см. Айлантъ (*Allantus grandulosa* Desf.).

**Ясень обыкновенный** (*Fraxinus excelsior* L.). Ясень, Ясеникъ (вездѣ), Ясенина (Малор.), Ясина, Ясень, Ясенокъ (Курск.); Ясионъ (Вил.), Падубъ. Дерево выш. 10—15 сажень изъ семейства «маслинныхъ» (*Oleaceae* Lindl.), распространенное въ средней Европѣ, въ большей части Европейской Россіи и на Кавказѣ; на сѣверѣ доходитъ до Петербурга. Листья супротивные, непарно-перистые, о 7—13 широко-ланцетныхъ, пыльчатыхъ листочкахъ. Цвѣты состоятъ только изъ 2-хъ тычинокъ и пестика. Чашечки и вѣтвицы пѣть. Плодъ—крылатка. Цвѣтеть весной до появленія листьевъ. Кора имѣетъ горькій вкусъ и употреблялась, вмѣсто хины, при леченіи лихорадокъ и противъ глывствъ, почему и получила названіе европейской хины, нѣмецкой хины. Употребляется также для дубленія и окраски въ черный и голубой цвѣта. Плотная, гибкая, упругая древесина весьма цѣнится въ столярномъ и экипажномъ производствѣхъ. На ясени преимущественно водятся шпанскія мухи.

Помимо ясени обыкновеннаго, въ садахъ и паркахъ разводятся его разновидности, какъ, напр., ясень плакучій (*repens*) съ повислыми вѣтвями, ясень золотистый (*aurea*) съ золотисто-желтыми вѣтвями, ясень кудрявый (*crispa*) съ кудрявыми, темно-зелеными листьями, ясень разнолистный (*heterophylla*) съ цѣльными или 3-храздѣльными листьями, а также другіе. (Табл. ЛП, фиг. 295 и 296.)

**Ясень синяя**, см. Андерасъ (*Melia Azederach* L.).

**Ясень цвѣтущій** (*Fraxinus Ornus* L.). Дерево выш. 1½—3½ сажени изъ семейства «маслинныхъ» (*Oleaceae* Lindl.), произрастающее на горахъ южной Европы. Листья непарно-перистые, болѣею частью о 7—9 линейныхъ или ланцетныхъ листочкахъ. Цвѣты правильные, съ 4-хзубчатой чашечкой, спайнолепестными, съ 4-храздѣльнымъ отгибомъ, вѣтчикомъ. Тычинокъ 2; завязь верхняя, 2-хгнездная. Плодъ—крылатка. Изъ трещинъ и надрѣзовъ коры вытекаетъ сладкій твердѣющій на воздухѣ сокъ, извѣстный въ торговлѣ подъ именемъ «манны» и употребляемый, какъ слабительное. Для полученія манны это растеніе разводятъ въ Сициліи.

**МЕДИЦИННОЕ УПОТРЕБЛЕНІЕ.** Манна обладаетъ слабительными свойствами, потому видѣ сиропа она входитъ въ различныя

микстуры. Она дѣйствуетъ очень нѣжно, безъ боли и потому охотнѣе принимается въ дѣтской практикѣ. Для того, чтобы получить дѣйствіе желудка, ребенку довольно дать 15,0—20,0 грм. ( $\frac{1}{2}$  унца или 5 драхмъ) манны, разведя ее въ молоко или водѣ.

**Ясикеръ**, см. Осокоръ обыкновенный (*Populus nigra* L.).

**Ясина**, см. Ясень обыкновенный (*Fraxinus excelsior* L.).

**Ясинникъ**, см. Ясенецъ бѣлый (*Dictamnus Fraxinella* Pers.).

**Ясинъ**, см. Ясень обыкновенный (*Fraxinus excelsior* L.).

**Ясіонъ**, см. Ясень обыкновенный (*Fraxinus excelsior* L.).

**Яскеръ-трава**, см. Лютикъ ядовитый (*Ranunculus sceleratus* L.).

**Ясколка луговая** (*Cerastium arvense* L.). Фармацевтическое назв.: *Auricula muris alba* s. *Holosteum Caryophylli*. Многолѣтнее травянистое густо-пушистое растение изъ семейства «гвоздичныхъ» (*Caryophyllaceae*), распространенное по всей Европѣ и по всей Россіи. Стебель выш. 3—5 вершк., у основанія сильно вѣтвистый, съ линейно-ланцетными листьями; безплодная вѣтви стелющіяся, цвѣтущія — приподнимающіяся. Крупные бѣлые цвѣты собраны рыхлой метелкой. Чашечка 5-тилистная; лепестковъ 5, до середины двураздѣльныхъ, вдвое длиннѣе чашелистиковъ. Тычинокъ 10, столбиковъ 5. Плодъ—цилиндрическая коробочка, раскрывающаяся зубчиками. Цвѣтетъ въ май и въ іюнѣ. Растетъ на лугахъ, поляхъ и между кустарниками.

**Ясколька обыкновенная** (*Cerastium triviale* Link.). Безплодная трава, Укладникъ (Черн.), Цвинтарникъ (Черн.). Однолѣтняя коротко-пушистая железисто-клеякая травка изъ семейства «гвоздичныхъ» (*Caryophyllaceae*), распространенная во всей Европѣ и во всей Россіи, выш. 3—7 вершк., съ стелющимися безплодными и приподнимающимися цвѣтущими вѣтвями. Листья эллиптические или овальные, нижніе — суженные въ черешокъ. Мелкіе бѣлые цвѣты въ довольно густомъ полузонтикѣ. Чашелистиковъ 5; лепестковъ столько-же, обыкновенно немного короче чашелистиковъ. Цвѣтоножки въ 2—3 раза длиннѣе чашечки и послѣ цвѣтенія отогнуты. Тычинокъ 10, столбиковъ 5. Плодъ — цилиндрическая, раскрывающаяся наверху зубчиками коробочка. Цвѣтетъ съ весны до осени. Растетъ на поляхъ и около дорогъ. (Рис. 333.)

**Яскорка**, см. Звѣздчатка лѣсная (*Stellaria nemorum* L.).

**Ясенникъ**, см. Ясенникъ душистый (*Asperula odorata* L.).

**Ясинъ**, см. Ясень (*Jasminum* Tourn.).

**Ясинникъ**, см. Ясинникъ душистый (*Asperula odorata* L.).

**Яминникъ душистый** (*Asperula odorata* L.). Фармацевтическое назв.: *Asperula odorata* s. *Matriisylva*, s. *Hepatica stellata* (Herba). Астера душистая, Звѣздоподручная трава, Звѣздоченная трава, Жасминникъ трава, Благовонная марена, Марена пахучая, Маренка пахуча, Остудникъ (Бесс.), Пахучка, Смолка благовонная, Сывроточная трава. Чай лѣсной, Ясенникъ, Яминникъ. Многолѣтнее травянистое растение изъ семейства «мареновыхъ» (*Rubiaceae* Juss.), распространенное почти во всей Европѣ и почти во всей Россіи. Корневище ползучее.

Стебель прямостоящій, вып. 3 — 5½ вершковъ, съ нижними обратно-яйцевидными и верхними ланцетовидными листьями, сидящими по 6 или по 8 въ мутовкѣ. Бѣлые цвѣты въ полузонтикахъ, собранныхъ на верхушкѣ стебля метелкой. Чашечка незамѣтная; вѣничекъ ворончатый, до середины 4-храздѣльный. Тычиночекъ 4—5. Завязь нижняя 2-хгнѣздная, съ двураздѣльнымъ столбикомъ и съ головчатыми рыльцами. Плодъ сухой, шаровидный, покрытый крючковатыми щетинками. Цвѣтеть въ май и въ юнѣ. Растетъ въ тѣпелыхъ мѣстахъ. Траву, имѣющую въ сухомъ состояніи очень пріятный, характерный запахъ кумарона, употребляютъ для приготовления такъ называемаго «майскаго вина». (Табл. LI, фиг. 292.).

**МЕДИЦИНСКОЕ УПОТРЕБЛЕНІЕ.** Растеніе имѣетъ пріятный, немного горькій вяжущій вкусъ, и содержитъ въ себѣ эфирное масло, горькое вещество и желѣзистое дубильное вещество. Собирается растеніе въ концѣ мая, началѣ юня. Собранное растеніе связывается пучками и высушивается на сквозномъ вѣтрѣ, разрѣзается и сохраняется въ плотно закупоренныхъ банкахъ; пріятный запахъ его появляется постѣ высушиванія.

Трава ясмнинника представляетъ вполнѣ безвредное лекарство; въ настоящее время она врачами не назначается и имѣетъ значеніе только въ домашнемъ быту.

Прежде ее употребляли отъ сердечнаго, желтухи, водянки и при боляхъ внизу живота. Свѣжая трава входитъ въ составъ травянаго леченія. Весенній напитокъ изъ травы ясмнинника приготовляютъ обыкновенно слѣдующимъ образомъ. Горсть свѣжихъ листьевъ ясмнинника заливаютъ двумя бутылками легкаго бѣлаго вина и оставляютъ на ½ часа настаиваться, затѣмъ процеживаютъ и на эту порцію кладутъ около 120 грм. (4 унцѣ) сахара. Въ домашнемъ быту отваръ травы, приготовленный, какъ чай, пьютъ отъ чувства тяжести въ груди и внизу живота.

**Яснодушникъ**, см. Ленъ дикій (*Linaria vulgaris* Mill.).

**Яснотка бѣлая**, см. Крапива глухая (*Lamium album* L.).

**Яснотка пестрая** (*Lamium maculatum* L.). Фармацевтическое названіе: *Lamium Plinii*, s. *Milzadella*. Крапива красная, Крапива глухая, Крапива глуха (Малор.). Окладникъ (Полт.). Многолѣтнее травянистое растеніе изъ семейства «губоцвѣтныхъ» (*Labiatae* Juss.), распространенное почти во всей Европѣ и во всей Россіи, съ короткими подземными побѣгами и крупными цвѣтами въ мутовкахъ при основаніи листьевъ. По общему виду, вышней, формѣ листьевъ походитъ на крапиву глухую (опис. см. выше: Крапива глухая, *Lamium album* L.). Трубочка вѣничка пурпуровая; нижняя губа лиловая съ пурпуровыми пятнами. Цвѣтеть весной и лѣтомъ. Растетъ между кустарниками. Травой въ Малороссіи откармливаютъ индюшатъ.

**МЕДИЦИНСКОЕ УПОТРЕБЛЕНІЕ.** Яснотки известно только въ народѣ. У насъ въ Россіи, въ Полтавской губерніи, растеніе употребляется отъ выхода прямой кишки; въ Италіи имѣетъ дѣять въ народѣ болѣзни седезенія.

**Яснотка пурпуровая** (*Lamium purpureum* L.). Фармацевтическое назв.: *Lamium rubrum* s. *purpureum*. Крапива красная (Умань), Шандра (Умань). Обыкновенная сорная однолетняя трава из семейства «губоцветныхъ» (*Labiatae* Juss.), распространенная во всей Европѣ и во всей Россіи. Стебель восходящій, длиною всего отъ  $2\frac{1}{2}$ — $5\frac{1}{2}$  вершковъ. Нижніе листья маленькіе, округлые, длинно-черешковые, верхніе—коротко-черешковые, сердцевидные, зубчатые. Пурпуровые цвѣты собраны по 6—8 мутовками, сидящими въ углахъ обыкновенныхъ листьевъ и сближенными во время цвѣтенія на верхушкѣ стебля и вѣтвей. Чашечка трубчато-колокольчатая, 5-тизубчатая; вѣнчикъ не крупный, двугубый, съ прямой трубкой, съ верхней по срединѣ выпуклой губой; боковыя лопасти нижней губы съ 2-мя зубцами. Тычинокъ 4; завязь 4-лопастная, 4-хгвѣздная, съ однимъ столбикомъ съ 2-храздѣльнымъ рыльцемъ. Плодъ по созрѣваніи распадается на 4 остро-трехгранныхъ, наверху притупленныхъ орѣшка. Цвѣтетъ съ весны до осени. Произрастаетъ въ садахъ, на поляхъ и огородахъ. (Табл. III фиг. 298.)

**МЕДИЦИНСКОЕ УПОТРЕБЛЕНІЕ.** Цвѣты яснотки пурпуровой употребляются только въ народѣ. Цвѣты растенія съ апрѣля по іюнь, тогда и собираются цвѣты. Цвѣты имѣютъ сладковатый, похожій на медъ, запахъ и слизисто-сладкій вкусъ, содержатъ въ себѣ слизь и сахаръ. Употребляются сушеные цвѣты въ отварѣ, приготовленномъ, какъ чай, отъ маточныхъ болѣзней, истеріи и судорогъ въ животѣ, отъ желтухи, удущья, застарѣлаго кашля, воспаления въ почкахъ и печени, отъ жабы въ горлѣ и отъ носового кровотеченія. Изъ сушеныхъ цвѣтовъ дѣлаютъ примарки.

Въ гомеопатіи спиртная настойка изъ свѣжихъ цвѣтовъ дается отъ безпокойства, безсонницы, глухоты и отъ женскихъ болѣзней. Даютъ 3 капли 1-го разведенія 1—2 раза въ день.

**Яснотка стеблеобъемлющая** (*Lamium amplexicaule* L.). Мята конская (Малор.), Мята кінска (Малор.), Сорная однолетняя трава изъ семейства «губоцветныхъ» (*Labiatae* Juss.), распространенная по всей Европѣ и по всей Россіи; стебель лежащій, дл.  $3\frac{1}{2}$ —7 вершковъ, съ приподнимающимися цвѣтоносными вѣтвями. Листья округло-сердцевидные, нижніе—длинно-черешковые, верхніе—сидячіе, стеблеобъемлющіе. Пурпуровые цвѣты сидятъ по 1—3 въ углахъ листьевъ. Чашечка трубчато-колокольчато-зубчатая, мохнатая; вѣнчикъ съ длинною, тонкою, немного вверхъ согнутою трубкой, въ 3 раза превышающею чашечку, двугубый; верхняя его губа въ срединѣ выпуклая, средняя лопасть нижней губы выемчатая, а боковыя лопасти очень маленькія, ввидѣ острыхъ зубцевъ. Тычинокъ 4. Завязь 4—7-лопастная, 4-хгвѣздная. Столбикъ съ 2-храздѣльнымъ рыльцемъ. Плодъ по созрѣваніи распадается на 4 остро-трехгранныхъ орѣшка, сверху притупленныхъ. Цвѣтетъ съ весны до осени. Растетъ на поляхъ. (Рис. 339.)

**МЕДИЦИНСКОЕ УПОТРЕБЛЕНІЕ** яснотки стеблеобъемлющей то-же, что и яснотки пурпуровой.



Яонушка, см. Звѣздчатка злѣчная (*Stellaria graminea* L.).

Ясокѣрь } см. Осокѣрь обыкновенный (*Populus nigra* L.).

Ясокѣрь } см. Осокѣрь обыкновенный (*Populus nigra* L.).

Ясокѣрь боровой, см. Василекъ перистый (*Centaurea Scabiosa* L.).

Ястребецъ, см. Горлица ястребинковая (*Pieris hieracoides* L.).

Ястребинная трава, см. Цыпчикъ крапчатый (*Achyrophorus maculatus* Scop.).

Ястребинка, см. Ястребинка волосистая (*Hieracium Pilosella* L.).

Ястребинка волосистая (*Hieracium Pilosella* L.). Фармацевтическое названіе: *Pilosella* s. *Auricula muris* (*Radix*, *Flor.* et *Herba*). Бѣлки (Могил.), Волосель (Могил.), Волосатикъ (Кал.), Волосятникъ (Орл.), Горлянка (Якт.), Желтомохорочникъ, Лихорадочная трава, Недозрѣлокъ, Недозрѣлка, Недозрѣлъ, Недоспѣлокъ, Ноготная трава, Нечуй вѣтеръ, Нечуй вѣтеръ (Малор.), Мышь ушко, Соколышка, Ястребинка, Боровые кувшинчики (Влад.), Боров я свеколка (Черн.), Молочай (Кал.). Многолѣтнее травянистое растеніе изъ семейства «сложноцвѣтныхъ» (*Compositae* Adans.), распространенное во всей почти Европѣ, въ Европейск. и Россіи и на Кавказѣ. Корневище пахучее, съ обильными облиственными побѣгами и розеткою прикорневыхъ листьевъ. Стебель безлиственный, выш. до 7 вершковъ, съ одной корзинкой. Листья продолговато-ланцетные, къ основанію суженные, цѣльнокрайніе, сверху зеленые, снизу блѣднѣе-войлочные отъ звѣздчатыхъ волосковъ. Вѣнчикъ язычковый, лимонно-желтый, у краевыхъ цвѣтковъ снѣж. или часто съ красными полосками. Тычинокъ 5; завязь нижняя одногнѣздная, односѣмянная, съ столбикомъ, оканчивающимся 2-храздѣльнымъ рыльцемъ. Плодъ—цилиндрическія сѣмянки съ хохолкомъ изъ простыхъ ломкихъ волосковъ. Цвѣтетъ въ началѣ лѣта. Растетъ на лугахъ, холмахъ и полянахъ. (Рис. 340.)

Медицинское употребленіе, извѣстно только въ народѣ, гдѣ растеніе употребляется отъ бѣшенства и отъ воспаленія глазъ. Кроме того, отваръ сушеной травы, приготовленный, какъ чай, пьютъ отъ кроваваго поноса. Снаружи отваромъ обмываютъ линац или-же полощатъ ротъ для укрѣпленія десенъ.

Въ ветеринарной и народной медицинѣ отваромъ моютъ животныхъ отъ различныхъ болѣзней, въ особенности свиней.

Ястребинка зонтичная (*Hieracium umbellatum* L.). Горькуша (Смол.), Грыжанга (Моск.), Желтянка (Новг.), Желтячка (Нижег.), Желтунецъ (Каз.), Куколь (Нижег.), Каюкъ (Уфим.), Летушка (Сарат.), Логонецъ (Могил.), Молонецъ (Волын.), Пулавка (Тавр.), Курная слѣпота (Волын.), Семитичники (Мог.), Соколышникъ (Мог.), Цикорія полевая (Минск.), Щетовникъ (Вор.). Многолѣтнее травянистое растеніе изъ семейства «сложноцвѣтныхъ» (*Compositae* Adans.), распространенное почти во всей Европѣ и почти во всей Россіи. Стебель выш. 7—29<sup>1</sup>/<sub>2</sub> вершковъ, прямостоящій, вѣтвистый; листья ланцетовидные, узкіе, зубчатые или почти цѣльнокрайніе, верхніе—почти сидячіе, нижніе—короткочерешковые. Верхніе вѣтви метельчатаго соцвѣтія расположены

зонтикомъ. Цвѣты золотисто-желтые, язычковые, въ корзинкахъ. Цвѣтоножки и листья обертокъ у корзиночекъ голые. Тычинокъ 5. Завязь нижняя одногнѣздная, односѣмянная, съ столбикомъ, оканчивающимся 2-храздѣльнымъ рыльцемъ. Плодь—цилиндрическая сѣмянка съ хохолкомъ изъ простыхъ ломкихъ волосковъ. Цвѣтетъ во второй половинѣ лѣта. Растетъ на опушкѣ лѣсовъ, между кустарниками и на холмахъ. Употребляется для крашенія пряжи въ желтый цвѣтъ.

**МЕДИЦИННОЕ УПОТРЕБЛЕНІЕ.** ястребинки зонтичной то-же, что и предыдущей травы. Кромѣ того, отваръ ея считается полезнымъ отъ чахотки, въ Волынской губ. употребляется отъ куринной слѣпоты, въ Казанской изъ нея дѣлають припарки на опухоли.

**Ястребинка стѣнная** (*Hieracium murorum* L.). Фармацевтическое названіе: *Palmatoria gallica*, s. *Auricula muris* major (Herba). Сокольная трава ядовитая, Мышьи уши. Многолѣтнее травянистое растение изъ семейства «сложноцвѣтныхъ» (*Compositae* Adans.), распространенное почти во всей Европѣ, во всей Европейской Россіи, на Кавказѣ и Алтаѣ. Цвѣточный стебель вып. 7—14 верш., усаженный черными железистыми волосками, болшею частью съ нѣсколькими маленькими стеблевыми листьями, рѣже безлистный. Большіе яйцевидные зубчатые прикорневые листья расположены розеткой. Довольно крупныя, желтыя корзинки цвѣтовъ собраны рыхлой щитовидной метелкой. Листья обертокъ у корзиночекъ покрыты сѣроватыми волосками. Цвѣты въ корзинкахъ всѣ язычковые. Тычинокъ 5. Завязь нижняя одногнѣздная, односѣмянная, съ однимъ столбикомъ съ 2-храздѣльнымъ рыльцемъ. Плодь—цилиндрическая сѣмянка съ хохолкомъ. Цвѣтетъ лѣтомъ. Растетъ въ лѣсахъ. (Рис. 341.).

**МЕДИЦИННОЕ УПОТРЕБЛЕНІЕ.** ястребинки стѣнной то-же, что и ястребинки волосистой.

**Ястребка мохнатая**, см. Пазникъ крапчатый (*Achyrocephalus maculatus* Scop.).

**Ястреница**, см. Папайя (*Papaya vulgaris* DC.).

**Ятрышникъ-дремликъ** (*Ophio Machaeranthera* L.). Ветаниха, Дремликъ, Дремликъ собственный, Зезюльки (Малор.), Зезюлины слезы (Екат.), Зминая трава, Кукушница женская, Любо, Люби меня не покинь (Малор.), Салабъ или Салебъ бухарскій, Царь, Царикъ, Царь-трава, Ядрокорень, Ятрышникъ малый. Многолѣтнее травянистое растение изъ семейства «орхидныхъ» (*Orchidaceae* Juss.), распространенное въ средней и южной Европѣ, въ западной и юго-западной Россіи, въ Крыму и на Кавказѣ. Корневые членики шаровидные. Стебель вып. до 5 вершковъ, съ немногими узкими, болшей частью прикорневыми, листьями. Цвѣточный колосъ рыхлый, продолговатый; прицвѣтники пурпуровые, рачные завязи. Околоцвѣтникъ состоитъ изъ 3 наружныхъ и 3 внутреннихъ листочковъ, изъ которыхъ одинъ, отличающійся своею формою, образуетъ широкую 3-лопастную пурпуровую, въ срединѣ болѣе свѣтлую, съ темными крапинками губу, снабженную шпорцемъ. Остальные листочки

тупые пурпуровые, съ зелеными жилками, собранные ввидѣ шлема. Средняя лопасть губы выемчатая. Тычинка 1; лить ея, сросшаясь со столбикомъ, образуетъ колонку (гиностей). Пыльникъ 2-хлѣздный. Завязь нижняя однохлѣздная, съ рыльцемъ, находящимся подъ пыльникомъ на колонкѣ. Плодъ—коробочка. Цвѣтетъ весной. Растетъ на лугахъ и между кустарниками. Въ Бухарѣ корневыя чашечки сушатся, прожариваются, мелятся и настаиваются, какъ кофе. Настояй пьютъ горячіи. Это—возбуждающее средство, которое, однако, расслабляетъ нервы. Высушенные, обыкновенно послѣ предварительнаго кипяченія въ водѣ, корневыя шипки какъ этого вида ятрышника, такъ и нижеописанныхъ, даютъ «салець», употребляющійся, какъ питательное вещество или какъ цѣлебное средство; изъ составныхъ частей салеа значеніе имѣютъ слизь и крахмалъ.

**МЕДИЦИНСКОЕ УПОТРЕБЛЕНІЕ.** всѣхъ видовъ ятрышника основано на ихъ слизистыхъ свойствахъ. Какъ обволакивающее средство, отваръ изъ корней употребляется при всевозможныхъ поносахъ, при боляхъ въ мочевомъ пузырь. Корень, истертый въ порошокъ и смѣшанный съ винограднымъ виномъ, въ народѣ дается женщинамъ отъ кровоточенія; также порошокъ даютъ старикамъ для подкрѣпленія силъ. Для отвара берется 1—2 драхмы (4,0—8,0 грм.) порошка на фунтъ воды или молока. Отваръ пьютъ по чайной чашкѣ 2—3 раза въ день. Также порошокъ варятъ въ вѣдѣ съ сахаромъ, сухими вишнями и друг. плодами. Сумы эти напоминаютъ по вкусу саровые и полезны для выздоравливающихъ. Ятрышникъ малый, см. Ятрышникъ-дремликъ (*Orchis Moerlothii* L.).

**Ятрышникъ мужской** (*Orchis mascula* L.). Кисельный корень, Кукушка (Смол.), Кукушница, Кукушкины слезки, Божья ручка (Могил.), Салець, Сатиръ мужской, Дѣтская трава, Полювы яйца, Яички, Ядрышки. Многолѣтнее травянистое растеніе изъ семейства «орхидныхъ» (*Orchidaceae* Juss.), распространенное въ средней и южной Европѣ и южнѣе въ западной Россіи. Корневыя шипки шаровидныя. Стебель выш. 7—13 вершк., съ прикорневыми широко-ланцетными, обыкновенно пятнистыми листьями. Цвѣточный колосъ рыхлый, продолговатый. Губа околоцвѣтника 3-хлѣздная; лопасти ея широкия, зубчатые. Во всемъ прочемъ схожъ съ вышеописаннымъ видомъ ятрышника—ятрышникомъ-дремликъ. Корневыя шипки имѣютъ запахъ мужского семени, откуда и название «мужской». (Р и с. 342.)

**Ятрышникъ пятнистый**, см. Кукушкины слезки (*Orchis maculata* L.).

**Ятрышникъ широколистный** (*Orchis latifolia* L.). Змиевикъ (Вят.), Зозулины рушнички (Волын.), Кукушки (Малор., Мог., Смол.), Кукушники (Сиб.), Кокошники, Кукушкины дары (Волог.), Кукушкины слезки (Сиб.), Кукавки, Кукулка (Мог.), Кокуй, Кокись, Куколо, Конвалія луговая (Минск.), Любка (Малор.), Любка (Малор.), Любковая зелень (Полт.), Соломонидина ручка, Ускопная трава (Нижег.), Салець, Салсиный ко-

рень, Тоуканъ (Гродн.), Ядовитая трава. Походить на «скукушкины слезки» (*Orchis maculata* L.), опис. которой см. выше, но стебель густо-облиственный, полый, выш.  $5\frac{1}{2}$ —7 вершк. Листья крупнѣе, иногда безъ пятенъ. Цвѣты большіе, лиловые или пурпуровые съ болѣе толстымъ шпорцемъ. Цвѣтеть въ маѣ и въ іюнѣ, растетъ на сырыхъ мѣстахъ и болотахъ. (Р и с. 343.)

**МЕДИЦИННОЕ УПОТРЕБЛЕНІЕ.** то-же, что и ятрышника-дремлика. Въ Вяткѣ корень всѣхъ видовъ ятрышника употребляется для леченія грыжи у дѣтей.

**Ятрышникъ шлемовидный** (*Orchis militaris* L.). Любка, Любка (Малор.), Зозульки, Зозулины слезки, Болотный явникъ. Многолѣтнее травянистое растеніе изъ семейства «орхидныхъ» (*Orchidaceae* Juss.), одинъ изъ наиболѣе крупныхъ видовъ ятрышника, распространенный въ средней Европѣ, въ западной, средней, юго-западной Россіи, въ Крыму, на Кавказѣ и въ Сибири, выш. 7—14 вершк. Корневая шишка яйцевидная. Листья эллиптическіе или широко-ланцетные, скученныя при основаніи стебля. Многочисленные цвѣты снабжены очень маленькими прицвѣтниками и расположены густымъ колосомъ. Всѣ листочки околоцвѣтника, исключая губы, собраны въ видѣ плема; наружные 3 листочка—яйцевидно-ланцетные, острые, розовые. Губа 3-храздѣльная, ярко-пурпуровая, въ серединѣ бѣловатая, съ пурпуровыми крапинками; средняя доля губы раздѣлена на 2 лопасти, между которыми находится зубецъ. Растетъ на лугахъ и между кустарниками.

**Ячмень, см. Ячмень обыкновенный** (*Hordeum vulgare* L.).

**Ячмень двурядный** (*Hordeum distichum* L.). Ячмень Шевалье, Ячмень небесный, Ячмень сибирскій, Египетское жито, ячмень геруанскій, испанскій, кофейный (въ торг.). Отличается сплюснутымъ колосомъ; изъ 3-хъ колосковъ, сидящихъ на каждомъ выступѣ стержня, только средній колосокъ заключаетъ обоеполый цвѣтокъ, приноситъ зерно и снабженъ примостоящею остью; боковые же колоски безплодные, содержатъ по одному тычиночному цвѣтку и лишены остей. Разводится рѣже обыкновеннаго ячменя. (Табл. III, фиг. 299.)

**Ячмень двуклѣй, см. Колоснякъ песчаный** (*Elymus arenarius* L.).

**Ячмень испанскій**  
**Ячмень кофейный**  
**Ячмень небесный** } см. Ячмень двурядный (*Hordeum distichum* L.).

**Ячмень обыкновенный, или четырехрядный** (*Hordeum vulgare* L.). Ячмень, Житаръ, Житоръ (Костр.), Ячминъ (Яросл.), Жито (Арх.), Оргинъ—крупный ячмень особаго рода (Вѣлор.). Однолѣтнее (яровой) и двулѣтнее (озимый) травянистое растеніе изъ семейства «злаковыхъ» (*Gramineae* Juss.). Стебель выш.  $11\frac{1}{2}$ —18 вершк. Колосъ состоитъ изъ одновѣтвистыхъ плодущихъ колосковъ, сидящихъ на выступахъ стержня по 3 мѣстѣ и образующихъ въ продольныхъ рядахъ, изъ которыхъ 2 супротивные (средніе) прижатые къ стержню, а остальные (боковые) 4 ряда выдаются, вслѣдствіе чего колосъ кажется 4-хгран-

нымъ. Створки у колосковъ шиловидныя; наружная—эллиптическая, съ длинною остью. Зрѣлыя зерна заключены въ пленкахъ. Тычинокъ 3; завязь одногнѣздная, односѣмянная, съ 2-мя нитевидными столбиками, несущими перистыя рыльца. Цвѣтетъ лѣтомъ. Культура ячменя простирается на сѣверъ гораздо дальше крайняго предѣла воздѣлыванія другихъ зерновыхъ хлѣбовъ, но онъ обладаетъ короткимъ періодомъ произростанія и довольствуется для созрѣванія сѣмянъ умеренно-теплымъ лѣтомъ. Зерна ячменя идутъ на мѣку, на приготовленіе перловой крупы, солода, ячменнаго кофе, сахара и т. п. (Рис. 344.)

**МЕДИЦИНСКОЕ УПОТРЕБЛЕНІЕ.** Зерна ячменя содержатъ въ себѣ слизистое вещество, которое при развариваніи зеренъ растворяется въ водѣ. Отваръ изъ ячменныхъ крупъ служить для разведенія молока груднымъ дѣтямъ, вскармливаемымъ искусственно и страдающимъ поносомъ. Горсть крупы съ чайною ложку развариваютъ въ стаканѣ кипятка, процеживаютъ и перемѣшиваютъ кормленіемъ ребенка прибавляютъ къ молоку. Количество прибавляемаго отвара вполне зависитъ отъ возраста ребенка: чѣмъ онъ моложе, тѣмъ больше прибавляется отвара. Для мѣсячнаго ребенка берется 1 часть молока и 3 части отвара, затѣмъ понемногу молока прибавляютъ и къ тѣльному молоку переходятъ только къ 7-ми—8-ми мѣсяцамъ. Передъ тѣмъ, какъ давать ребенку, молоко еще разъ кипятятъ вмѣстѣ съ отваромъ. Отваръ легко киснетъ и долженъ ежедневно приготовляться свѣжимъ. Точно такъ-же отваръ ячменя хорошо переносится людьми, страдающими отъ тяжелыхъ болѣзней; мясной бульонъ съ отваромъ перловыхъ крупъ служитъ тоже хорошею питательною пищею.

Ячменная крупа входитъ въ составъ грудного сбора. Изъ ячменнаго солода приготовляютъ пиво и водку. Отваръ ячменнаго солода сильно успокаиваетъ раздражительность кожи и дѣйствуетъ также хорошо на нервную систему. На маленькую ванну для дѣтей берется въ мѣшочкѣ не больше одного фунта солода, для взрослыхъ—отъ 3-хъ до 5-ти фунтовъ, смотря по величинѣ ванны. Солодъ долженъ быть положенъ непременно въ мѣшокъ, который кладется въ ванну и тамъ заливается сначала горячей водою, потомъ холодной, затѣмъ этотъ мѣшокъ хорошо выжимаютъ въ ванну, отчего получается мягкая, слизистая вода. Такъ-же приготовляются ванны изъ пшеничныхъ отрубей.

Ячменная мука имѣетъ то-же примѣненіе, что и другіе сорта муки; снаружи отваръ ея можетъ служить обволакивающимъ средствомъ, уменьшающимъ раздражительность кожи; внутренніе приемы отвара муки дѣйствуютъ такъ-же на слизистыя оболочки.

Докторъ Гугельандъ особенно рекомендуетъ отваръ ячменной муки отъ грудныхъ болѣзней. Хорошій солодовый напитокъ получается при слѣдующемъ приготовленіи: берутъ столовую ложку самой пѣкной солодовой муки, обливаютъ ее литромъ кипятка и оставляютъ на нѣсколько часовъ, чтобы отваръ хорошенько настоялся; потомъ его размѣниваютъ и фильтруютъ. Этотъ густой отваръ муки ячменнаго солода съ пользою можетъ

быть употреблемъ людьми, страдающими геморроемъ, золотухою, каменною болѣзнію, въ особенности-же при страданіи мочевого пузыря. Отваръ легко портится, потому долженъ приготовляться ежедневно свѣжій. Для вкуса въ него прибавляютъ вина и сахара. Хорошая ячменная вода для лихорадочныхъ больныхъ приготовляется слѣдующимъ образомъ: кипятятъ 40—80 грм. ( $1\frac{1}{4}$ — $2\frac{1}{2}$  унц.) перловой крупы минутъ 5 со стаканомъ воды, затѣмъ приливаютъ въ кипящую жидкость еще 2 литра кипятка и все это продолжаютъ кипятить, пока останется половина жидкости; тогда ее процеживаютъ и къ этому отвару прибавляютъ для вкуса другой отваръ, приготовляемый изъ 80 грм. ( $2\frac{1}{2}$  унц.) нарѣзанныхъ вишневыхъ ягодъ, 80 грм. ( $2\frac{1}{2}$  унц.) изюма, которые кипятятся въ 2 литрахъ воды; этотъ отваръ при вареніи тоже выкипаетъ до половины, затѣмъ онъ процеживается и смѣшивается съ отваромъ перловой крупы. Получается пріятный и питательный напитокъ.

Въ ветеринарной медицинѣ ячмень дается животнымъ въ пищу, если замѣчается ихъ исхуданіе—лошадямъ по  $\frac{1}{2}$  кило ( $1\frac{1}{4}$  ф.) 3 раза въ день. Изъ отвара ячменя животнымъ дѣлаютъ паровыя вдыханія отъ сана, крупа и остраго катарра дыхательныхъ путей. Для этого ячмень кипятятъ до тѣхъ поръ, пока всѣ зернышки растрескаются; послѣ этого жидкость невозможно остужаютъ и потомъ даютъ ее вдыхать животнымъ, покрывая имъ чѣмъ-нибудь голову и шею, чтобы животное могло оставаться въ атмосферѣ этихъ паровъ. Также горячія проквашенныя зерна ячменя всыпаются въ мѣшокъ и надеваются животнымъ на голову, какъ обыкновенный мѣшокъ съ овсомъ; вначалѣ животное не ѣстъ, а только вдыхаетъ пары горячихъ зеренъ, а потомъ, когда они остываютъ, оно съѣдаетъ ихъ. Вдыханіе паровъ успокаиваетъ дыхательные пути, а внутреннее употребленіе разваренной крупы дѣйствуетъ хорошо на кишечный каналъ. Ячменное пиво даютъ ослабленнымъ животнымъ для восстановленія силъ напр., коровамъ и кобыламъ во время родовъ. Пиво кипятятъ съ хлѣбомъ и прибавляютъ въ него, смотря по надобности, ароматическихъ веществъ, водки или вина. Для больныхъ овецъ, страдающихъ болѣзнію легкихъ, полезенъ слѣдующій напитокъ: на 50 овецъ берутъ 25 фунтовъ зеренъ поджареннаго ячменнаго солода и кипятятъ ихъ въ 80 литрахъ воды, пока они не размякнутъ, затѣмъ туда прибавляютъ 1 кило ( $2\frac{1}{2}$  ф.) порошка можжевельника и 7,5 грм. (2 драхмы) желѣзнаго купороса; все это процеживаютъ и даютъ вмѣсто питья.

**Ячмень перуанскій**

**Ячмень сибирскій**

**Ячмень четырехрядный**

**Ячмень шевалье**

**Ячмень шестирядный** (*Hordeum pexastichum* L.). Колосъ имѣетъ 6-тигранную форму и состоитъ изъ обособлыхъ плодущихъ колосковъ, расположенныхъ въ 6 одинаково выдающихся рядовъ. Разводится рѣдко. (Рис. 315.)

**Ячмень**, сн. Ячмень обыкновенный (*Hordeum vulgare* L.).

} см. Ячмень двурядный (*Hordeum distachum* L.).

## ДОПОЛНЕНІЯ

къ «Словарю-Травнику и Цвѣтнику».

- Аверьянъ, см. Вадеріана лекарственная (*Valeriana officinalis* L.).  
Адамова голова, см. Василекъ перистый (*Centaurea Scabiosa* L.).  
Адамова голова, см. Спирійъ (*Niscandra physaloides* Gärtn.).  
Альфа, см. Дреза вѣвчяная (*Genista scoraria* Lam. нынѣ *Sarothamnus scorpiatus* Wimm.).  
Анютины глазки, см. Трысунка средняя (*Briza media* L.).  
Аржанецъ, см. Костеръ безостный (*Bromus inermis* Leyss.).  
Аррорутъ бразильскій, см. Кассава (*Manihot utilisima* Pohl.).  
Артишокъ, см. Цикорій обыкновенный (*Cichorium Intybus* L.).  
Асоть, см. Василекъ перистый (*Centaurea Scabiosa* L.).  
Астра полевая, см. Циновникъ обыкновенный (*Chrysanthemum Leucanthemum*).  
Астранція большая, см. Звѣздочка большая (*Astrantia major* L.).  
Аструшка, см. Васильки рогаые (*Delphinium consolida* L.).  
Афанасія, см. Колуферъ (*Tanacetum Balsamita* L.).  
Ахиллея, см. Тысячелестникъ обыкн. (*Achillea Millefolium* L.).  
Бабій цвѣтъ, см. Хатма тюрингск. (*Lavatera thuringiaca* L.).  
Бабишникъ, см. Икотникъ стро-зеленый (*Berteroa incana* De.).  
Бабишникъ плазучей, см. Вербена лекарственная (*Verbena officinalis* L.).  
Бабка, см. Одуванчикъ лекарств. (*Taraxacum Dens Leonis* Desf.).  
Бабка, см. Шалфей поникшій (*Salvia nutans* L.).  
Бабки, см. Кувшинка желтая (*Nuphar luteum* Smith.).  
Бабки, см. Шалфей поникшій (*Salvia nutans* L.).  
Бабки, см. Коровикъ белоцвѣтный (*Verbascum Lychnitis* L.).  
Бабучникъ, см. Агава (*Agave americana* L.).  
Бабушникъ, см. Агава (*Agave americana* L.).  
Бадуйки, см. Череда трехраздѣльная (*Bidens tripartita* L.).  
Бадьянъ дикій, см. Ясенецъ бѣлый (*Dictamnus Fraxinella* Pers.).  
Базилка полевая, см. Душевикъ остролистный (*Calamintha Ainos* Benth.).  
Балабанъ, см. Лапчатка-узицъ (*Potentilla Tormentilla* Schrenk.).  
Балибакъ, см. Хлопчатобумажный кустъ (*Gossypium herbaceum* L.).

Баранникъ горный, см. Арника горная (*Arnica montana* L.).  
 Бархатная травка, см. Жабникъ пошен. (*Filago arvensis* L.).  
 Барашки мохнатые, см. Кошачьи лапки (*Antennaria dioica* Gartin.).

Барашки ржаные, см. Спорынья (*Sclerotium Clavus* Dc.).  
 Барщъ, см. Борщевикъ обыкновен. (*Heraclium sphondylium* L.).  
 Батіг Петрів, см. Цикорій обыкновен. (*Cichorium Intybus* L.).  
 Батовка, см. Ерникъ обыкновенный (*Empetrum nigrum* L.).  
 Батошки, см. Подмаренникъ желтый (*Galium verum* L.).  
 Бебышнякъ, см. Марь ненастоящая (*Chenopodium hybridum* L.).  
 Бедренецъ, см. Валеріана лекарствен. (*Valeriana officinalis* L.).  
 Бедренецъ, см. Черноголовникъ кровоохлебовый (*Trifolium med-  
 dum* L.).

Березка, см. Фиалка собачья (*Viola canina* L.).  
 Баян, см. Тыква кухонная (*Cucurbita maxima* Duch.).  
 Барабола, см. Груша земляная (*Hellanthus tuberosus* L.).  
 Барбора, см. Свербига восточная (*Bunias orientalis* L.).  
 Бересква, см. Бородавникъ обыкновен. (*Lampasana communis* L.).  
 Берестина, см. Ильмъ пробковый (*Ulmus tuberoza* Ehrh.).  
 Берестокъ, см. Ильмъ пробковый (*Ulmus tuberoza* Ehrh.).  
 Берестъ, см. Ильмъ пробковый (*Ulmus tuberoza* Ehrh.).  
 Берсень, см. Крыжовникъ (*Ribes crossularia* L.).  
 Берюза, см. Куманика (*Rubus caestus* L.).  
 Бжанка, см. Тимофеевка (*Phleum pratense* L.).  
 Благовонная трава, см. Колосокъ пахучій (*Anthoxanthum odo-  
 ratum* L.).

Блен та, см. Вехъ ядовитый (*Cicuta Virosa* L.).  
 Блекоть, см. Дятль льсной (*Angelica silvestris* L.).  
 Блекоть, см. Петрушка собачья (*Aethusa Cynapium* L., s. *Cyna-  
 pium Rivini*).  
 Блосота, см. Полей-трава (*Mentha Pulegium* L.).  
 Блошникъ, см. Кочедыжникъ обыкновенный (*Aspidium Filix  
 femina* Bernh.).

Бирюза, см. Куманика (*Rubus ca-sius* L.).  
 Бобильникъ, см. Горлица ястребинковая (*Pieris literacioides* L.).  
 Бобки, см. Кувшинка желтая (*Nuphar luteum* Smith.).  
 Бобковая трава, см. Ярмолистъ (*Zygophyllum Fabago* L.).  
 Бобъ волчій, см. Луцкнъ желтый (*Lupinus luteus* L.).  
 Бобъ египетскій, см. Бадма (*Nelumbium Caspicum* Fisch.).  
 Бобы-волчьи, см. Суеакъ зонтичный (*Butomus umbellatus* L.).  
 Богоодицкая трава, см. Астрагалъ сододколистный (*Astragalus glycyphyllos* L.).  
 Богородичная трава, см. Чистоецъ царскій (*Osmunda rega-  
 lis* L.).

Богунъ душистый, см. Боровикъ (*Daphne Genkium* L.).  
 Бодка, см. Святъ обыкновенная (*Aegorodium Podagraria* L.).  
 Божье дерево дикое, см. Ковиль мошскій (*Ambrosia thymaria* L.).  
 Божья трава, см. Кукушкины слезки или слезы (*Orchis macu-  
 lata* L.).



- Болиголовка, см. Купырь лѣсной (*Anthriscus silvestris* Hoffm.).  
 Болясьникъ, см. Борецъ желтый (*Aconitum lycostonum* L. syn. *Aconitum excelsum* Reisch.).  
 Боровыя котовыя м...ды, см. Клеверъ пашенный или кошачій (*Trifolium arvense* L.).  
 Борода дѣдева, см. Спаржа обыкновен. (*Asparagus officinalis* L.).  
 Борода козья, см. Валериана лекарств. (*Valeriana officinalis* L.).  
 Борода козья, см. Спаржа обыкновенная (*Asparagus officinalis* L.).  
 Борода лѣсова, см. Лишай бородатый (*Usnea barbata* Fries).  
 Борода черная, см. Кочедыжникъ обыкновенный (*Aspidium Filix femina* Bernh.).  
 Борода чертова, см. Козлобродникъ луговой (*Tragopogon pratensis* L.).  
 Борода чертова, см. Спаржа обыкн. (*Asparagus officinalis* L.).  
 Бородка царская, см. Кирказонъ обыкновенный (*Aristolochia clematitis* L.).  
 Борщевникъ, см. Акантъ остролистный (*Acanthus mollis* L.).  
 Борщевникъ, см. Дягиль лѣсной (*Angelica silvestris* L.).  
 Борщовникъ, см. Герань болотная (*Geranium palustre* L.).  
 Борядъ, см. Насточникъ обыкн. (*Vincetoxicum officinale* Moench.).  
 Боръ дикий, см. Лисохвостъ луговой (*Alopecurus pratensis* L.).  
 Боръ дикий, см. Просо колосистое (*Panicum Crus Galli* L.).  
 Брассика, см. Сурфинца (*Brassica Rapa campestris* L.).  
 Братковина, см. Виноградъ обыкновенный (*Vitis vinifera* L.).  
 Бриця, см. Просо колосистое (*Panicum Crus Galli* L., sin *Echinochloa Crus Galli* Beauv.).  
 Бровникъ, см. Офрисъ паукообразный (*Ophrys aranifera* Huds.).  
 Врусника кавказская, см. Черника кавказская (*Vaccinium Arctostaphylos* L.).  
 Врусничникъ журавлиный, см. Клюква болотная (*Oxycoccus palustris* Pers.).  
 Врусняга, см. Врусника (*Vaccinium Vitis Idaea* L.).  
 Вузенчики, см. Касатикъ сибирскій (*Iris sibirica* L.).  
 Будякі, см. Чертополохъ полевой (*Carduus nutans* L.).  
 Будякъ бѣлый, см. Синеголовникъ равнинный (*Eryngium Campestre* L.).  
 Букбонъ, см. Самшитъ обыкновенный (*Buxus sempervirens* L.).  
 Буй, см. Алтей лекарственный (*Althaea officinalis* L.).  
 Буквица, см. Рипинокъ обыкновен. (*Agrimonia Eupatorium* L.).  
 Буквица русская, см. Живучка мохнотая (*Ajuga genevensis* L.).  
 Буквица русская, см. Живучка ползучая (*Ajuga reptans* L.).  
 Буковица дикая, см. Колокольчикъ сибирскій (*Campanula sibirica* L.).  
 Букъ, см. Самшитъ обыкновенный (*Buxus sempervirens* L.).  
 Букшпанъ, см. Самшитъ обыкновенный (*Buxus sempervirens* L.).  
 Букъ, см. Самшитъ обыкновенный (*Buxus sempervirens* L.).  
 Булдовникъ, см. Чертополохъ полевой (*Cirsium arvense* Scop.).  
 Буркунъ желтый, см. Донникъ лекарственный (*Melilotus officinalis* Lam.).

- Бурчевашникъ, см. Сныть обыкн. (*Aegorodium Podagraria* L.).  
 Бурюза, см. Куманика (*Rubus caesius* L.).  
 Бусурманская трава, см. Чертополохъ безстебельный (*Cirsium esculentum* C. A. M., *Cirsium acaule* All., *sibiricum* Ldb.).  
 Выбылектъ, см. Медовникъ (*Galeopsis Tetrahit* L.).  
 Выковникъ, см. Иванъ да Марья (*Melampyrum nemorosum* L.).  
 Былина, см. Полынь полевая (*Artemisia campestris* L.).  
 Быліе, см. Морковь огородная (*Daucus Carota* L.).  
 Вышышникъ, см. Фиалка душистая (*Viola odorata* L.).  
 Бѣлина, см. Таволга рябинолистная (*Spiraea sorbifolia* L.).  
 Бѣлоголовица, см. Пушица обыкновенная (*Eriophorum polystachium* L.).  
 Бѣлоголовникъ, см. Астра солончаковая (*Aster Tripollum* L.).  
 Бѣлоголовникъ, см. Пушица обыкновенная (*Eriophorum polystachium* L.).  
 Бѣлокопытникъ, см. Конитень европ. (*Asarum europaeum* L.).  
 Бѣлокорникъ, см. Астрagalъ бѣлостебельный (*Astragalus dealbatus* Pall., *A. albicaulis* De.).  
 Бѣлокрутка, см. Арнаутка (*Triticum durum* Desf.).  
 Бѣлоталь, см. Ива ушастая (*Salix aurita* L.).  
 Бѣлоуска, см. Пушица обыкн. (*Eriophorum polystachium* L.).  
 Бѣлоцвѣтка, см. Бедренецъ обыкн. (*Pimpinella Saxifraga* L.).  
 Бѣлька, см. Пушица обыкновенная (*Eriophorum polystachium* L.).  
 Бѣлявка, см. Пикульникъ длинноцвѣтный (*Galeopsis Ladanum* L.).  
 Бѣшенная трава, см. Горечавка полевая (*Gentiana campestris* L.).  
 Бѣшенная трава, см. Касатикъ низкій (*Iris pumila* L.).  
 Валдѣрианъ, см. Валеріана лекарственная (*Valeriana officinalis* L.).  
 Валеріана индѣйская, см. Нардъ (*Nardo stachys Jatamansi*, sin *Valeriana Spica* Vahl.).  
 Валеріана красная, см. Шпороцвѣтникъ красный (*Centranthus ruber* DC.).  
 Вамига, см. Вехъ ядовитый (*Cicuta virosa* L.).  
 Ванникъ, см. Ландышъ майскій (*Convallaria majalis* L.).  
 Варихъ, см. Орѣхъ лѣсной (*Corybus Avellana* L.).  
 Василекъ, см. Просвирникъ обыкновен. (*Malva rotundifolia* L.).  
 Васи екъ полевой, см. Колокольчикъ сибирскій (*Campanula sibirica* L.).  
 Василекъ полевой, см. Пикульникъ длинноцвѣтный (*Galeopsis Ladanum* L.).  
 Василекъ полевой, см. Очанка лекарственная (*Euphrasia officinalis* L.).  
 Василекъ степной, см. Шалфей лѣсной (*Salvia silvestris* L.).  
 Василь, см. Бѣлоголовка (*Trifolium montanum* L.).  
 Васильки, см. Амарантъ метельч. (*Amarantus paniculatus* L.).  
 Васильки полевые, см. Черноголовка обыкновенная (*Prunella vulgaris* L.).  
 Ведмѣжье ухо, см. Медвѣжье ухо (*Verbascum Thapsus* L.).  
 Венига, см. Черноталь (*Salix pentandra* L.).  
 Верба, см. Ива ломкая (*Salix fragilis* L.).

- Верба, см. Ива миндальная (*Salix amygdalina* L.).  
 Верба бѣлая, см. Ива бѣлая (*Salix alba* L.).  
 Верболазъ, см. Лоза (*Salix viminalis* L.).  
 Вертуха, см. Гречиха-вьюнокъ (*Polygonum convolvulus* L.).  
 В-сельки, см. Дрема кукушкинъ цвѣтъ (*Lychnis flos cuculi* L.).  
 Бесчанныцъ, см. Колокольчикъ сборн. (*Campanula glomerata* L.).  
 Ветла, см. Ива миндальная (*Salix amygdalina* L.).  
 Ветла бѣлая, см. Ива бѣлая (*Salix alba* L.).  
 Ветловникъ, см. Ива бѣлая (*Salix alba* L.).  
 Вежа мышья, см. Метла, или мышій тернъ (*Ruscus aculeatus* L.).  
 Вехъ, см. Сныть обыкновенная (*Aegorodum Podagraria* L.).  
 Вехъ малый, см. Укропъ конскій (*Oenanthe Phellandrium* L.).  
 Вехъ конскій, см. Звѣздчатка злачная (*Stellaria graminea* L.).  
 Вигонъ, см. Бегонія (*Begonia discolor* R. Br.).  
 Вилки, см. Капуста кочанная (*Brassica oleracea capitata* L.).  
 Вилха, см. Ольха бѣлая (*Alnus incana* Dc.).  
 Виника, см. Виноградъ обыкновенный (*Vitis vinifera* L.).  
 Виноградъ содомскій, см. Сассепарель остъ-индская.  
 Винтерова ложная кора, см. Корица бѣлая (*Canella alba*).  
 Винвача, см. Виноградъ обыкновенный (*Vitis vinifera* L.).  
 Вишни татарскія, см. Жимолость татар. (*Lonicera tatarica* L.).  
 Вишнякъ, см. Вишня степная (*Prunus Chamaecerasus* Jacq.).  
 Віха, см. Вехъ ядовитый (*Cicuta virosa* L.).  
 Вовчки, см. Вшивица болотная (*Pedicularis palustris* L.).  
 Вовчій копѣтъ, см. Купальница европ. (*Trollius europaeus* L.).  
 Вовчукъ, см. Колокольчикъ сибирскій (*Campanula sibirica* L.).  
 Вогникъ, см. Колючникъ обыкновенный (*Carlina vulgaris* L.).  
 Вода синя, см. Пшажникъ черенчатый (*Gladiolus imbricatus* L.).  
 Водозвиздка, см. Болотникъ (*Callitriche verna* L.).  
 Водопьянъ глухой, см. Марь город. (*Chenopodium urbicum* L.).  
 Водяная трава, см. Репяшокъ обыкн. (*Agrimonia Eupatorium* L.).  
 Войница, см. Рдестъ плавающий (*Potamogeton natans* L.).  
 Военская трава, см. Тѣлорѣзъ сабуров. (*Stratiotes aloides* L.).  
 Волжанка, см. Желтолозникъ (*Salix purpurea* L.).  
 Волкана, см. Ясенецъ бѣлый (*Dictamnus Fraxinella* Pers.).  
 Волкоцвѣтъ, см. Ракитникъ золотой дождь (*Cytisus Laburnum* L.).  
 Вологлотка, см. Живучка ползучая (*Ajuga reptans* L.).  
 Володушка, см. Ласковецъ круглолист. (*Bupleur. rotundifol.* L.).  
 Волосатая ручейная трава, см. Рокетъ блестящій.  
 Волосовая, см. Линнея сѣверная (*Linnea borealis* L.).  
 Волосцовая, см. Ланки кошачьи (*Antennaria dioica* Gärtn.).  
 Волосенная трава, см. Горницвѣтъ весенній (*Adonis vernalis* L.).  
 Волохачъ, см. Амарантъ колосистый (*Amarantus retroflexus* L.).  
 Волошки, см. Куколь (*Lychnis Githago* Scop.).  
 Волошки, см. Сушенница болотная (*Gnaphallium uliginosum* L.).  
 Волошнева трава, см. Гладишъ широкол. (*Laserpit. latifol.*).  
 Волчантъ, см. Лушнѣ желтый (*Lupinus luteus* L.).  
 Волчья трава, см. Герань луговая (*Geranium pratense* L.).  
 Вольская трава, см. Подорожникъ ланцет. (*Plant. lanceol.* L.).

- Вольха, см. Ольха бѣлая (*Alnus incana* DC.).  
 Вонючая трава, см. Бурачекъ малый (*Alyssum minimum* L.).  
 Вонючая трава, см. Вехъ ядовитый (*Cicuta virosa* L.).  
 Вонючка, см. Ярмолистъ (*Zygophyllum Fabago* L.).  
 Ворвинокъ, см. Барвинокъ малый (*Vinca minor* L.).  
 Воргунъ, см. Донникъ лекарственный (*Melilotus officinalis* Lam.).  
 Воронецъ дикій, см. Плаунъ живород. (*Lycopodium Selago* L.).  
 Воронковидъ, см. Пузырчатка обыков. (*Urticularia vulgaris* L.).  
 Воронуха, см. Бодякъ разполстный (*Cirsium heterophyllum* All.).  
 Воронушко, см. Пионъ тонколистный (*Paeonia tenuifolia* L.).  
 Вороти-солнце, см. Настурция (*Tropaeolum majus* L.).  
 Вскосуха, см. Облѣпиха обыкн. (*Hippophaë rhamnoides* L.).  
 Вратичъ, см. Пижма (*Tanacetum vulgare* L.).  
 Вротычъ, см. Пижма (*Tanacetum vulgare* L.).  
 Встаниха, см. Ятрышникъ-дремликъ (*Orchis Morio* L.).  
 Выкаконицѣя, см. Истодъ обыкновенный (*Polygala vulgaris* L.).  
 Вымя сучье, см. Медовникъ (*Galopsis Tetrabit* L.).  
 Выспрь, см. Махорка (*Nicotiana rustica* L.).  
 Выхляemelъ, см. Чина клубнен. сная (*Lathyrus tuberosus* L.).  
 Вышилинникъ, см. Подорожникъ ланцет. (*Plant. lanceol.* L.).  
 Вышповецъ, см. Полынь степная (*Linostiris villosa* H. et B.).  
 Вязель, см. Горошекъ заборный (*Vicia sepium* L.).  
 Вязель, см. Чечевица четырехгранная (*Ervum tetraspermum* L.).  
 Вязель, см. Чина луговая (*Lathyrus pratensis* L.).  
 Вязель-трава, см. Подмаренникъ мягкій (*Gallium Mollugo* L.).  
 Вязиль, см. Люцерна серповидная (*Medicago falcata* L.).  
 Вязиль, см. Чина луговая (*Lathyrus pratensis* L.).  
 Вязинникъ, см. Лоза (*Salix viminalis* L.).  
 Вязникъ, см. Кермекъ татарскій (*Statice tatarica* L.).  
 Вязовика, см. Вязъ обыкновенный (*Ulmus esula* Willd.).  
 Вязъ, см. Илъмъ горный (*Ulmus montana* With.).  
 Въникъ царскій, см. Метла (*Ruscus aculeatus* L.).  
 Вѣтряная трава, см. Вѣлголовка (*Trifolium montanum* L.).  
 Грабина, см. Рябина обыкновенная (*Sorbus Aucuparia* L.).  
 Грабина, см. Грабъ обыкновенный (*Carpinus Betulus* L.).  
 Грабли потайныя, см. Аистникъ цукт. (*Erod. cicutarium* L.).  
 Градзилать, см. Гравилать городской (*Geum urbanum* L.).  
 Гратниное дерево, см. Гранатов. дерево (*Punica Granat.* L.).  
 Граціолея, см. Авранъ лекарственный (*Gratiola officinalis* L.).  
 Гребенникъ, см. Гравилать волыной (*Geum rivale* L.).  
 Гребинникъ, см. Гравилать городской (*Geum urbanum* L.).  
 Гречина трава, см. Тысячелист. обыков. (*Achillea Millefol.* L.).  
 Гречишникъ, см. Земляные орѣшки (*Speraea filipendula* L.).  
 Гржимотникъ, см. Дивала многолѣтняя (*Scleranthus perennis* L.).  
 Грожде, см. Виноградъ обыкновенный (*Vitis vinifera* L.).  
 Грозникъ мужской, см. Наголоватокъ красн. (*Jurinea cyan.* R.).  
 Грудна-травка, см. Млбникъ пашенный (*Filago arvensis* L.).  
 Грудная трава, см. Тысячелист. обыков. (*Achillea Millefol.* L.).  
 Грудница, см. Полынь степная (*Linostiris villosa* Hook et Benth.).

- Грудница, см. Ромашка собачья (*Maruta cotula* Dc.).  
 Грудничникъ, см. Полынь степная (*Linostiris villosa* H. et B.).  
 Груднишникъ, см. Просвирникъ обыкновен. (*Malva rotundifolia* L.).  
 Група, см. Окопникъ лекарственный (*Symphytum officinale* L.).  
 Грушка травяная, см. Василетникъ желт. (*Thalictr. flav.* L.).  
 Грушовка, см. Грушанка круглолистная (*Pirola rotundifolia* L.).  
 Грыжанта, см. Ястребинка зонтичная (*Hieracium umbellatum* L.).  
 Грыжная трава, см. Тысячелистн. обыкновен. (*Achillea Millefol.* L.).  
 Губмора, см. Орлякъ обыкновенный (*Pteris aquilina* L.).  
 Гуголь, см. Куколь (*Lychnis Githago* Scop.).  
 Гулена, см. Картофель (*Solanum tuberosum* L.).  
 Гурки, см. Огурецъ огородный (*Cucumis sativus* L.).  
 Гусеничникъ, см. Горчица дикая (*Eruca sativa* Dc.).  
 Гусиная плоть, см. Очитокъ острый (*Sedum acre* L.).  
 Гусиная трава, см. Колокольчикъ крапивод. (*Campan. Trach.* L.).  
 Гусиникъ, см. Марь настоящая (*Chenopodium hybridum* L.).  
 Гусиница, см. Чина весенняя (*Orobis vernus* L.).  
 Гавязъ, см. Чернокорень лекарств. (*Cynoglossum officinale* L.).  
 Гавязъ, см. Ласточкинъ обыкн. (*Vincetoxicum officinale* Moench.).  
 Гавясъ, см. Окопникъ лекарственный (*Symphytum officinale* L.).  
 Гаиръ, см. Аиръ обыкновенный (*Acorus calamus* L.).  
 Гайстра, см. Астра садовая (*Aster chinensis* Nees.).  
 Галарена, см. Брюква (*Brassica Napus* L.).  
 Ганусъ, см. Кунырь лѣсной (*Anthriscus silvestris* Hoffm.).  
 Гарбузъ, см. Тыква обыкновенная (*Cucurbita Pepo* L.).  
 Гарбузы, см. Тыква обыкновенная (*Cucurbita Pepo* L.).  
 Гаря сини, см. Эспарсеть кормовой (*Onobrichis sativa* Lam.).  
 Гачушъ, см. Анисъ настоящий (*Pimpinella Anisum* L.).  
 Гашува, см. Фалка ночная обыкновен. (*Hesperis matronalis* L.).  
 Гвиembra, см. Орлякъ обыкновенный (*Pteris aquilina* L.).  
 Гвоздики полевые, см. Луговая красильн. (*Anthemis tinct.* L.).  
 Гвоздичная трава, см. Костенецъ зонтич. (*Holosteum umbel.* L.).  
 Геванъ, см. Самшитъ обыкновенный (*Buxus sempervirens* L.).  
 Гира, см. Анетникъ цикутный (*Erodium cicutarium* L.).  
 Гирка, см. Пшеница обыкновенная (*Triticum vulgare* Vill.).  
 Гирча петрушечная, см. Петрушка горн. (*Peucedanum Oreosel.*).  
 Гирчакъ, см. Вязель разноцвѣтный (*Coronilla varia* L.).  
 Гирчакъ, см. Перечникъ широколистный (*Lepidium latifolium* L.).  
 Гирчакъ богородичный, см. Перець водяной.  
 Гирчъ, см. Горичникъ болотный (*Peucedanum palustre* Moench.).  
 Глаза сорочьи, см. Купена лекарств. (*Convallaria Polygonat.* L.).  
 Глазки волчьи, см. Волдырьникъ ягод. (*Cucubalis baccifer.* L.).  
 Глашникъ, см. Лисохвостъ луговой (*Alopecurus pratensis* L.).  
 Глекопаръ, см. Чистотѣль большой (*Chelidonium majus* L.).  
 Глечики жовті, см. Кувшинка желтая (*Nuphar luteum* Smith.).  
 Глечичокъ, см. Кувшинка желтая (*Nuphar luteum* Smith.).  
 Глидъ, см. Боярышникъ одноястич. (*Crataegus monogyna* Jacq.).  
 Глиникъ, см. Альфа (*Lygeum Spartum* Loefl.).  
 Глинчакъ, см. Альфа (*Lygeum Spartum* Loefl.).

- Глинчакъ волокнистый, см. Альфа (*Lygeum Spartum* Loefl.).  
 Глинистая трава, см. Жирянка обыкновенная (*Pinguicula vulgaris* L.).  
 Глодь } см. Боярышникъ однопестичный (*Crataegus*  
 Глодь лѣсной } *monogyna* Jacq.).  
 Гломуша, см. Дурманъ вонючій (*Datura Stramonium* L.).  
 Глотиха, см. Черемуха (*Prunus Padus* L.).  
 Глоточная трава, см. Мелкопестичникъ ѣдкій (*Erigeron acris* L.).  
 Глотуха, см. Черемуха (*Prunus Padus* L.).  
 Глухарь, см. Бѣлый грибъ боровикъ (*Boletus edulis* Bull.).  
 Глуховникъ боровой, см. Золотая розга (*Solidago virgaurea* L.).  
 Глушины, см. Дрема кукушкинъ цвѣтъ (*Lychnis flos cuculi* L.).  
 Гобязь, см. Чернокорень лекарственный (*Cynoglossum officinale* L.).  
 Голова ежова, см. Ежеголовка вѣтвистая (*Sparganium ramosum* L.).  
 Голова песья, см. Норичникъ водяной (*Scrophularia aquatica* L.).  
 Голова пѣтушья, см. Эспарсеть кормовой (*Onobrychis sativa* L.).  
 Головашникъ, см. Визель разноцвѣтный (*Coronilla varia* L.).  
 Головинки, см. Черноголовка обыкновенная (*Prunella vulgaris* L.).  
 Головишникъ, см. Частуха обыкновенная (*Alisma Plantago* L.).  
 Головка южача, см. Ежеголовка вѣтвистая (*Spargan. ramos.* L.).  
 Головки чертовы, см. Гравилатъ водяной (*Geum rivale* L.).  
 Головникъ, см. Бѣлоглавка (*Trifolium montanum* L.).  
 Головня, см. Плевель одуряющій (*Lolium temulentum* L.).  
 Головоломъ, см. Плевель одуряющій (*Lolium temulentum* L.).  
 Голотуха, см. Черемуха (*Prunus Padus* L.).  
 Голубецъ, см. Голубика (*Vaccinium uliginosum* L.).  
 Голубиные звончики, см. Кудри паркия (*Lilium Martagon* L.).  
 Голька, см. Бухарникъ шерстистый (*Holcus lanatus* L.).  
 Гоми, см. Дурра (*Sorghum vulgare* Pers.).  
 Гонбавель, см. Подбѣль (*Andromeda polifolia* L.).  
 Гонощи, см. Бутень клубненосный (*Chaerophyllum bulbosum* L.).  
 Гоньба, см. Легочница лекарственная (*Pulmonaria officinalis* L.).  
 Горецвѣтъ, см. Морозникъ бѣлоцвѣтный (*Helleborus niger* L.).  
 Горецвѣтъ, см. Морозникъ бѣлоцвѣтный (*Helleborus niger* L.).  
 Горечавка, см. Касатикъ сибирскій (*Iris sibirica* L.).  
 Горешокъ, см. Клеверъ средний (*Trifolium medium* L.).  
 Горицвѣтъ, см. Ледвенецъ рогатый (*Lotus corniculatus* L.).  
 Горицвѣтъ, см. Смолка (*Lychnis Viscaria* L.).  
 Горицвѣтъ, см. Девясиль изволнестный (*Inula salicina* L.).  
 Горішки, см. Клеверъ луговой, или полевнй (*Trifolium pratense* L.).  
 Горішки, см. Клеверъ бѣлый ползучій (*Trifolium repens* L.).  
 Горлачики, см. Колокольчикъ круглолистный (*Campanula rotund.* L.).  
 Горловая трава, см. Лапчатка серебристая (*Potentilla argentea* L.).  
 Горловая трава, см. Ленъ дикий (*Linaria vulgaris* Mill.).  
 Горловка, см. Лапчатка серебристая (*Potentilla argentea* L.).  
 Горлянка, см. Сушеница болотная (*Gnaphalium uliginosum* L.).  
 Горлянка волосовая, см. Незабудка болотная (*Myos. palustr.* W.).  
 Горобинецъ, см. Рогоза узколистная (*Typha angustifolia* L.).  
 Горобынникъ, см. Рогоза широколистная (*Typha latifolia* L.).  
 Городецвѣтная трава, см. Купена лекарственная (*Conval. Polyg.* L.).

- Гороховое дерево вешнее, см. Чина весен. (*Orobus vernus* L.).  
 Горохъ горобинный, см. Чина всенняя (*Orobus vernus* L.).  
 Горохъ мышиный, см. Астрagalъ луг. (*Astragalus Hypogl.* L.).  
 Горохъ сибирекій, см. Акація желтая (*Caragana arborescens* L.).  
 Горошекъ дикій, см. Чина луговая (*Lathyrus pratensis* L.).  
 Гортанная жабная трава } см. Черноголовка обыкновенная  
 Гортанная трава } (*Prunella vulgaris* L.).  
 Гортохли, см. Картофель (*Solanum tuberosum* L.).  
 Горушица, см. Горчица черпая (*Sinapsis nigra* L.).  
 Горчакъ, см. Хмель обыкновенный (*Humulus Lupulus* L.).  
 Горчица, см. Перець водяной (*Poligonum Hydropter* L.).  
 Горчица бѣлая садовая, см. Горчица дикая (*Eruca sativa* Dc.).  
 Горчица лубеньска, см. Сурѣница (*Brassica Rapa campestris* L.).  
 Горшечное дерево, см. Салъ кой (*Lecythis Ollaria* L.).  
 Гостівникъ, см. Гераць кровавo-красная (*Geranium sanguin.* L.).  
 Далія, см. Георгина (*Dahlia Cav.*)  
 Двужернянка, см. Эммеръ (*Triticum dicoceum* Schrenk.).  
 Двумлистникъ, см. Яромлнсть (*Zygophyllum Fabago* L.).  
 Дебитъ, см. Виноградъ обыкновенный (*Vitis vinifera* L.).  
 Девесиль, см. Ломоносъ прямой (*Clematis recta* L.).  
 Девятильникъ благовонный, см. Кадуферъ (*Tanacetum* L.).  
 Дегтярка, см. Смолка (*Lychnis viscaria* L.).  
 Декокопъ, см. Осока мохнатая (*Carex hirta* L.).  
 Декоктъ полевой, см. Чина лѣсная (*Lathyrus silvestris* L.).  
 Декопъ, см. Осока мохнатая (*Carex hirta* L.).  
 Дерганцы, см. Конопля посѣвная (*Cannabis sativa* L.).  
 Дерево волчье, см. Крушина ломкая (*Rhamnus frangula* L.).  
 Дерево гороховое, см. Акація желтая (*Caragana arborescens* L.).  
 Деривій женскій, см. Тысячелист. обыкнов. (*Achillea Miller.* L.).  
 Дерево кадильное, см. Жизненное дерево (*Thuja occidentalis* L.).  
 Дерево красильничье, см. Сумахъ красильный (*Rhus Coriaria* L.).  
 Дерево красное, см. Акажу дерево (*Swietenia Mahagoni* L.).  
 Дерево кустарное, см. Жасминъ дикій (*Philadelphus coron.* L.).  
 Дерево остролистное, см. Падубъ обыкн. (*Ilex aquifolium* L.).  
 Дерево свороборинное, см. Шиповникъ (*Rosa canina* L.).  
 Дерево чашковое, см. Кизильникъ обыкн. (*Cotoneaster vulg.* Lin.).  
 Дерюжка лягушечья, см. Ряска малыньк. (*Lemna minor* Schl.).  
 Дерябка, см. Липучка репейчатая (*Echinosperrum Lappula* Lehm.).  
 Дерябка, см. Подмаренникъ цѣпкій (*Galium Aparine* L.).  
 Джакъ-тіана, см. Репяшокъ обыкн. (*Agrimonia Eupatorium* L.).  
 Джугара, см. Дурра (*Sorghum vulgare* Pers.).  
 Джурмутка, см. Люцерна посѣвная (*Medicago sativa* L.).  
 Дзарага, см. Пл. унь булавиный (*Lycopodium clavatum* L.).  
 Дзвонецъ, см. Погremoкъ обыкн. (*Rhinanthus Crista Galli* L.).  
 Дзвонки, см. Горечавка крупная (*Gentiana pneumonanthe* L.).  
 Дзвончики, см. Колокольч. крапивол. (*Campanula Trachel.* L.).  
 Дзенцѣлина, см. Клеверъ луговой (*Trifolium pratense* L.).  
 Дзиберъ, см. Богородская трава (*Thymus Serpyllum* L.).  
 Дзѣгиль, см. Дягиль лѣсной (*Angelica silvestris* L.).

Диванка, см. Коровякъ бѣлоцвѣтный (*Verbascum Lychnitis* L.).  
 Див-дерево, см. Дурманъ вонючій (*Datura Stramonium* L.).  
 Дигель, см. Дягиль лѣсной (*Angelica silvestris* L.).  
 Дидиль, см. Кислица обыкновенная (*Oxalis acetosella* L.).  
 Дикарка, см. Частуха обыкновенная (*Alisma Plantago* L.).  
 Динька, см. Виноградъ обыкновенный (*Vitis vinifera* L.).  
 Длинноколѣнка, см. Вѣнчикъ вѣтвист. (*Antheric. ramos.* L.).  
 Подельникъ, см. Свербѣга восточная (*Bunias orientalis* L.).  
 Донникъ, см. Иванъ-чай (*Epilobium angustifolium* L.).  
 Дорогая трава, см. Осока мохнатая (*Carex hirta* L.).  
 Превожость, см. Жимолость обыкновен. (*Lonicera Xylosteum* L.).  
 Према кошачья, см. Купальница европ. (*Trollius europaeus* L.).  
 Према куриная, см. Рѣдка дикая (*Raphanus Raphanistrum* L.).  
 Премликъ, см. Гайникъ широколистный (*Epipactis latifolia* Sw.).  
 Премликъ, см. Пыльцеголовникъ красн. (*Cephalanthera rubra* R.).  
 Прокъ, см. Душица обыкновенная (*Origanum vulgare* L.).  
 Простъ, см. Перецъ водяной (*Polygonum Hydropiper* L.).  
 Прягель, см. Булавница желтая (*Clavaria flava* Pers.).  
 Дубинникъ, см. Булавница желтая (*Clavaria flava* Pers.).  
 Дубовка, см. Дубровка (*Veronica Chamaedrys* L.).  
 Дубровникъ, см. Лапчатка серебристая (*Potentilla argentea* L.).  
 Дубровникъ, см. Полѣска однолѣтняя (*Mercurialis annua* L.).  
 Дубъ каменный, см. Утесникъ обыкновен. (*Ulex europaeus* L.).  
 Дубъ старый, см. Василестникъ голубк. (*Thalictr. aquileg.* L.).  
 Дубъ-трава, см. Артемизія (*Artemisia Abrotanum* L.).  
 Дудка, см. Купырѣ лѣсной (*Anthriscus silvestris* Hoffm.).  
 Дудчатая трава, см. Зоря садовая (*Levisticum officinale* Koch.).  
 Дурманъ, см. Серпуха вѣнчосная (*Serratula Coronata* L.).  
 Душистая трава, см. Колосокъ пахучій (*Anthoxanth. odorat.* L.).  
 Дындедерево, см. Амарантъ метельч. (*Amarantus paniculatus* L.).  
 Дынное дерево, см. Смоковница обыкновенная (*Ficus Carica* L.).  
 Дѣванка, см. Медвѣжье ухо (*Verbascum Thapsus* L.).  
 Дѣванная трава, см. Коровякъ черный (*Verbascum nigrum* L.).  
 Дѣвина, см. Медвѣжье ухо (*Verbascum Thapsus* L.).  
 Дѣдова-трава, см. Плакунъ-трава (*Lythrum Salicaria* L.).  
 Дѣдовникъ, см. Колочникъ обыкновенный (*Carlina vulgaris* L.).  
 Дѣдовникъ, см. Чертополохъ ланцетовид. (*Cirsium lanceolat.* Sc.).  
 Дѣдовникъ дикій, см. Чертополохъ болот. (*Cirsium palustre* Sc.).  
 Дѣтская трава, см. Фіалка ночная (*Platanthera bifolia* Rich.).  
 Дѣтская трава, см. Ятрышникъ мужской (*Orchis mascula* L.).  
 Дягель, см. Дягиль лекарственный (*Angelica Archangelica*).  
 Дягило, см. Ласточкинъ об. кн. (*Vincetoxicum officinale* Moench.).  
 Дягиль мелкій роменный, см. Дягиль лѣсн. (*Angel. silv.* L.).  
 Дягиль, см. Борщевикъ обыкновен. (*Heracleum sphondylium* L.).  
 Дягильникъ, см. Бедренецъ обыкновен. (*Pimpinella saxifraga* L.).  
 Дягильникъ, см. Борщевикъ обыкновен. (*Heracleum sphondylium* L.).  
 Дятельникъ, см. Иванъ-чай (*Epilobium angustifolium* L.).  
 Дятлина пѣтушья, см. Эспарсета кормов. (*Onobrychis sativa* L.).  
 Египетская трава, см. Памирусъ (*Cyperus Papyrus* L.).



- Ежовникъ, см. Падубъ обыкновенный (*Plex aquifolium* L.).  
 Елиной-цвѣтъ, см. Вербейникъ обыкн. (*Lysimachia vulgaris* L.).  
 Елочка, см. Гулявникъ стручатый (*Sisymbrium Sophia* L.).  
 Ель, см. Кедръ ливанскій (*Pinus Cedrus* L.).  
 Ерникъ березовый, см. Береза призем. (*Betula humilis* Schrk.).  
 Жабра-трава, см. Татарникъ колючій (*Onopordon Acanthium* L.).  
 Жабрей, см. Буквица лекарственная (*Betonica vulgaris* L.).  
 Жабурникъ, см. Водокрасъ лягушечій (*Hydrocharis Morsus* L.).  
 Жавинникъ, см. Куманика (*Rubus caesius* L.).  
 Жаровецъ, см. Вѣйникъ наземный (*Calamogrostis Epigeios* Roth.).  
 Желтожилъе, см. Крестовникъ тонколист. (*Senecio erucaefol.* L.).  
 Желтолохорочникъ, см. Ястребника волос. (*Hierac. Pilos.* L.).  
 Желтушникъ, см. Марьянникъ гребенч. (*Melampyr. cristat.* L.).  
 Желтяница, см. Цминъ (*Helychrisum arenarium* Dc.).  
 Желѣзнякъ полевой, см. Колокольчикъ жестковолосый.  
 Жемчугъ, см. Лукъ обыкновенный (*Allium Cera* L.).  
 Жердели, см. Персикъ (*Amygdalis persica* L.).  
 Жеребчикъ, см. Люцерна серповидная (*Medicago falcata* L.).  
 Жерить, см. Крушина слабительная (*Rhamnus cathartica* L.).  
 Жерновцы, см. Занникъ клубненосный (*Phlomis tuberosa* L.).  
 Жеруха, см. Марьянникъ луговой (*Melampyrum pratense* L.).  
 Жесторъ, см. Крушина слабительная (*Rhamnus cathartica* L.).  
 Живая трава, см. Водякъ разнолист. (*Cirsium heterophyl.* Ail.).  
 Живостокъ, см. Окопникъ лекарств. (*Symphytum officinale* L.).  
 Животная, см. Полынь полевая (*Artemisia campestris* L.).  
 Животникъ, см. Вербейникъ обыкн. (*Lysimachia vulgaris* L.).  
 Живучая трава, см. Тысячелист. обыкн. (*Achillea Millef.* L.).  
 Жилига, см. Рдестъ плавающий (*Potamogeton natans* L.).  
 Жидовникъ, см. Жидовникъ обыкновенный (*Tamarix gallea* L.).  
 Жидовское кресло, см. Чертополохъ болот. (*Cirsium pal. Sc.*).  
 Жимолосука, см. Жимолость татарская (*Lonicera tatarica* L.).  
 Жиравлина, см. Вика (*Vicia sativa* L.).  
 Жирбій, см. Болякъ сѣрый (*Cirsium canum* M. B.).  
 Жиръ водяной, см. Бѣлогловка (*Trifolium montanum* L.).  
 Житвенникъ, см. Жидовникъ обыкн. (*Tamarix gallea* L.).  
 Житничка, см. Дыманка лекарственная (*Fumaria officinalis* L.).  
 Жито египетское, см. Ячмень двурядный (*Hordeum disach.* L.).  
 Жманъ, см. Цминъ (*Helychrisum arenarium* Dc.).  
 Жовтушки, см. Цминъ (*Helychrisum arenarium* Dc.).  
 Жолтенецъ, см. Цминъ (*Helychrisum arenarium* Dc.).  
 Жостыль, ст. Смородина красная (*Ribes rubrum* L.).  
 Жость, см. Вирючина (*Ligustrum vulgare* L.).  
 Жуланъ, см. Чай китайскій (*Thea chinensis* Sims.).  
 Журавика, см. Клюква болотная (*Oxycoccus palustris* Pers.).  
 Журавиха, см. Клюква болотная (*Oxycoccus palustris* Pers.).  
 Журавлинникъ, см. Многоножка тройч. (*Polypodium dryopt.* L.).  
 Журавленникъ мужской, см. Герань кроваво-красная.  
 Жутвенная трава, см. Костеръ мягкій (*Bromus mollis* L.).  
 Заборина, см. Заря садовая (*Levisticum officinale* Koch.).

- Зайчики, см. Чертополох болотный (*Cirsium palustre* Scop.).  
 Заломъ, см. Сусеница болотная (*Gnaphalium uliginosum* L.).  
 Занкель, см. Жирянка обыкновенная (*Pinguicula vulgaris* L.).  
 Зановить, см. Звѣробой обыкновен. (*Hypericum perforatum* L.).  
 Запонки, см. Кувшинка желтая (*Nuphar luteum* Smith.).  
 Запорная трава, см. Тимофеевка (*Phleum pratense* L.).  
 Зараза водяная, см. Болотница канадская (*Elodea canad.* Rich.).  
 Заря, см. Колокольчикъ жестковолосый (*Campanula cervicaria* L.).  
 Засадиha, см. Черемуха (*Prunus Padus* L.).  
 Заячники, см. Клеверъ пашенный (*Trifolium arvense* L.).  
 Заячникъ, см. Дубровка (*Veronica Chamaedrys* L.).  
 Заячья трава, см. Заячникъ клубненосный (*Phlomis tuberosa* L.).  
 Заячья трава, см. Заячья капуста (*Sedum Telephium* L.).  
 Заячій холодокъ, см. Донникъ лекарственный (*Mellilot. officin.*).  
 Збанечки, см. Голубки обыкновенные (*Aquilegia vulgaris* L.).  
 Збанъ къ, см. Кувшинка желтая (*Nuphar luteum* Smith.).  
 Збаночекъ, см. Колокольчикъ круглолист. (*Campan. rotundif. L.*).  
 Збаночки, см. Кувшинка желтая (*Nuphar luteum* Smith.).  
 Збаночки, см. Колокольчикъ персиколлист. (*Campan. persicif. L.*).  
 Зборъ, см. Подмаренникъ болотный (*Gallium palustre* L.).  
 Зборъ, см. Хлопушка (*Silene inflata* Smith.).  
 Звонка, см. Колокольчикъ персиколлист. (*Campanula persicifol. L.*).  
 Звонки, см. Вьюнокъ заборный (*Convolvulum sepium* L.).  
 Звонки, см. Голубки обыкновенные (*Aquilegia vulgaris* L.).  
 Звонки, см. Горечавка крупная (*Gentiana pneumonanthe* L.).  
 Звонки, см. Колокольчикъ крапиволистный (*Campan. Trachel. L.*).  
 Звонецъ, см. Марьянникъ полевой (*Melampyrum arvense* L.).  
 Звонецъ, см. Погremoкъ обыкн. (*Rhinanthus Crista Galli* L.).  
 Звонецъ болотный, см. Колокольчикъ раскид. (*Campan. pat. L.*).  
 Звонецъ луговой, см. Иванъ да Марья (*Melampyr. nemoros. L.*).  
 Звонецъ-сковородка, см. Погremoкъ обыкн. (*Rhinant. Cr. Gal. L.*).  
 Звоники, см. Колокольчикъ персиколлистный (*Campan. persicif. L.*).  
 Звоники желтые, см. Ленъ дикий (*Linaria vulgaris* Mill.).  
 Звонокъ, см. Колокольчикъ раскидистый (*Campanula patula* L.).  
 Звонокъ, см. Колокольчикъ сборный (*Campanula glomerata* L.).  
 Звонокъ, см. Погremoкъ обыкн. (*Rhinanthus Crista Galli* L.).  
 Звонокъ кудлатый, см. Колокольчикъ жестковолосый (*Campanula cervicaria* L.).  
 Звонокъ лѣсовой, см. Колокольч. персикол. (*Campan. persicif. L.*).  
 Звоночки, см. Колокольчикъ раскидистый (*Campanula pat. L.*).  
 Звѣздочная трава, см. Манжетка обыкн. (*Alchemilla vulgar. Mill.*).  
 Звѣздочка, см. Звѣзчатка злачная (*Stellaria graminea* L.).  
 Звѣздочка водяная, см. Болотникъ (*Callitriche verna* L.).  
 Звѣробой высокій, см. Молочай высокій (*Euphorb. procera* M. B.).  
 Звѣробой желтый, см. Бузульникъ сибир. (*Ligularia sibir. C.*).  
 Звѣробой степной, см. Кнафликъ (*Verbascum Blattaria* L.).  
 Здоровая трава, см. Подбѣльникъ европ. (*Sanicula europaea* L.).  
 Безюльки, см. Ятрышникъ-дремликъ (*Orchis morio* L.).  
 Зеленика, см. Буксъ (*Buxus sempervirens* L.).

- Зеленица, см. Тиссъ обыкновенный (*Taxus baccata* L.).  
 Зеленица луговая, см. Серпуха вѣнценос. (*Serratula coron. L.*).  
 Зеленичье дерево, см. Буксъ (*Buxus sempervirens* L.).  
 Зеле-коце, см. Костяника (*Rubus saxatilis* L.).  
 Зелье совиное, см. Звѣздчатка большая (*Stellaria Holostea* L.).  
 Зелье ужаще, см. Кровохлебка лекарств. (*Sanguisorba officin. L.*).  
 Зелье урочное, см. Звѣздчатка злачная (*Stellaria graminca* L.).  
 Зелье черное, см. Норичникъ узловатый (*Scrophularia nodosa* L.).  
 Зельечко вонючее, см. Клоповникъ (*Lepidium ruderale* L.).  
 Зеницвѣтъ, см. Цминъ (*Helychisum arenarium* Dc.).  
 Зерна райскія, см. Перець малагуетскій (*Amonnuna Melegueta.*)  
 Зерликъ, см. Многоножка обыкновенная (*Polypodium vulgare* L.).  
 Зиноватъ, см. Дрокъ нѣмецкій (*Genista germanica* L.).  
 Зиновія, см. Иванъ да Марья (*Melampyrum nemorosum* L.).  
 Зимозеленка, см. Грушанка однобокая (*Pirola secunda* L.).  
 Зимозель, см. Грушанка однобокая (*Pirola secunda* L.).  
 Зирочки, см. Анютины глазки (*Viola tricolor* L.).  
 Зимовикъ, см. Майникъ двулистный (*Majanthemum bifolium* L.).  
 Златоглавъ, см. Сарана лѣсная (*Lilium spectabile* Link.).  
 Златоволоска, см. Лилія красная (*Lilium bulbiferum* L.).  
 Злосчастная, см. Щавель конскій (*Rumex domesticus* L.).  
 Зминда, см. Жминда лозная (*Blitum virgatum* L.).  
 Зминда, см. Ширей-амарантъ обыкновен. (*Amarantus Blitum* L.).  
 Змѣевикъ, см. Ятрышникъ широколистный (*Orchis latifolia* L.).  
 Зминъ я трава, см. Тысячелистн. обыкн. (*Achillea Millef. L.*).  
 Змѣевикъ, см. Горечавка полевая (*Gentiana campestris* L.).  
 Змѣевникъ, см. Плющъ обыкновенный (*Hedera Helix* L.).  
 Змѣинецъ, см. Андреевъ крестъ (*Veronica spicata* L.).  
 Змѣй-трава, см. Аройникъ пятнистый (*Arum maculatum* L.).  
 Зноиха, см. Петрушка собачья (*Aethusa Cynapium* L.).  
 Зозюльки желтыя, см. Башмачки желтыя (*Cypriped. calceol. L.*).  
 Зозюльки красныя, см. Башмачекъ красн. (*Cypriped. macr. Sw.*).  
 Зозюльки рябыя, см. Башмачекъ краплч. (*Cypriped. guttat. Sv.*).  
 Золотникъ, см. Василетникъ голубков. (*Thalictr. aquilegif. L.*).  
 Золототысячникъ бѣлый, см. Икотникъ сѣро-зеленый (*Berteroa incana* Dc.).  
 Золотохворость, см. Утесникъ обыкновен. (*Ulex europaeus* L.).  
 Золотуха, см. Василекъ перистый (*Centaurea Scabiosa* L.).  
 Золотушникъ, см. Кошачьи лапки (*Antennaria dioica* Gaertn.).  
 Зондей, см. Жабникъ пашенный (*Filago arvensis* L.).  
 Зоря дикая, см. Чихотная трава (*Parmica vulgaris* Dc.).  
 Зубарье, см. Кудри павскія (*Lilium Martag'n L.*).  
 Зубровникъ, см. Бе-манія (*Beckmannia erucaciformis* Host.).  
 Зубъ собачій, см. Пырей ползучій (*Triticum repens* L.).  
 Зыбрь, см. Бодякъ разнолистный (*Cirsium heterophyllum* All.).  
 Зѣвка-трава, см. Алканна настоящая (*Lawsonia alba* Lam.).  
 Зябрей, см. Погremoкъ обыкновен. (*Rhinanthus Crista Galli* L.).  
 Зябрій, см. Иванъ да Марья (*Melampyrum nemorosum* L.).  
 Зязина, см. Кленъ татарскій или русскій (*Acer tataricum* L.).

- Зязюльки } см. Башмачки желтые (*Cypripedium cal-*  
Зязюльки желтые } ceolus L.).  
Зюзюля, см. Кукушкины слезы (*Orchis maculata* L.).  
Ива обыкновенная, см. Ива бѣлая (*Salix alba* L.).  
Ивановъ чай, см. Иванъ-чай (*Epilobium angustifolium* L.).  
Иванъ-да-Марья, см. Барвинокъ малый (*Vinca minor* L.).  
Иванъ-да-Марья, см. Марьянникъ полевой (*Melampyr. arven.* L.).  
Иванъ-цвѣтъ, см. Понувникъ обыкн. (*Chrysant. Leucant.* L.).  
Иванъ-чай, см. Кипрей волосистый (*Epilobium hirsutum* L.).  
Игла, см. Метла, или мышій тернъ (*Ruscus aculeatus* L.).  
Иглица } см. Метла, или мышій тернъ (*Ruscus acu-*  
Иглица воложская } leatus L.).  
Иголка подорожная } см. Крушина слабительная (*Rhamnus*  
Иголко } cathartica L.).  
Изгонъ-трава, см. Фиалка собачья (*Viola canina* L.).  
Изможденъ полевой, см. Незабудка болот. (*Myositis palustr.* W.).  
Икотная трава, см. Бурачокъ горный (*Alyssum montanum* L.).  
Имбирь желтый, см. Куркума (*Curcuma longa* L.).  
Имбирь нѣмецкій, см. Арейникъ пятнист. (*Arum maculat.* L.).  
Имбирь нѣмецкій, см. Бузульникъ сибир. (*Ligularia sibir.* C.).  
Инонъ боровой, см. Горнищъ весенній (*Adonis vernalis* L.).  
Ирга, см. Таволга алтаѣская (*Spiraea laevigata* L.).  
Ирошникъ, см. Медунца (*Spiraea ulmaria* L.).  
Испанскій ячмень, см. Ячмень двурядный (*Hord. distich.* L.).  
Истодъ-дерево, см. Истодъ хохлатый (*Polygala comosa* Schk.).  
Ихирлю-Молыкъ, см. Астрagalъ солодкол. (*Astragal. glycyph.* L.).  
Иудино дерево, см. Осина (*Populus tremula* L.).  
Кавка, см. Чина весенняя (*Orob. vernus* L.).  
Кадорумъ, см. Виноградъ обыкновенный (*Vitis vinifera* L.).  
Кажучечки, см. Репяшокъ обыкновен. (*Agrimonia Eupatorium* L.).  
Кажущка, см. Репяшокъ обыкновен. (*Agrimonia Eupatorium* L.).  
Казарка, см. Чернокорень лекарствен. (*Cynoglossum officinale* L.).  
Казачекъ, см. Касатикъ водяной (*Iris pseudacorus* L.).  
Какишникъ, см. Горчица дикая (*Eruca sativa* Dc.).  
Какишъ, ст. Лагукъ дикій (*Lactuca Scariola* L.).  
Какора, см. Багульникъ болотный (*Ledum palustre* L.).  
Калачики, см. Алтей лекарственный (*Althaea officinalis* L.).  
Калика, см. Брюква (*Brassica Napus* L.).  
Калинина махровая, см. Калина обыкн. (*Viburnum Opulus* L.).  
Калишка, см. Брюква (*Brassica Napus* L.).  
Камица, см. Брюква (*Brassica Napus* L.).  
Камчужная, см. Первоцвѣтъ лекарств. (*Primula officinalis* Jacq.).  
Камушки, см. Базиликъ (*Osimum basilicum* L.).  
Канабра болотная, см. Багульникъ болотный (*Ledum palustre* L.).  
Канобра, см. Багульникъ болотный (*Ledum palustre* L.).  
Капародъ, см. Папоротникъ черный (*Struthiopteris germanica* W.).  
Капатка боровая, см. Верескъ обыкнов. (*Calluna vulgaris* Salisb.).  
Капелюшки, см. Кувшинка желтая (*Nuphar luteum* Smith.).  
Капелюшникъ, см. Вѣдокрыльникъ болотный (*Calla palustris* L.).

- Капока, см. Девясилъ подоолнечный (*Inula Helenium* L.).  
 Капуста заячья, см. Бубенчики обыкновен. (*Adenophora lilif. Led.*).  
 Капушины, см. Настурция (*Tropaeolum majus* L.).  
 Каранка, см. Фасоль обыкновенная (*Phaseolus vulgaris* L.).  
 Караячина, см. Пльмъ пробковый (*Ulmus tuberosa* Ehrh.).  
 Кардамонъ полевой, см. Сердечникъ полев. (*Cardam. pratens. L.*).  
 Кардовникъ, см. Ежеголовка вѣтвистая (*Sparganium ramosum* L.).  
 Кардопаль, см. Артишокъ испанскій (*Cynara Cardunculus* L.).  
 Карушинникъ, см. Крушина ломкая (*Rhamnus frangula* L.).  
 Каспій, см. Вадма (*Neiumblum Caspicum* Fisch.).  
 Катранъ, см. Свербига восточная (*Bunias orientalis* L.).  
 Кауръ, см. Серпуха красильная (*Serratula tinctoria* L.).  
 Кашка, см. Астрagalъ луговой (*Astragalus Hypoglottis* L.).  
 Кашкара, см. Рододендръ даурскій (*Rhododendron dahuricum* L.).  
 Кашиця, см. Вербена лекарственная (*Verbena officinalis* L.).  
 Каштаны водяные, см. Орѣхи водяные (*Trapa natans* L.).  
 Каштанъ, см. Каштанъ настоящій (*Castanea vesca* Gärtn.).  
 Квасоля, см. Фасоль обыкновенная (*Phaseolus vulgaris* L.).  
 Квашня, см. Колокольчикъ жестковол. (*Campanula cervicaria* L.).  
 Квиноа, см. Марь квиноа (*Chenopodium Quinoa* Willd.).  
 Кедръ барбадосскій, см. Можжевельн. обыкновен. (*Junip. comm. L.*).  
 Кеуръ, см. Букетъ (*Buxus sempervirens* L.).  
 Кедръ финикскій, см. Сандаракъ кустъ (*Callitris quadr. V.*).  
 Кечегуль, см. Икотникъ сѣро-зеленый (*Berteroa incana* DC.).  
 Кивичная, см. Щавель малый (*Rumex Acetosella* L.).  
 Кизильникъ, см. Таволга алтѣйская (*Spiraea laevigata* L.).  
 Кизиль, см. Ююба (*Zizyphus vulgaris* L.).  
 Кизиль, см. Свидна (*Cornus sanguinea* L.).  
 Кипарисникъ, см. Сирень обыкновенная (*Syringa vulgaris* L.).  
 Киперъ, см. Иванъ-чай (*Epilobium angustifolium* L.).  
 Киркашунъ, см. Кирказонъ обыкновен. (*Aristolochia clematitis* L.).  
 Кислица собачья, см. Бодякъ разнолист. (*Cirsium heter. All.*).  
 Кисть Кинера, см. Алканна настоящая (*Lawsonia alba* Lam.).  
 Кіевка, см. Рогоза широколистная (*Typha latifolia* L.).  
 Кіило, см. Ковыль перистый (*Stipa pennata* L.).  
 Кійло, см. Медунца (*Spirea ulmaria* L.).  
 Кійки, см. Кукуруза обыкновенная (*Zea Mays* L.).  
 Кіяхи, см. Рогоза широколистная (*Typha latifolia* L.).  
 Кладъ, см. Вероника лекарственная (*Veronica officinalis* L.).  
 Клекочина, см. Азедарокъ обыкновенный (*Melia Azedarach* L.).  
 Клей древесный, см. Падубъ обыкновенный (*Ilex aquifolium* L.).  
 Клинь черный, см. Чернушка обыкновенная (*Nigella sativa* L.).  
 Клокочина, см. Азедарокъ обыкновенный (*Melia Azedarach* L.).  
 Клоповая трава, см. Ромашка персидская (*Pyrethr. carneum* Br.).  
 Клоповникъ, см. Рододендронъ даурскій (*Rhododend. dahur. L.*).  
 Клоповникъ, см. Спаржа обыкновенная (*Asparagus officinalis* L.).  
 Кобилеха, см. Фасоль обыкновенная (*Phaseolus vulgaris* L.).  
 Кобилица, см. Фасоль обыкновенная (*Phaseolus vulgaris* L.).  
 Кобылехи, см. Слива обыкновенная (*Prunus domestica* L.).

- Кобылій щецъ, см. Щавель рѣчной (*Rumex Hydrolapathum* Huds.).  
 Кобылякъ, см. Щавель рѣчной (*Rumex Hydrolapathum* Huds.).  
 Ковыла, см. Ылоусъ обыкновенный (*Nardus stricta* L.).  
 Когти медвѣжьи, см. Акантъ остролиственный (*Acanthus mollis* L.).  
 Кожушка, см. Незабудка средняя (*Myositis intermedia* Link.).  
 Козелецъ, см. Сладкій корень (*Scorzonera hispanica* L.).  
 Козликъ-трава, см. Плауны живородящіе (*Lycopodium Selago* L.).  
 Колорички, см. Хохлатка полая (*Corydalis cava* Schw.).  
 Кокорнякъ, см. Кирказонъ обыкн. (*Aristolochia clematitis* L.).  
 Кокусъ, см. Лапчатка весенняя (*Potentilla verna* L.).  
 Колинучки, см. Колокольчикъ персикол. (*Campan. persicif.* L.).  
 Колка, см. Бодякъ разнолиственный (*Cirsium heterophyllum* All.).  
 Колкая трава, см. Дрокъ нѣмецкій (*Genista germanica* L.).  
 Колоколецъ, см. Бараній языкъ (*Onosma echloides* L.).  
 Колокольчикъ боровой, см. Колокольч. сбор (*Campan. glom.* L.).  
 Колокольчикъ оленій, см. Колокольчикъ жестковолосый (*Campanula cervicaria* L.).  
 Колосовикъ черный, см. Березовый грибъ (*Boletus scaber* B.).  
 Колотинникъ, см. Плауны булавистый (*Lycopodium clavatum* L.).  
 Колтунъ, см. Кочедыжникъ обыкн. (*Aspidium Filix femina* B.).  
 Колчанникъ, см. Вьюнокъ заборный (*Convolvulus sepium* L.).  
 Кольза озимая, см. Репсъ озимый (*Brassica Napus olifera* L.).  
 Колючка, см. Чертополохъ шерстистый (*Cirsium eriophorum* Scop.).  
 Колюха, см. Чертополохъ болотный (*Cirsium palustre* Scop.).  
 Комаръ желтый, см. Репашокъ обыкн. (*Agrimonia Eupator* L.).  
 Комашникъ, см. Исландскій мохъ (*Cetraria islandica* Ach.).  
 Комонишникъ, см. Кукушкины слезы (*Orchis maculata* L.).  
 Комочки, см. Чертополохъ полевой (*Cirsium arvense* Scop.).  
 Комочникъ, см. Остро-пестрая трава (*Silybum Marianum* Gärtn.).  
 Компоштыльонъ, см. Астра садовая (*Aster chinensis* N.).  
 Конехвостъ, см. Сосенка водяная (*Hippuris vulgaris* L.).  
 Конкаль, см. Куколь (*Lychnis Githago* Scop.).  
 Конкаль, см. Райграссъ англійскій (*Lolium perenne* L.).  
 Конобой, см. Звѣздчатка злачная (*Stellaria graminea* L.).  
 Конопель лѣсной, см. Зюзникъ европ. (*Lycopus europ.* L.).  
 Конючина, см. Клеверъ средний (*Trifolium medium* L.).  
 Конюшина, см. Щавель дикий (*Rumex obtusifolius* L.).  
 Конюшина, см. Щавель курчавый (*Rumex crispus* L.).  
 Копръ, см. Укропъ огородный (*Anethum graveolens* L.).  
 Копыто лѣвиное, см. Мылгьянка восточ. (*Leontice Leontop.* L.).  
 Копыто лѣсное, см. Легочница лекарств. (*Pulmonaria officin.* L.).  
 Копье Христово, см. Борецъ желтый (*Aconitum lycoctonum* L.).  
 Копье царское, см. Асфodelъ (*Asphodelus ramosus* L.).  
 Коралевый цвѣтъ, см. Фасоль обыкн. (*Phaseolus vulgaris* L.).  
 Кораливъ цвѣтъ } см. Фасоль огненная (*Phaseolus multiflo-*  
 Коралловый цвѣтъ } rus Willd.).  
 Корзиночникъ, см. Лоза (*Salix viminalis* L.).  
 Корень волчій, см. Борецъ желтый (*Aconitum lycoctonum* L.).  
 Корень волчій, см. Борецъ синий (*Aconitum Napellus* L.).

- Корень вшивый, см. Борецъ желтый (*Aconitum lycoctonum* L.).  
 Корень зубной, см. Одуванчикъ лекарств. (*Taraxacum* D. Leon. D.).  
 Корень ирный, см. Айръ обыкновенный (*Acorus calamus* L.).  
 Корень кисельный, см. Ятрышникъ мужской (*Orchis mascula* L.).  
 Корень крестовый, см. Кокушникъ (*Gymnadenia conopsea* Rich.).  
 Корень многоцвѣтный, см. Волчокъ (*Phelypaea ramosa* C. A. M.).  
 Корень олений большой, см. Пастернакъ огород. (*Pastin. sat.* L.).  
 Корень песочный, см. Осока песчаная (*Carex arenaria* L.).  
 Корень солнечный, см. Волчокъ (*Phelypaea ramosa* C. A. M.).  
 Корень сухопутный, см. Аройникъ пятн. (*Arum macul.* L.).  
 Коренья гнилыя, см. Хохлатка полая (*Corydalis cava* Schw.).  
 Коренья овсяные, см. Сладкій корень (*Scorzonera hispanica* L.).  
 Корешокъ синенькій, см. Легочница лекарств. (*Pulmon. offic.* L.).  
 Короватикъ, см. Бѣлый грибъ, боровикъ (*Boletus edulis* Bull.).  
 Коровки, см. Дурманъ вонючій (*Datura Stramonium* L.).  
 Коровникъ, см. Коровякъ бѣлоцвѣтный (*Verbasca Lychnitis* L.).  
 Коровье имя, см. Заразиха краснотная (*Orobancha rubens* L.).  
 Кормъ верблюжій, см. Яромлистъ (*Zygophyllum Fabago* L.).  
 Корушатникъ, см. Крушина слабит. (*Rhamnus cathartica* L.).  
 Корьякъ, см. Качимъ стѣнной (*Gypsophila muralis* L.).  
 Косматникъ, см. Козлобородникъ дуг. (*Tragopogon pratensis* L.).  
 Косанка, см. Цминъ (*Helychrisum arenarium* Dc.).  
 Косатикъ, см. Астрагалъ солодколист. (*Astragalus glycyphyl.* L.).  
 Костеръ лѣсной, см. Мытникъ обыкновенный (*Poa trivialis* L.).  
 Костеря, см. Овсяница высокая (*Festuca elatior* L.).  
 Косоголомная, см. Горонекъ заборный (*Vicia Sepium* L.).  
 Костоломъ, см. Лапчатка-узикъ (*Potentilla Tormentilla* Schrenk.).  
 Костянка, см. Бересклетъ бородавчатый (*Enonymus verrucosus* L.).  
 Костянецъ, см. Звѣздчатка большая (*Stellaria Holostea* L.).  
 Косцеръ, см. Костеръ ржаной (*Bromus secalinus* L.).  
 Котки, см. Клеверъ пашенный, или кошачій (*Trifolium arvense* L.).  
 Котки, см. Котовикъ кошачій (*Nepeta Cataria* L.).  
 Котовникъ, см. Будра плющевидная (*Glechoma hederacea* L.).  
 Котокъ, см. Пушица влагалищная (*Eriophorum vaginatum* L.).  
 Коточижникъ, см. Кочедыжникъ обыкн. (*Aspidium Filix fem.* B.).  
 Кофейный ячмень, см. Ячмень двуряд. (*Hordeum distich.* L.).  
 Коціолки, см. Колокольчикъ крапивоц. (*Campanula Trachel.* L.).  
 Коцъ-лапки, см. Кошачьи лапки (*Antennaria dioica* Gaertn.).  
 Кочень, см. Капуста качанная (*Brassica oleracea capitata* L.).  
 Кошка, см. Вязель разноцвѣтный (*Coronilla varia* L.).  
 Кошка, см. Репяшокъ обыкновенный (*Agrimonia Eupatorium* L.).  
 Кошелекъ, см. Пасгуныя сумка (*Capsella Bursa pastoris* Moench.).  
 Кошельки, см. Башмачекъ красный (*Cypripedium macranthum* Sw.).  
 Крапива волчья, см. Чистецъ болотный (*Stachys palustris* L.).  
 Крапива глуха, см. Пустирынькъ обыкн. (*Leonorus Cardifera* L.).  
 Крапива глуха біла, см. Крапива глухая (*Lamium album* L.).  
 Крапива глухая, см. Амарантъ колос. (*Amarant. retrofl.* L.).  
 Крапива глухая, см. Буквица лекарств. (*Betonica vulgaris* L.).  
 Крапива глухая, см. Бѣлокудренникъ черный (*Ballota nigra* L.).

- Крапива глухая, см. Залпикъ клубненосный (*Phlomis tuber. L.*).  
 Крапива глухая, см. Чистецъ пѣмекій (*Stachys germanica L.*).  
 Крапива глухая, см. Яснотка пестрая (*Lamium maculatum L.*).  
 Крапива глухая татарская, см. Пустырникъ обыкновенный (*Leonorus Cardiacs L.*).  
 Крапива жгучая, см. Крапива двудомная (*Urtica dioica L.*).  
 Крапива жгучка, см. Крапива жгучая (*Urtica urens L.*).  
 Крапива красная, см. Яснотка пестрая (*Lamium maculatum L.*).  
 Крапива красная, см. Яснотка пурпур. (*Lamium purpur. L.*).  
 Крапива красноцвѣтная, см. Медовникъ (*Galeopsis Tetrahit L.*).  
 Крапива лѣсная, см. Будра плющев. (*Glechoma hederacea L.*).  
 Крапива разноцвѣтная, см. Пикульн. длинноцв. (*Galeop. lad. L.*).  
 Крапивка, см. Зеленчукъ желтый (*Galeobdolon luteum Sm.*).  
 Крапивникъ, см. Звѣробой обыкн. (*Hypericum perforatum L.*).  
 Крапивникъ солодкій, см. Живучка мохн. (*Ajuga genev. L.*).  
 Краска, см. Сабельникъ болотный (*Comarum palustre L.*).  
 Красоля, см. Фасоль огненная (*Phaseolus multiflorus Willd.*).  
 Красота, см. Амарантъ (*Amarantus caudatus L.*).  
 Красота тысячная, см. Амарантъ (*Amarantus caudatus L.*).  
 Краснобай, см. Клеверъ красно-бѣлый (*Trifolium hybridum L.*).  
 Красноголовка, см. Короставникъ полевой (*Scabiosa arvensis L.*).  
 Краснодавь, см. Жминда лозная (*Blitum virgatum L.*).  
 Красноталъ, см. Ива миндальная (*Salix amygdalina L.*).  
 Красотка, см. Настурція (*Tropaeolum majus L.*).  
 Красноцвѣтъ, см. Душевикъ остролист. (*Calamintha Acinos B.*).  
 Красная трава, см. Клеверъ средний (*Trifolium medeum L.*).  
 Красушишникъ, см. Травянка (*Dianthus deltoides L.*).  
 Крессъ индѣйскій, см. Настурція (*Tropaeolum majus L.*).  
 Крессъ цвѣтной, см. Настурція (*Tropaeolum majus L.*).  
 Креста журанова, см. Акантъ остролистный (*Acanthus mollis L.*).  
 Крешена, см. Бѣлокопытникъ лекарств. (*Petasites officin. Mnch.*).  
 Кривана, см. Виноградъ обыкновенный (*Vitis vinifera L.*).  
 Кривця, см. Звѣробой обыкновенный (*Hypericum perforatum L.*).  
 Крыло орлине, см. Астрагалъ солодкол. (*Astragalus glycyph. L.*).  
 Криничникъ, см. Вероника ручейная (*Veronica Beccabunga L.*).  
 Криничникъ, см. Шалфей мѣтовчатый (*Salvia verticillata L.*).  
 Крпѣ, см. Укропъ огородный (*Anethum graveolens L.*).  
 Кровавикъ, см. Тѣлоуѣзъ сабуровидный (*Stratiotes aloides L.*).  
 Кровавикъ водяной, см. Уруть колос. (*Myriophyl. spic. L.*).  
 Кровавникъ, см. Амарантъ метельч. (*Amarantus paniculat. L.*).  
 Кровавникъ, см. Купена лекарств. (*Convallaria Polygonatum L.*).  
 Кровавница, см. Плакунъ-трава (*Lythrum Salicaria L.*).  
 Кровяницъ, см. Собачій зубъ (*Erythronium Dens Canis L.*).  
 Крокошъ, см. Ослиникъ двулѣтній (*Oenothera biennis L.*).  
 Крокошъ польный, см. Ноготки (*Calendula officinalis L.*).  
 Кронъ дикій, см. Горичникъ лекарств. (*Peucedanum officin. L.*).  
 Кронецъ, см. Укропъ огородный (*Anethum graveolens L.*).  
 Кротовникъ, см. Будра плющевидная (*Glechoma hederacea L.*).  
 Кротъ степной, см. Аксамецъ (*Stum lancifolium*).



- Круглецъ, см. Неслея метельчатая (*Neslea paniculata* Desf.).  
 Крутикъ, см. Аморфа кустарная (*Amorpha fruticosa* L.).  
 Крутикъ, см. Вайна красильная (*Isatis tinctoria* L.).  
 Крушинина, см. Крушина ломкая (*Rhamnus frangula* L.).  
 Крыло орлиное, см. Орлякъ обыкновенный (*Pteris aquilina* L.).  
 Крыночная трава, см. Бура плющев. (*Glechoma heder.* L.).  
 Крючечникъ, см. Колосчикъ безстеб. (*Carlina subcaul.* DC.).  
 Кубысъ, см. Рогоза широколистная (*Typha latifolia* L.).  
 Кубышка, см. Тыква бутылочная (*Cucurbita lagenaria* L.).  
 Куга, см. Касатикъ водяной (*Iris pseudacorus* L.).  
 Кургмерка, см. Сахарные или сладкие корни (*Sium Sisarum* L.).  
 Кудравицъ, см. Артемизия (*Artemisia Abrotanum* L.).  
 Кудри пестрыя, см. Бѣлокудренникъ черный (*Ballota nigra* L.).  
 Кудри пестрыя, см. Чернокудренникъ черный (*Ballota nigra* L.).  
 Кудрявка, см. Рябчикъ обыкновенный (*Fritillaria Meleagris* L.).  
 Кудрявчикъ, см. Козлобродникъ луговой (*Tragopogon pratensis* L.).  
 Кудрявчикъ, см. Герань луговая (*Geranium pratense* L.).  
 Кукалица, см. Смолевка зеленая (*Silene chlorantha* Ehrh.).  
 Кукласть, см. Клеверъ луговой (*Trifolium pratense* L.).  
 Куколица, см. Смолевка ночесветная (*Silene noctiflora* L.).  
 Кукольникъ, см. Чемерица бѣлая (*Veratrum album* L.).  
 Куколь, см. Божье дерево (*Artemisia procera* Willd.).  
 Куколь, см. Плевель одуряющій (*Lolium temulentum* L.).  
 Куколь, см. Хлопушка (*Silene inflata* Smith.).  
 Кукушка, см. Бѣлогловка (*Trifolium montanum* L.).  
 Кукушка, см. Ятрышникъ мужской (*Orchis mascula* L.).  
 Кукушки, см. Спорынья (*Sclerotium Clavus* DC.).  
 Кукушница, см. Ятрышникъ мужской (*Orchis mascula* L.).  
 Кули лѣсовые, см. Купена лекарств. (*Convallaria Polygon.* L.).  
 Кульбаба, см. Крестовникъ обыкновенный (*Senecio vulgaris* L.).  
 Кульбаба, см. Одуванчикъ лекарств. (*Taraxacum Dens Leonis* Desf.).  
 Кульчиберъ, см. Шпажникъ черепич. (*Gladiolus imbricatus* L.).  
 Куманика, см. Костяника (*Rubus saxatilis* L.).  
 Куманиха, см. Морошка (*Rubus Chamaemorus* L.).  
 Куньякъ, см. Вѣшникъ наземный (*Calamagrostis Epigelos* Roth.).  
 Купавка желтая, см. Кувшинка желтая (*Najas luteum* Smith.).  
 Купаленка, см. Купальница европейская (*Trollius europaeus* L.).  
 Купалка, см. Блошница обыкновенная (*Inula Pulicaria* L.).  
 Купальница, см. Гвоздика пышная (*Dianthus superbus* L.).  
 Купальница, см. Примула (Ranunculus Flammula L.).  
 Купальница, см. Ромашка обыкновен. (*Matricaria Chamomilla* L.).  
 Купальница, см. Смолка (*Lychnis Viscaria* L.).  
 Купена, см. Гайникъ широколистный (*Epipactis latifolia* Sw.).  
 Купена, см. Мыльнянка лекарственная (*Saponaria officinalis* L.).  
 Купена, см. Кипрей горный (*Epilobium montanum* L.).  
 Купена крапивная, см. Амарантъ колос. (*Amarant. retrofl.* L.).  
 Купенникъ, см. Кукушникъ лѣнь (*Polytrichum commune* L.).  
 Купина, см. Андреевъ крестъ (*Veronica spicata* L.).  
 Купино, см. Ослиникъ двулѣтний (*Oenothera biennis* L.).

- Купинось, см. Румянка лекарственная (*Anchusa officinalis* L.).  
 Купирье, см. Бутень клубеносный (*Chaerophyllum bulbosum* L.).  
 Купковка, см. Ежа сборная (*Dactylis glomerata* L.).  
 Куполушникъ, см. Девясилъ нѣмецкій (*Inula germanica* L.).  
 Купорошникъ, см. Кочедыжникъ обыкновен. (*Aspid. Fil. fem. B.*).  
 Купрій, см. Молочай высокій (*Euphorbia procera* M. B.).  
 Купырѣ, см. Дягиль лекарственный (*Angelica Archangelica*).  
 Купырѣ, см. Дягиль лѣсной (*Angelica silvestris* L.).  
 Купырѣ, см. Свербига восточная (*Bunias orientalis* L.).  
 Купырѣ болотный, см. Сныть обыкн. (*Aegopod. Podagr. L.*).  
 Купырѣ лѣсной, см. Валеріана лекарств. (*Valeriana officin. L.*).  
 Кура, см. Молочай высокій (*Euphorbia procera* M. B.).  
 Кура дикая, см. Звѣробой обыкновен. (*Hypericum perforatum* L.).  
 Курай, см. Дурнишникъ колючій (*Xanthium spinosum* L.).  
 Курай, см. Зольникъ калинный (*Salsola Kali* L.).  
 Курача, см. Чистотѣль большой (*Chelidonium majus* L.).  
 Курачье-зелѣе, см. Лапчатка-узыкъ (*Potentilla Torment. Schr.*).  
 Курашка, см. Зольникъ калинный (*Salsola Kali* L.).  
 Куреча, см. Абрикосъ (*Armeniaca vulgaris* Lam.).  
 Куринка, см. Колокольчикъ боровой (*Campanula ranunculoides* L.).  
 Куричья слѣпота, см. Вѣтренница тѣнист. (*Anemone nemor. L.*).  
 Курица, см. Чертополохъ ланцетный (*Cirsium lanceolatum* Scop.).  
 Курѣпа, см. Свербига восточная (*Bunias orientalis* L.).  
 Куровой, см. Астрagalъ солодколист. (*Astragalus glycyphyl. L.*).  
 Куровникъ, см. Осотъ огородный (*Sonchus oleraceum* L.).  
 Куропаткѣ, см. Башмачекъ крапч. (*Cypripedium guttatum* Sw.).  
 Курослѣпъ, см. Вѣтренница тѣнистая (*Anemone nemorosa* L.).  
 Курослѣпникъ, см. Вирючина (*Ligustrum vulgare* L.).  
 Курослѣпникъ, см. Воробьиное просо (*Anagallis arvensis* L.).  
 Курослѣпникъ, см. Калужница болотная (*Caltha palustris* L.).  
 Курослѣпникъ, см. Свидина (*Cornus sanguinea* L.).  
 Курослѣпникъ, см. Чистякъ (*Ficaria ranunculoides* Moench.).  
 Курослѣпъ, см. Адокса мускусная (*Adoxa Muschatellina* L.).  
 Курослѣпъ, см. Воробьиное просо (*Anagallis arvensis* L.).  
 Курослѣпъ, см. Герань кроваво-красн. (*Geranium sanguin. L.*).  
 Курослѣпъ, см. Кизильникъ обыкн. (*Cotoneaster vulgar. Lindl.*).  
 Курослѣпъ, см. Мокрица (*Stellaria media* Smith.).  
 Курослѣпъ, см. Свидина (*Cornus sanguinea* L.).  
 Курослѣпъ бѣлый, см. Вѣтренница тѣнист. (*Anemone nemor. L.*).  
 Курослѣпъ водяной, см. Турча болотная (*Hottonia palustris* L.).  
 Курослѣпъ голубячій, см. Герань лугов. (*Geranium prat. L.*).  
 Курослѣпъ желтый, см. Калужница болотн. (*Caltha palustr. L.*).  
 Курослѣпъ меньшій, см. Воробейникъ лекарств. (*Lithosp. off. L.*).  
 Курочки, см. Башмачекъ крапчатый (*Cypripedium guttat. Sw.*).  
 Куровѣдъ, см. Гречиха птичья, спорышъ (*Polygonum aviculare* L.).  
 Курпойнтъ лѣсной, см. Пустырникъ обыкн. (*Leonorus Card. L.*).  
 Курчанникъ, см. Сонъ (*Anemone Pulsatilla* L.).  
 Куръ-гузъ, см. Воробьиное просо (*Anagallis arvensis* L.).  
 Куръ-зелѣе, см. Воробьиное просо (*Anagallis arvensis* L.).

- Куръ-зелъе, см. Лапчатка-узыкъ (*Potentilla Tormentilla Schrenk.*).  
 Курьякъ, см. Лапчатка-узыкъ (*Potentilla Tormentilla Schrenk.*).  
 Курыакъ, см. Кермекъ татарскій (*Statice tatarica L.*).  
 Курятина, см. Колокольчикъ боров. (*Campanula ranunculoid. L.*).  
 Курятникъ вонючій, см. Зеленчукъ желтый (*Galeobd. lut. Sm.*).  
 Курятникъ конопляный, см. Медовникъ (*Galeopsis Tetrah. L.*).  
 Куслушка, см. Щавель обыкновенный (*Rumex Acetosa L.*).  
 Кустарное дерево, см. Лапчатка-узыкъ (*Potent. Torment. Sch.*).  
 Кустерень, см. Ломоносъ прямой (*Clematis recta L.*).  
 Кустовица, см. Осока обыкновенная (*Carex vulgaris Fr.*).  
 Кустовникъ, см. Хрътъ водяной (*Nasturtium amphibium R. Br.*).  
 Кустъ солодковый, см. Чина черная (*Orobis niger L.*).  
 Кутазъ, см. Колокольчикъ персиколст. (*Campan. persicif. L.*).  
 Кутки-трава, см. Половникъ обыкнов. (*Chrysanth. Leucanth.*).  
 Кутючникъ, см. Вѣйникъ наземный (*Calamagrostis epigeios Roth.*).  
 Куфельки, см. Сладкій корень (*Scorzonera hispanica L.*).  
 Куцавей, см. Колокольчикъ жесткокол. (*Campanula cervicaria L.*).  
 Кучера, см. Гравилатъ водяной (*Geum rivale L.*).  
 Кучеравка, см. Качимъ метельчатый (*Gypsophila paniculata Led.*).  
 Кучерски травы, см. Купальница европ. (*Trollius europaeus L.*).  
 Кушарка, см. Марьянникъ луговой (*Melampyrum pratense L.*).  
 Кушульникъ, см. Погremoкъ обыкн. (*Rhinanthus Crista Galli L.*).  
 Куширъ, см. Крапива водяная (*Ceratophyllum densersum L.*).  
 Кушуръ, см. Рдестъ плавающіи (*Potamogeton natans L.*).  
 Кытки, см. Клеверъ пашенный (*Trifolium arvense L.*).  
 Кыточникъ, см. Клеверъ пашенный (*Trifolium arvense L.*).  
 Кѣпекъ, см. Синикъ обыкновенный (*Echium vulgare L.*).  
 Ладанъ калмыцкій, см. Жидовникъ обыкн. (*Tamarix gal. L.*).  
 Лазурьки, см. Горечавка крупная (*Gentiana pneumonanthe L.*).  
 Лапка гусиная приморская, см. Шведка приморская (*Suaeda maritima Dumort.*).  
 Лапушка, см. Молочай высокій (*Euphorbia procera M. B.*).  
 Лапстра, см. Астра садовая (*Aster chinensis*).  
 Ламетри, см. Медуница (*Spiraea ulmaria L.*).  
 Лапа дубовая, см. Пармелія морщин. (*Parmella caperata Ach.*).  
 Лапушникъ водяной, см. Кувшинка желт. (*Nuphar luteum Sm.*).  
 Ласковица, см. Чина клубненосная (*Lathyrus tuberosus L.*).  
 Латаще, см. Калужница болотная (*Caltha palustris L.*).  
 Латушникъ болотный, см. Борецъ желтый (*Acon. lycocton. L.*).  
 Лебеда дикая, см. Марь обыкновен. (*Chenopodium album L.*).  
 Лебеда свиная, см. Марь ненастоящая (*Chenopodium hybridum L.*).  
 Лебедка, см. Душица обыкновен. (*Origanum vulgare L.*).  
 Левконія полевая, см. Ослитникъ двудѣл. (*Oenothera bienn. L.*).  
 Ледянка, см. Арнаутка (*Triticum durum Desl.*).  
 Лекотка, см. Медовникъ (*Galeopsis Tetrahit L.*).  
 Ленокъ, см. Ленъ слабительный (*Linum catharticum L.*).  
 Ленъ дикий, см. Пастушья сумка (*Capsella Bursa pastoris Moench.*).  
 Ленъ зайцевъ, см. Ленъ дикій (*Linaria vulgaris Mill.*).  
 Ленъ кукушкинъ, см. Ленъ слабительн. (*Linum cathartic. L.*).

- Лепешникъ, см. Касатикъ водяной (*Iris pseudacorus* L.).  
 Лепешнякъ, см. Манникъ высокий (*Glyceria spectabilis* M. et. K.).  
 Лепница, см. Череда трехраздѣльная (*Bidens tripartita* L.).  
 Летучка, см. Мелколепестникъ ѣдкій (*Erigeron acris* L.).  
 Летячка, см. Деревей (*Ptarmica cartilaginea* L.).  
 Лечуха, см. Подлѣсникъ европейскій (*Sanicula europaea* L.).  
 Лилія полевая, см. Ландышъ майскій (*Convallaria majalis* L.).  
 Лимакъ, см. Вязъ обыкновенный (*Ulmus effusa* Willd.).  
 Лимакъ, см. Лютикъ золотистый (*Ranunculus Lingua* L.).  
 Лимокъ, см. Кленъ татарскій или русскій (*Acer tataricum* L.).  
 Липка, см. Подмаренникъ болотный (*Galium palustre* L.).  
 Липучка, см. Незабудка средняя (*Myositis intermedia* Link.).  
 Липчица, см. Погребомъ обмен. (*Rhinanthus Crista Galli* L.).  
 Лисица, см. Виноградъ обыкновенный (*Vitis vinifera* L.).  
 Лисица, см. Качимъ стѣнной (*Gypsophila muralis* L.).  
 Лисица, см. Качимъ стѣнной (*Gypsophila muralis* L.).  
 Листва, см. Хохлатка плотная (*Corydalis solida* Smith.).  
 Листъ львиный, см. Петровъ крестъ (*Lathraea Squamaria* L.).  
 Листъ царевъ, см. Оедмичникъ европ. (*Trionf europ. L.*).  
 Литла, см. Луговикъ дернистый (*Aira caespitosa* L.).  
 Литтеръ, см. Незабудка средняя (*Myositis intermedia* Link.).  
 Лиходѣйная трава, см. Гладышъ широкол. (*Laserpitium latif. L.*).  
 Лихорадочная меньшая, см. Дубровникъ обыков. (*Teucrium Chamaedrys* L.).  
 Лихорадочная трава, см. Лютикъ золот. (*Ranuncul. Ling. L.*).  
 Лобдила, см. Лебеда садовая (*Atriplex hortensis* L.).  
 Лоза африканская, см. Жасминъ полевой (*Lycium barbarum* L.).  
 Лоза винова, см. Виноградъ обыкновенный (*Vitis vinifera* L.).  
 Лозина, см. Ива миндальная (*Salix amygdalina* L.).  
 Лозиница, см. Незабудка средняя (*Myositis intermedia* Link.).  
 Лозниха, см. Виноградъ обыкновенный (*Vitis vinifera* L.).  
 Ломыникъ, см. Василистникъ голубъ. (*Thalictrum aquileg. L.*).  
 Лопуныси, см. Первоцвѣтъ лекарств. (*Primula officinalis* Jacq.).  
 Лопушокъ, см. Щалфей мутовчатый (*Salvia verticillata* L.).  
 Лоскутный цвѣтъ, см. Василекъ черногор. (*Centaurea nig. L.*).  
 Лось, см. Хохлатка плотная (*Corydalis solida* Smith.).  
 Лошакова трава, см. Ослинникъ двулѣтний (*Oenothera biennis* L.).  
 Лукъ дикий, см. Шпажникъ черенич. (*Gladiolus imbricat. L.*).  
 Лукъ сорочій, см. Гиацинтъ стѣнной (*Hyacinthus leucoph. Stev.*).  
 Лупена, см. Купена лекарственная (*Convallaria Polygonatum* L.).  
 Лучная трава, см. Жирянка обыкн. (*Pinguicula vulgaris* L.).  
 Лыко волчье, см. Майникъ двулиств. (*Majanthemum bifol. L.*).  
 Лыстыхъ козій, см. Жимолость душистая (*Lonicera Caprifol. L.*).  
 Лышица, см. Качимъ стѣнной (*Gypsophila muralis* L.).  
 Лѣпокъ, см. Смолка (*Lychnis Viscaria* L.).  
 Лѣсная трава, см. Ожика волосистая (*Luzula pilosa* Willd.).  
 Лѣсовой холодецъ, см. Жеруха болотн. (*Nasturtium palustre* Dc.).  
 Любимъ, см. Зоря садовая (*Levisticum officinale* Koch.).  
 Любиста, см. Аксамесъ (*Slum lancifolium*).

- Любка, см. Буквица лекарственная (*Betonica vulgaris* L.).  
 Любка, см. Ятрышникъ племовидный (*Orchis militaris* L.).  
 Люби меня не покинь, см. Чина лѣсная (*Lathyrus silvestris* L.).  
 Люкрецъ, см. Марьянникъ луговой (*Melampyrum pratense* L.).  
 Лютикъ, см. Чистотѣль большой (*Chelidonium majus* L.).  
 Лютякъ, см. Борецъ синий (*Aconitum Napellus* L.).  
 Лягушечникъ, см. Вѣлзоръ болотный (*Parnassia palustris* L.).  
 Лягушечникъ, см. Остро-пестр. трава (*Silybum Marianum* G.).  
 Лягушечья трава, см. Горчакъ (*Polygonum Persicaria* L.).  
 Лягушечья трава, см. Частуха обыкновен. (*Alisma Plantago* L.).  
 Лядвенецъ, см. Ледвенецъ рогатый (*Lotus corniculatus* L.).  
 Мавротъ, см. Солнечникъ обыкновен. (*Helianthemum vulgare* Gärtn.).  
 Майникъ, см. Девясилъ подсолнечный (*Inula Helenum* L.).  
 Маквица, см. Тысячелистникъ обыкновен. (*Achillea Millefolium* L.).  
 Маковка водяная, см. Лилія водяная (*Nymphaea alba* L.).  
 Малина глухая, см. Куманика (*Rubus caesius* L.).  
 Малинка, см. Резеда душистая (*Reseda odorata* L.).  
 Малиновка дикая, см. Медуница (*Spiraea ulmaria* L.).  
 Малинникъ, см. Малина обыкновенная (*Rubus idaeus* L.).  
 Манда, см. Сосна обыкновенная (*Pinus silvestris* L.).  
 Мана-трава, см. Росичка червоная (*Panicum sanguinale* L.).  
 Маличникъ, см. Душевикъ остролистый (*Calamintha Acinos* B.).  
 Марана, см. Борщевикъ обыкновенный (*Heracleum sphondylium* L.).  
 Марголя, см. Камышь лѣсной (*Scirpus siliaticus* L.).  
 Марлица, см. Герань кроваво-красная (*Geranium sanguineum* L.).  
 Марвикъ корень, см. Пионъ обыкновен. (*Paeonia officinalis* Retz.).  
 Марвона-корень, см. Подмаренникъ мягкій (*Galium Mollugo* L.).  
 Марена, см. Подмаренникъ болотный (*Galium palustre* L.).  
 Марина, см. Ромашка римская (*Antemis nobilis* L.).  
 Маричъ, см. Крапива водяная (*Ceratyphyllum densersum* L.).  
 Масло коровье, см. Ленъ дикий (*Linaria vulgaris* Mill.).  
 Масляная капля, см. Огуречная трава (*Borrago officinalis* L.).  
 Маслянка, см. Подмаренникъ мягкій (*Galium Mollugo* L.).  
 Мате, см. Чайное дерево парагвайское (*Clex paraguayensis* Lamb.).  
 Материкъ, см. Фиалка ночная (*Platanthera bifolia* Rich.).  
 Маточникъ, см. Бодякъ разнолист. (*Cirsium heterophyl.* All.).  
 Маточникъ, см. Бѣлокопытникъ лекарст. (*Petasites officin.* Mnch.).  
 Маточникъ, см. Бѣлокудренникъ черный (*Ballota nigris* L.).  
 Маточникъ, см. Шлемникъ обыкновен. (*Scutellaria galericulata* L.).  
 Маточникъ дикий, см. Зюзникъ европ. (*Lycopus europaeus* L.).  
 Маттиоля, см. Турча болотная (*Hottonia palustris* L.).  
 Мать и мачиха, см. Марьянникъ полев. (*Melampyr. arven.* L.).  
 Мауница, см. Рапунцель обыкновен. (*Valerianella olitoria* Moen.).  
 Махорникъ, см. Горичѣвъ весенний (*Adonis vernalis* L.).  
 Мачокъ, см. Чернушка обыкновенная (*Nigella saliva* L.).  
 Мачиха, см. Калужница болотная (*Caltha palustris* L.).  
 Машки, см. Пахучка обыкновен. (*Calamintha Clinopodium* Benth.).  
 Медвѣдица, см. Горлецъ раковыя шейки (*Polygonum Bistorta* L.).  
 Медвѣжина, см. Крушина ломкая (*Rhamnus frangula* L.).

- Медвѣжья трава, см. Воронецъ колосистый (*Actaea spicata* L.).  
 Меденишникъ, см. Румянка лекарств. (*Anchusa officinalis* L.).  
 Медокъ, см. Клеверъ луговой или полевн. (*Trifolium pratense* L.).  
 Медунка, см. Румянка лекарственная (*Anchusa officinalis* L.).  
 Медынь, см. Мозольное дерево (*Bryophyllum calycinum* Salisb.).  
 Меледа, см. Кедръ сибирскій (*Pinus Cembra* L.).  
 Мелкая трава, см. Тысячелистн. обыкновен. (*Achillea Millefol.* L.).  
 Метелка, см. Молочай кшарисный (*Euphorbia Cyparissis* Scop.).  
 Метелочка, см. Полевица бѣлая (*Agrostis alba* L.).  
 Метла, см. Грыжникъ сладкій (*Herniaria glabra* L.).  
 Метла пырейстая, см. Луговикъ дернистый (*Aira caespitosa* L.).  
 Метлица, см. Ежа сборная (*Dactylis glomerata* L.).  
 Метлица, см. Луговикъ дернистый (*Aira caespitosa* L.).  
 Метлица, см. Полевица бѣлая (*Agrostis alba* L.).  
 Метлюкъ, см. Полевица бѣлая (*Agrostis alba* L.).  
 Месанъ, см. Виноградъ обыкновенный (*Vitis vinifera* L.).  
 Миндальная трава, см. Вьюнокъ полевой (*Convolvulus arven.* L.).  
 Минушки, см. Торница полевая (*Spergula arvensis* L.).  
 Мирисовка, см. Виноградъ обыкновенный (*Vitis vinifera* L.).  
 Мировка, см. Виноградъ обыкновенный (*Vitis vinifera* L.).  
 Мирта гвоздичная, см. Амомъ (*Amomis acris* Bg.).  
 Миръ, см. Кудрявецъ (*Chenopodium Botrys* L.).  
 Миръ-зілле, см. Герань кров.-красная (*Geranium sanguin.* L.).  
 Митрія, см. Вербейникъ обыкновенный (*Lysimachia vulgaris* L.).  
 Мишей, см. Щетинникъ синій (*Setaria glauca* Beauv.).  
 Младенческая трава, см. Горечавка круп. (*Gent. pneumon.* L.).  
 Младенчица, см. Офрисъ паукообразный (*Ophrys aranifera* Huds.).  
 Мята кудрява, см. Мята кудрявая (*Mentha crispa* Valerii).  
 Мокрединникъ, см. Солеросъ (*Salicornia herbacea* L.).  
 Мокрець, см. Амарантъ колосистый (*Amarantus retroflexus* L.).  
 Моковица, см. Седмичникъ европейскій (*Tridentalis europaea* L.).  
 Мокроѣтъ, см. Астрагалъ солодколист. (*Astragalus glycyphyl.* L.).  
 Молодецъ, см. Коровякъ бѣлоцвѣтный (*Verbascum Lychitis* L.).  
 Молодишникъ, см. Очитокъ острый (*Sedum acre* L.).  
 Молоточникъ изгибистый, см. Луговикъ гиб. (*Aira flex.* L.).  
 Молотянка, см. Колоснякъ песчаный (*Elymus arenarius* L.).  
 Молочай, см. Дрокъ красильный (*Genista tinctoria* L.).  
 Молочай, см. Ястребинка волосистая (*Hieracium Pilosella* L.).  
 Молочай капустный, см. Осоть полевой (*Sonchus arvensis* L.).  
 Молочайникъ, см. Одуванчикъ лекарств. (*Taraxac. Dens Leon.* D.).  
 Молочайникъ, см. Осоть полевой (*Sonchus arvensis* L.).  
 Молочникъ, см. Осоть полевой (*Sonchus arvensis* L.).  
 Мольная трава, см. Кнафликъ (*Verbascum Blattaria* L.).  
 Мольникъ, см. Кнафликъ (*Verbascum Blattaria* L.).  
 Моргунъ, см. Ромашка обыкновенная (*Matricaria Chamomilla*).  
 Мордовникъ, см. Чертополохъ болотный (*Cirsium palustre* Scop.).  
 Морковка дикая, см. Алетникъ душист. (*Erodium cicutar.* L.).  
 Морковникъ, см. Петрушка горная (*Pucedanum Oreoselin.* Mön.).  
 Морковница, см. Гусиная трава (*Potentilla anserina* L.).

- Моховая трава, см. Живучка ползучая (*Ajuga reptans* L.).  
 Моховка, см. Смородина черная (*Ribes nigrum* L.).  
 Мохноногъ, см. Чистецъ нѣмецкій (*Stachys germanica* L.).  
 Мохъ сухоборный, см. Исландскій мохъ (*Cetraria island.* Ach.).  
 Моченецъ, см. Конопля посѣвная (*Cannabis sativa* L.).  
 Мошникъ, см. Пузырное дерево (*Colutea arborescens* L.).  
 Мударъ настоящій, см. Сассапарель ость-индская.  
 Муза, см. Бананъ (*Musa paradisiaca* L.).  
 Мурожижъ, см. Гречижа птичья (*Polygonum aviculare* L.).  
 Муротъ полевой, см. Ленъ дикий (*Linaria vulgaris* Mill.).  
 Мучаникъ, см. Толокнянка обыкновенн. (*Arctostaphylos officin.* Moen.).  
 Мученицы, см. Толокнянка обыкновенн. (*Arctostaphylos officin.* Moen.).  
 Мученичникъ, см. Толокнянка обыкновенн. (*Arctostaphyl. offic.* Moen.).  
 Мучинникъ, см. Брусника (*Vaccinium Vitis Idaea* L.).  
 Мучинникъ, см. Толокнянка обыкновенн. (*Arctostaphyl. offic.* Moen.).  
 Мучное дерево, см. Боярка бѣлая (*Sorbus Aria Crntz.*).  
 Мучница, см. Толокнянка обыкновенн. (*Arctostaphylos. officin.* Moen.).  
 Мушій, см. Щетинникъ сизый (*Setaria glauca* Beauv.).  
 Мъята водьяна, см. Мята красная (*Mentha aquatica* L.).  
 Мъята кінска, см. Мята красная (*Mentha aquatica* L.).  
 Мъята кошача, см. Котовникъ кошачій (*Nepeta Cataria* L.).  
 Мъята кучеряза, см. Мята кудрявая (*Mentha crispa* Valeril.).  
 Мыгдаль, см. Миндаль обыкновенный (*Amygdalus communis* L.).  
 Мыло, см. Качимъ стѣнной (*Gypsophilla muralis* L.).  
 Мыло воробьиное, см. Звѣздчатка злочи. (*Stellaria graminea* L.).  
 Мыло собачье, см. Грыжникъ гладкій (*Herniaria glabra* L.).  
 Мыло утиное, см. Качимъ стѣнной (*Gypsophilla muralis* L.).  
 Мышатникъ, см. Чечевица волосистая (*Ervum hirsutum* L.).  
 Мышей, см. Вѣвникъ наземный (*Calamagrostis epigeios* Roth.).  
 Мъсячная трава, см. Бурачокъ полевой (*Alyssum campestre* L.).  
 Мъшечникъ, см. Вишня жидовская (*Physalis Alkekengi* L.).  
 Мята глухая, см. Зеленчукъ желтый (*Galeobdolon luteum* Sm.).  
 Мята грецкая, см. Перечникъ широколист. (*Lepidium latifol.* L.).  
 Мята кінска } см. Яснотка стеблеобъемлющая (*Lamium amplex-*  
 Мята конская } *icaule* L.).  
 Мята собачья, см. Бѣлокудренникъ черный (*Ballota nigris* L.).  
 Мята степная, см. Котовникъ кошачій (*Nepeta Cataria* L.).  
 Мятликъ, см. Свербига восточная (*Bunias orientalis* L.).  
 Мяхунка, см. Вишня жидовская (*Physalis Alkekengi* L.).  
 Мяхунка-ягода, см. Вишня жидовская (*Physalis Alkekengi* L.).  
 Мяхъ-трава, см. Кирказонъ обыкновенн. (*Aristolochia clematitis* L.).  
 Наготки, см. Ноготки (*Calendula officinalis* L.).  
 Нагрызень, см. Капуста кочанная (*Brassica oleracea capitata* L.).  
 Надворникъ, см. Гусиная трава (*Potentilla anserina* L.).  
 Нардъ благовонный, см. Нардъ (*Nardostachys Jatamansi.*).  
 Нардъ восточный, см. Нардъ (*Nardostachys Jatamansi.*).  
 Нардъ индѣйскій, см. Нардъ (*Nardostachys Jatamansi.*).  
 Нардъ настоящій, см. Нардъ (*Nardostachys Jatamansi.*).  
 Натягачъ луговой, см. Смолевка ночевѣт. (*Silene noctifl.* L.).

- Нарывная трава, см. Лютик ядовитый (*Ranunculus sceleratus* L.).  
 Незабудка, см. Липучка репейч. (*Echinosper. Lappula* Lehm.).  
 Незабудка настоящая } см. Незабудка болотная (*Myositis*  
 Незабудцы } *palustris* With.).  
 Некленъ, см. Кленъ татарскій или русскій (*Acer tataricum* L.).  
 Неколкій, см. Буквица лекарственная (*Betonica vulgaris* L.).  
 Немошя, см. Бѣлена черная (*Hyosclamus niger* L.).  
 Непросыпка, см. Лапчатка серебристая (*Potentilla argentea* L.).  
 Нерамдживъ, см. Гранатовое дерево (*Punica Granatum* L.).  
 Нивяшка, см. Неслея метельчатая (*Neslea paniculata* Desf.).  
 Нога телячья, см. Аройникъ пятнистый (*Arum maculatum* L.).  
 Ногеловатокъ, см. Короставникъ полевой (*Scabiosa arvensis* L.).  
 Нокотки, см. Ноготки (*Calendula officinalis* L.).  
 Норичникъ, см. Касатикъ сибирскій (*Iris sibirica* L.).  
 Норышникъ, см. Дрокъ нѣмецкій (*Genista germanica* L.).  
 Носочистка, см. Тысячелистникъ общин. (*Achillea* Millerol. L.).  
 Нутренникъ, см. Ленъ дикий (*Linaria vulgaris* Mill.).  
 Нырокъ, см. Пырей ползучій (*Triticum repens* L.).  
 Нѣмка, см. Жимолость татарская (*Lonicera tatarica* L.).  
 Обгрызокъ чертовъ, см. Сивецъ луговой (*Scabiosa succisa* L.).  
 Овесъ, см. Гвоздика пышная (*Dianthus superbus* L.).  
 Оводъ, см. Рожь обыкновенная (*Secale cereale* L.).  
 Овражекъ, см. Спорынья (*Sclerotium Clavus* Dc.).  
 Овсецъ, см. Костерь ржаной (*Bromus secalinus* L.).  
 Овсягъ, см. Овсяница высокая (*Festuca elatior* L.).  
 Овсяница, см. Гребенникъ обыкновенный (*Lynosorus cristatus* L.).  
 Овсянуха, см. Костерь безостый (*Bromus inermis* Leyss.).  
 Огурецъ американскій, см. Арбузъ американскій (*Anguria* L.).  
 Огурецъ песій, см. Балзаминное дер. (*Momordica Balsam.* L.).  
 Огуречникъ, см. Медунца (*Spiraea ulmaria* L.).  
 Огуречница, см. Огуречная трава (*Borrago officinalis* L.).  
 Огурцы бѣшеные, см. Хлопушка (*Silene inflata* Smith.).  
 Огурцы дикие, см. Касатикъ водяной (*Iris pseudacorus* L.).  
 Огурцы дикие, см. Касатикъ сибирскій (*Iris sibirica* L.).  
 Огурчики, см. Касатикъ сибирскій (*Iris sibirica* L.).  
 Огурчики заячьи, см. Касатикъ сибирскій (*Iris sibirica* L.).  
 Одуръ, см. Бѣлена черная (*Hyosclamus niger* L.).  
 Озепка, см. Фиалка опушенная (*Viola hirta* L.).  
 Озерная осока, см. Ежеголовка вѣтв. (*Sparganium ramos.* L.).  
 Озжиха, см. Крапива жгучая, или мелкая (*Urtica urens* L.).  
 Олябка-трава, см. Клеверъ пашенный (*Trifolium arvense* L.).  
 Омежникъ водяной, см. Укропъ конскій (*Oenan. Phellandr.* L.).  
 Омила, см. Омела обыкновенная (*Viscum album* L.).  
 Омокъ, см. Водякъ разнолистный (*Cirsium heterophyllum* All.).  
 Опенокъ, см. Лисичка (*Cantharellus cibarius* Fr.).  
 Орепейникъ, см. Чертополохъ болотный (*Cirsium palustre* Scop.).  
 Орихи болотни, см. Орихи водяные (*Trapa natans* L.).  
 Орихи чортовы, см. Орихи водяные (*Trapa natans* L.).  
 Оришки заячі, см. Вобовникъ (*Amygdalus nana* L.).



- Орликъ, см. Бубенчики обыкновенные (*Adenophora bifolia* Ledt.).  
 Орлики, см. Горечавка крупная (*Gentiana pneumonanthe* L.).  
 Оршумъ, см. Бедренецъ большой (*Pimpinella magna* L.).  
 Орѣхъ, см. Миндаль обыкновенный (*Amygdalus communis* L.).  
 Орѣшки бѣлые, см. Клеверъ бѣлый (*Trifolium repens* L.).  
 Орѣшки полевые, см. Бобовникъ (*Amygdalus nana* L.).  
 Орѣшная трава, см. Альфа (*Lygeum Spartum* Loefl.).  
 Осатикъ, см. Чертополохъ полевой (*Cirsium arvense* Scop.).  
 Осенникъ, см. Опенокъ (*Agaricus melleus* Vahl.).  
 Оси́на, см. Осокорь обыкновенный (*Populus nigra* L.).  
 Осинка, см. Живучка ползучая (*Ajuga reptans* L.).  
 Осиновикъ, см. Березовый грибъ (*Boletus scaber* Bull.).  
 Осинový грибъ, см. Березовый грибъ (*Boletus scaber* Bull.).  
 Оситнягъ, см. Сусакъ зонтичный (*Butomus umbellatus* L.).  
 Оситнякъ, см. Сыть бурая (*Cyperus fuscus* L.).  
 Осокорь, см. Оси́на (*Populus tremula* L.).  
 Осокорь, см. Ива бѣлая (*Salix alba* L.).  
 Осотія, см. Чертополохъ курчавый (*Carduus crispus* L.).  
 Осоть, см. Колдунъ-трава (*Circaea lutetiana* L.).  
 Осоть, см. Чертополохъ болотный (*Cirsium palustre* Scop.).  
 Осоть, см. Чертополохъ огородный (*Cirsium oleraceum* Ml.).  
 Осоть лѣсной, см. Бодикъ разнолист. (*Cirsium heterophyllum* All.).  
 Осохарникъ, см. Сосна обыкновенная (*Pinus silvestris* L.).  
 Осочка полевая, см. Луговикъ дернистый (*Aira caespitosa* L.).  
 Остецъ, см. Смолевка повислая (*Silene nutans* L.).  
 Острая трава, см. Мелколепестникъ бѣлый (*Erigeron Acriis* L.).  
 Острецъ, см. Осока обыкновенная (*Carex vulgaris* Fr.).  
 Острожки дикія, см. Васильки рогат. (*Delphinium consol.* L.).  
 Остро́кровъ, см. Падубъ обыкновенный (*Ilex aquifolium* L.).  
 Осухарь, см. Осокорь обыкновенный (*Populus nigra* L.).  
 Отрава, см. Ласточникъ обыкн. (*Vincetoxicum officinale* Mön.).  
 Очи царскія, см. Бѣлозоръ болотный (*Parnassia palustris* L.).  
 Очки вороньи, см. Седмичникъ европ. (*Trientalis europaea* L.).  
 Очная трава, см. Очанка лекарств. (*Euphrasia officinal.* L.).  
 Очный цвѣтъ, см. Воробыиное просо (*Anagallis arvensis* L.).  
 Палеви́къ, см. Тимофеевка (*Phleum pratense* L.).  
 Пальма, см. Буксъ (*Buxus sempervirens* L.).  
 Пальмовое дерево, см. Буксъ (*Buxus sempervirens* L.).  
 Пальмовый кустъ, см. Буксъ (*Buxus sempervirens* L.).  
 Папоротниковая пальма, см. Цикасъ (*Cycas* L.).  
 Папороть, см. Орлякъ обыкновенный (*Pteris aquilina* L.).  
 Пастернакъ, см. Аксаметь (*Stium lanifolium*).  
 Пастернакъ полевой, см. Бедренецъ обыкн. (*Pimpinella sax.* L.).  
 Патранъ, см. Звѣздочка большая (*Astrantia major* L.).  
 Пахлу́нъ, см. Барбарисъ (*Berberis vulgaris* L.).  
 Паша, см. Авранъ лекарственный (*Gratiola officinalis* L.).  
 Паучникъ, см. Вѣсничникъ вѣтвистый (*Anthericum ramosum* L.).  
 Первенникъ желтый, см. Пушавка красил. (*Anthem. tinct.* L.).  
 Пердунъ, см. Рогоза широколистная (*Typha latifolia* L.).

- Переградъ, см. Борецъ синій (*Aconitum Napellus* L.).  
 Перійка, см. Костеръ мягкій (*Bromus mollis* L.).  
 Перекатитель, см. Качимъ метелч. (*Gypsophila panicul.* Led.).  
 Перелеть, см. Параличная трава (*Ajuga Chamaepitys.*).  
 Перелеть хаты, см. Вязель разноцвѣтнйй (*Coronilla varia* L.).  
 Переложная трава, см. Кошачьи лапки (*Antennaria dioica* G.).  
 Переломная, см. Лапчатка сѣровая (*Potentilla conescens* Bess.).  
 Перерва полевая, см. Астрagalъ солодкол. (*Astrag. glycyph.* L.).  
 Перець длинный, см. Имнй (*Helvchrisum arcnarium* Dc.).  
 Перечникъ, см. Разнолепестка горькая (*Ibris amara* L.).  
 Перигора, см. Трюфель чернйй (*Tuber cigarum* Sibth.).  
 Перо орлово, см. Уруть колосистый (*Myriophyllum spicatum* L.).  
 Петровская трава, см. Марьянникъ лугов (*Melamp. prat.* L.).  
 Перуанскій ячмень, см. Ячмень двуряд. (*Hordeum distich.* L.).  
 Пестушка свиная, см. Хвощъ лѣсной (*Equisetum silvaticum* L.).  
 Песчаника, см. Кошачьи лапки (*Antennaria dioica* Gaertn.).  
 Петрушекъ, см. Чина весенняя (*Orobus vernus* L.).  
 Печать Богородицына, см. Дряква европ. (*Cyclamen europ.* L.).  
 Печеница, см. Сивякъ обыкновенный (*Echium vulgare* L.).  
 Печиночна трава, см. Дымянка лекарств. (*Fumaria officinalis* L.).  
 Пивоникъ, см. Шпажникъ черепичатый (*Gladiolus imbricatus* L.).  
 Пижмо, см. Наголоватокъ краснйй (*Jurinea cyanoides* Rich.).  
 Пикульникъ, см. Касатикъ сибирскйй (*Iris sibirica* L.).  
 Пинія, см. Сосна каменная (*Pinus Pinea* L.).  
 Пирйй, см. Костеръ безостый (*Bromus inermis* Leyss.).  
 Пискуха, см. Шетинникъ сивйй (*Setaria glauca* Beauv.).  
 Пищальникъ, см. Бузина черная (*Sambucus nigra* L.).  
 Півника, см. Хохлатка полая (*Corydalis cava* Schw.).  
 Підлісокъ, см. Фіалка душистая (*Viola odorata* L.).  
 Пірйй, см. Пырей ползучйй (*Triticum repens* L.).  
 Плакунъ, см. Касатикъ сибирскйй (*Iris sibirica* L.).  
 Плакунъ, см. Кокушникъ (*Gymnadenia conopsea* Rich.).  
 Пласка, см. Ожика волосистая (*Luzula pilosa* Willd.).  
 Плипинникъ, см. Бедренець обыкнов. (*Pimpinella saxifraga* L.).  
 Плїтуха, см. Вьюнокъ заборный (*Couvolvulus sepium* L.).  
 Плывучникъ, см. Лілія водяная (*Nymphaea alba* L.).  
 Плющъ волчйй, см. Волчье лыко (*Daphne Mezereum* L.).  
 Повейка, см. Звѣздчатка злачная (*Stellaria graminea* L.).  
 Повелика, см. Дымянка лекарств. (*Fumaria officinalis* L.).  
 Повелина, см. Колокольчикъ сибирскйй (*Campanula sibirica* L.).  
 Повой высокйй, см. Сассанарель итальянская (*Smilax aspera* L.).  
 Повязокъ, см. Гусиная трава (*Potentilla anserina* L.).  
 Поганая трава, см. Бородавникъ обыкнов. (*Lampsana com.* L.).  
 Подберезовикъ, см. Березовый грибъ (*Boletus scaber* Bull.).  
 Подбируха, см. Повелика клеверная (*Cuscuta Epithymum* L.).  
 Подбѣлъ, см. Бодакъ разнолистный (*Cirsium heterophyllum* All.).  
 Подбѣлъ, см. Чертополохъ шерстистый (*Cirsium eriophorum* Scop.).  
 Подбѣльникъ, см. Алтей лекарств. (*Althaea officinalis* L.).  
 Подгребъ, см. Березовый грибъ (*Boletus scaber* Bull.).

- Поддубникъ, см. Герань кров.-красн. (*Geranium sanguin. L.*)  
 Подковникъ, см. Эспарсеть кормовой (*Onobrychis sativa Lam.*)  
 Подкоровникъ, см. Бѣлый грибъ, боровикъ (*Boletus edulis Bull.*)  
 Подлѣсъ, см. Колокольчикъ сборный (*Campanula glomerata L.*)  
 Подлѣсокъ, см. Фиалка собачья (*Viola canina L.*)  
 Подмаренникъ, см. Звѣздчатка большая (*Stellaria Holostea L.*)  
 Поднимокъ, см. Фиалка песчанная (*Viola arenaria Dc.*)  
 Подолешникъ, см. Колокольчикъ сборный (*Campan. glomer. L.*)  
 По орожникъ, см. Одуванчикъ лекарств. (*Taraxacum D. L. D.*)  
 Подорѣшникъ, см. Герань луговая (*Geranium pratense L.*)  
 Подорѣшникъ, см. Манжетка обыкновен. (*Alchemilla vulgaris Mill.*)  
 Подорѣшникъ, см. Красикъ (*Boletus luridus Schaeff.*)  
 Подоянка, см. Одуванчикъ лекарств. (*Taraxacum Dens Leonis Desf.*)  
 Подрѣзная трава, см. Сивецъ луговой (*Scabiosa succisa L.*)  
 Подсадная, см. Бодякъ разнолистный (*Cirsium heterophyllum All.*)  
 Поделиная трава, см. Лапчатка серебр. (*Potentilla argent. L.*)  
 Подсолнечникъ синій, см. Колокольчикъ персиколистный (*Campanula persicifolia L.*)  
 Поденѣжникъ, см. Поденѣжникъ обыкновен. (*Galanthus nivalis L.*)  
 Подчайникъ, см. Чесночная трава (*Allium officinalis Dc.*)  
 Пожарница полевая, см. Бухарникъ мягкій (*Holcus mollis L.*)  
 Позвонки, см. Звѣрбой обыкновен. (*Hypericum perforatum L.*)  
 Позіомки, см. Земляника лѣсная (*Fragaria vesca L.*)  
 Поланыця, см. Клубника (*Fragaria collina Ehrh.*)  
 Полевая трава, см. Марьянникъ полев. (*Melampyr. arv. L.*)  
 Полевелы, см. Куколь (*Lychnis Githago Scop.*)  
 Полій, см. Мята квасная (*Mentha aquatica L.*)  
 Полуклеверъ, см. Люцерна хмелевидная (*Medicago lupulina L.*)  
 Полосовая, см. Очанка лекарств. (*Euphrasia officinalis L.*)  
 Полуполба, см. Оркишъ (*Triticum monococcum L.*)  
 Полуничникъ, см. Клубника (*Fragaria collina Ehrh.*)  
 Полуночникъ, см. Земляника лѣсная (*Fragaria vesca L.*)  
 Полунишникъ, см. Земляника лѣсная (*Fragaria vesca L.*)  
 Полунишникъ яловій дикій, см. Бѣлоголовка (*Trifolium montanum L.*)  
 Полуцвѣтъ, см. Кошачьи лапки (*Antennaria dioica Gaertn.*)  
 Польшнокъ, см. Божье дерево (*Artemisia procera Willd.*)  
 Польшнъ, см. Польшнъ горькая (*Artemisia absinthium L.*)  
 Польшчатка, см. Росличка червонная (*Panicum sanguinale L.*)  
 Польшчникъ, см. Вербена лекарств. (*Verbena officinalis L.*)  
 Полюбимъ, см. Чернокорень лекарств. (*Cynoglossum officinale L.*)  
 Помашка, см. Циновникъ обыкновен. (*Chrysanth. Leucanth.*)  
 Помурная трава, см. Дѣвникъ (*Chrysanthemum parthenium Pers.*)  
 Понцалка, см. Аиръ обыкновен. (*Acorus calamus L.*)  
 Попава, см. Одуванчикъ лекарств. (*Taraxacum Dens Leonis Desf.*)  
 Поплавникъ, см. Лисохвостъ колѣнч. (*Alopecurus genicul. L.*)  
 Поповникъ, см. Бодякъ разнолист. (*Cirsium heterophyl. All.*)  
 Поползиха лѣсная, см. Линнея сѣверная (*Linnaea borealis L.*)  
 Поползуха, см. Манжетка обыкновен. (*Alchemilla vulgaris Mill.*)

- Попутникъ, см. Гусиная трава (*Potentilla anserina* L.).  
 Попы, см. Сивецъ луговой (*Scabiosa succisa* L.).  
 Порічки, см. Смородина красная (*Ribes rubrum* L.).  
 Портулакъ морской, см. Лебеда морская (*Atriplex Halimus* L.).  
 Порушникъ, см. Плаунъ сплюснутый (*Lycopod. complanat.* L.).  
 Порчакъ, см. Свербига восточная (*Bunias orientalis* L.).  
 Поръ, см. Поррей (*Allium Porrum* L.).  
 Порычки, см. Смородина черная (*Ribes nigrum* L.).  
 Порѣзина, см. Водякъ разнолистный (*Cirsium heterophyllum* All.).  
 Порѣчка, см. Смородина красная (*Ribes rubrum* L.).  
 Порѣчная, см. Незабудка болотная (*Myositis palustris* With.).  
 Посконъ, см. Медовникъ (*Galeopsis Tetrahit* L.).  
 Поспѣлка, см. Дубровка (*Veronica Chamaedrys* L.).  
 Постѣнка, см. Рѣзуха башенная (*Arabis turritis* L.).  
 Постѣнникъ, см. Рѣзуха башенная (*Arabis turritis* L.).  
 Пострѣлъ, см. Сонъ-трава (*Anemone patens* L.).  
 Пострѣлъ сухой, см. Подмаренникъ мягкій (*Gallium Mollugo* L.).  
 Похидня, см. Молочай кипарисный (*Euphorbia Cyparissias* Scop.).  
 Поцерки, см. Просвирникъ обыкновенный (*Malva rotundifolia* L.).  
 Пояснишникъ, см. Райграссъ англійскій (*Lolium perenne* L.).  
 Пралѣска, см. Касатикъ нѣмецкій (*Iris germanica* L.).  
 Пресовичная, см. Гравилатъ водяной (*Geum rivale* L.).  
 Прусеслина, см. Смородина глухая (*Ribes alpinum* L.).  
 Пригрызъ, см. Сивецъ луговой (*Scabiosa succisa* L.).  
 Примочная трава, см. Колокольчикъ крапиволистный (*Campanula Trachelium* L.).  
 Приемка-трава, см. Морковникъ луговой (*Silvaus pratensis* Bess.).  
 Прогенъ, см. Молочай обыкновенный (*Euphorbia Esula* L.).  
 Прозадникъ, см. Пазникъ крапч. (*Achyrophorus macul.* Scop.).  
 Прозорникъ, см. Тысячеголовъ (*Saponaria Vaccaria* L.).  
 Пролистень, см. Вороній глазъ четырехлист. (*Paris quadrof.* L.).  
 Проліска, см. Фіалка песчанная (*Viola arenaria* De.).  
 Пролѣсокъ, см. Полсѣжникъ обыкн. (*Galanthus nivalis* L.).  
 Просвирки, см. Просвирникъ раздѣльнолистный (*Malva Alcea* L.).  
 Просвирки бархатныя, см. Грудничникъ (*Abutilon Avicennae*).  
 Просо дикое, см. Амарантъ колосистый (*Amarantus retroflexus* L.).  
 Прострѣлка, см. Герань луговая (*Geranium pratense* L.).  
 Прострѣлка болотная, см. Белокопытникъ лекарственный.  
 Прострѣлъ, см. Вубенчикъ обыкн. (*Adenophora liliifolia* Led.).  
 Прострѣлъ, см. Пыльцевеленикъ красный (*Cephalant. rubia* Rich.).  
 Прострѣлъ см. Сонъ (*Anemone Pulsatilla* L.).  
 Прострѣлъ бѣлый, см. Нуница влагалки. (*Eriophor. vag.* L.).  
 Просурень гадючій, см. Брандушка (*Bulbocodium ruthenic.* B.).  
 Просьянка, см. Смородина глухая (*Ribes alpinum* L.).  
 Просьяная волоть, см. Окопникъ лекарств. (*Symphytum officin.* L.).  
 Протычъ, см. Пижма (*Tanacetum vulgare* L.).  
 Прычѣпа, см. Череда трехраздѣльная (*Bidens tripartita* L.).  
 Прѣлокъ, см. Горонекъ заборный (*Vicia sepium* L.).  
 Прѣснецъ, см. Береза бѣлая (*Betula alba* L.).

- Пряжа сорочья, см. Торица полевая (*Spergula arvensis* L.).  
 Птицесердъ, см. Анакардъ вестъ-индскій (*Anacard. occident.* L.).  
 Птичій клей, см. Омела обыкновенная (*Viscum album* L.).  
 Пузыкъ, см. Касатикъ сибирскій (*Iris sibirica* L.).  
 Пузырная трава, см. Вышня жидовская (*Physalis Alkekengi* L.).  
 Пупавка, см. Ястребинка зонтичная (*Hieracium umbellatum* L.).  
 Пупавникъ, см. Ромашка римская (*Anthemis nobilis* L.).  
 Пупникъ, см. Купена лекарственная (*Convallaria Polygonatum* L.).  
 Пушица, см. Дождевикъ шиловатый (*Lycoperdon gemmatum* R.).  
 Пустодомъ, см. Ромашка собачья (*Maruta Cotula* Dc.).  
 Пусторосль, см. Бузина красная (*Sambucus racemosus* L.).  
 Пустосель, см. Бодакъ разнолиственный (*Cirsium heterophyllum* All.).  
 Пустосель, см. Василекъ перистый (*Centaurea Scabiosa* L.).  
 Пустосѣль, см. Болыголовъ (*Conium maculatum* L.).  
 Пустошная, см. Щавель малый (*Rumex Acetosella* L.).  
 Пустырникъ, см. Укропъ конскій (*Oenanthe Phellandrium* Lam.).  
 Путики, см. Подорожникъ большой (*Plantago major* L.).  
 Пуховишникъ, см. Чертополохъ болот. (*Cirsium palust.* Scop.).  
 Пучки морковные, см. Купырь лѣсной (*Anthriscus silv.* H.).  
 Пушинникъ, см. Осотъ огородный (*Sonchus oleraceus* L.).  
 Пушникъ, см. Одуванчикъ лекарств. (*Taraxac. D. L. D.*).  
 Пушникъ, см. Скерла кровельная (*Crepis tectorum* L.).  
 Пушокъ, см. Острокильникъ волосистый (*Oxypetals pilosa* Dc.).  
 Пчельникъ, см. Заячья капуста (*Sedum Telephium* L.).  
 Пшеница буквишная, см. Гречиха настоящая (*Fagopyrum*).  
 Пшеница варварійская, см. Англіійская пшееница.  
 Пшеница крахмальная, см. Эммеръ (*Triticum dicoc.* Schr.).  
 Пшеница русская, см. Пшеница обыкн. (*Triticum vulg.* Vill.).  
 Пшеничка, см. Рогоза широколистная (*Typha latifolia* L.).  
 Пызонока, см. Земляника лѣсная (*Fragaria vesca* L.).  
 Пырей, см. Ежа сборная (*Dactylis glomerata* L.).  
 Пырей водяной, см. Бекманія (*Beckmannia erucaciformis* Host.).  
 Пырникъ, см. Просо колосистое (*Panicum Crus Galli* L.).  
 Пянки, см. Голубика (*Vaccinium uliginosum* L.).  
 Пьяный корень, см. Вѣлена черная (*Hyosciamus niger* L.).  
 Пьяница-ягода, см. Голубика (*Vaccinium uliginosum* L.).  
 Пѣвники боровые, см. Касатикъ сибирскій (*Iris sibirica* L.).  
 Пѣтушки, см. Башмачекъ красный (*Cypripedium macranthum* Sw.).  
 Пѣтушки, см. Касатикъ сибирскій (*Iris sibirica* L.).  
 Пѣтушнякъ, см. Василекъ синій (*Centaurea cyanus* L.).  
 Пявникъ болотный, см. Ятрышникъ шлемовид. (*Orchis mil.* L.)  
 Пятиперстница, см. Герань болотная (*Geranium palustre* L.).  
 Пятноцвѣтникъ, см. Абеседаря (*Spolianthes acmella* L.).  
 Рагульникъ, см. Вышница болотная (*Pedicularis palustris* L.).  
 Ракишникъ горный, см. Морковникъ лугов. (*Silaus pratens.* B.).  
 Расперстница, см. Мята лѣсная (*Mentha silvestris* L.).  
 Рай-дерево, см. Айлантъ (*Allanthur glandulosa* Desf.).  
 Рай-дерево, см. Сирень обыкновенная (*Syringa vulgaris* L.).  
 Райка съѣдобная, см. Помидоры (*Lycopersicum esculentum* Mill.).

- Райское дерево, см. Тополь душистый (*Populus balsamifera* L.)  
 Разбитная травка, см. Горошек мышиный (*Vicia cracca* L.)  
 Раздразникъ, см. Горчакъ (*Polygonum Persicaria* L.)  
 Разнобыль, см. Коровякъ белоцвѣтный (*Verbascum Lychnitis* L.)  
 Разнолистникъ, см. Палоротникъ черн. (*Struthiopt. german.* W.)  
 Разность безсѣменная, см. Виноградъ обыкновен. (*Vitis vinif.* L.)  
 Разноцвѣтъ, см. Бубенчики обыкн. (*Adenophora lilifol.* Led.)  
 Разноцвѣтъ, см. Плакунъ-трава (*Lythrum Salicaria* L.)  
 Ракита, см. Звѣробой обыкновенный (*Hypericum perforatum* L.)  
 Ракита, см. Ива ломкая (*Salix frangilis* L.)  
 Ракитникъ, см. Ива ушастая (*Salix aurita* L.)  
 Ранникъ, см. Подорожникъ ланцетный (*Plantago lanceolata* L.)  
 Раноцвѣтъ, см. Чай чагирскій (*Saxifraga crassifolia* L.)  
 Рапостоща, см. Кирказонъ обыкн. (*Aristolochia clematidis* L.)  
 Расходникъ, см. Горлець (*Polygonum Bistorta* L.)  
 Рдестъ бѣлый, см. Перецъ водяной (*Polygonum Hydropiper* L.)  
 Ревень дикій, см. Бегонія (*Begonia discolor* R. Br.)  
 Репей глухой, см. Бодякъ разнолист. (*Cirsium heterophyl.* All.)  
 Репей колкій, см. Дурнишникъ обыкн. (*Xanthum Strumar.* L.)  
 Репейникъ, см. Бодякъ разнолистный (*Cirsium heterophyl.* All.)  
 Репейникъ, см. Чертополохъ болотный (*Cirsium palustre* Scop.)  
 Репейникъ мелкій, см. Лебеда татарская (*Atriplex patula* L.)  
 Репехи, см. Василекъ перистый (*Centaurea Scabiosa* L.)  
 Репикъ, см. Посконникъ конопляный (*Eupatorium cannabinum* L.)  
 Репяшки весенніе, см. Острица лежач. (*Asperugo procum.* L.)  
 Ржанецъ, см. Тимофеевка (*Phleum pratense* L.)  
 Ржанецъ песочный, см. Аржанецъ песчан. (*Phleum arenar.* L.)  
 Ржаникъ, см. Подорожникъ ланцетный (*Plantago lanceolata* L.)  
 Ржевой цвѣтъ, см. Василекъ синій (*Centaurea cyanus* L.)  
 Риза, см. Ряска маленькая (*Lemna minor* Schl.)  
 Рогатикъ, см. Булавница желтая (*Clavaria flava* Pers.)  
 Роговикъ, см. Кизиль настоящий (*Cornus mas* L.)  
 Рогозь, см. Ситникъ развѣсистый (*Juncus effusus* L.)  
 Рогульки, см. Васильки рогатые (*Delphinium consolida* L.)  
 Рогъ олений, см. Укусное дерево (*Rhus typhnum* L.)  
 Родимая, см. Манжетка обыкновенная (*Alchemilla vulgaris* Mill.)  
 Рожа, см. Хатма тюрингенская (*Lavatera thuringiaca* L.)  
 Рожа полевая, см. Просвирикъ раздѣльный. (*Malva Alc.* L.)  
 Рожець, см. Тимофеевка (*Phleum pratense* L.)  
 Роза каменная, см. Солнечникъ обыкн. (*Helianthemum vulg.* Gär.)  
 Розанцы каменные, см. Боровикъ (*Daphne Cneorum* L.)  
 Розмаринъ дикій, см. Подбѣлъ (*Andromeda polifolia* L.)  
 Розривъ, см. Недотрога желтая (*Impatiens noli me tangere* L.)  
 Романова трава, см. Ломоносъ прямой (*Clematis recta* L.)  
 Ромашка, см. Пупавка полевая (*Anthemis arvensis* L.)  
 Ромашка голубая, см. Астра дикая (*Aster Amellus* L.)  
 Ромашка римская, см. Двѣникъ (*Chrysanthem. parthen.* Pers.)  
 Ропавка, см. Ханьки (*Cucurbita ovifera* L.)  
 Роса каменная, см. Болотникъ (*Callitriche verna* L.)

- Роста козья, см. Вероника ручная (*Veronica Beccabunga* L.).  
 Ростотеинъ, см. Чистотѣль большой (*Chelidonium majus* L.).  
 Ростъ, см. Тюльпанъ садовый, пли степной (*Tulipa gesneriana* L.).  
 Руда козья, см. Эспарсетъ кормовой (*Onobrychis sativa* Lam.).  
 Румянокъ собачій, см. Ромашка собачья (*Maruta Cotula* Dc.).  
 Рута, см. Валеріана лекарственная (*Valeriana officinalis* L.).  
 Рутва, см. Вязель разноцвѣтнй (*Coronilla varia* L.).  
 Ручка Богородичина, см. Чистотѣль парск. (*Osmunda regalis* L.).  
 Ручка Божья, см. Ятрышникъ мужской (*Orchis mascula* L.).  
 Ручка чертова, см. Кукушкины слезы (*Orchis maculata* L.).  
 Ручки пречистыя, см. Овсяница красная (*Festuca rubra* L.).  
 Рыпьяхи полевые, см. Чертополохъ поникл. (*Carduus nut.* L.).  
 Рыхлякъ, см. Овесъ обыкновенный (*Avena sativa* L.).  
 Рычанка, см. Брюква (*Brassica Napus* L.).  
 Рѣдка бѣлая, см. Хрѣнь (*Armoracia rusticana* Fl.).  
 Рѣдка земляная, см. Груша земляная (*Apium tuberosa* Moench.).  
 Рѣдка ручевая, см. Желтуха (*Senecio jacobea* L.).  
 Рѣзокъ, см. Полевица бѣлая (*Agrostis alba* L.).  
 Рѣзъ, см. Тѣлорѣзъ сабуровидный (*Stratiotes alodies* L.).  
 Рѣпа французская, см. Брюква (*Brassica Napus* L.).  
 Рѣпецъ, см. Лопушникъ большой (*Lappa major* Gärtn.).  
 Рѣпчатая трава, см. Тѣлорѣзъ сабуровид. (*Stratiotes aloid.* L.).  
 Рябинка, см. Синюха обыкновенная (*Polemonium coeruleum* L.).  
 Рябинка лѣсная, см. Кровохлебка лекарств. (*Sanguisorba offic.* L.).  
 Рябинка синяя, см. Орлякъ обыкновенный (*Pteris aquilina* L.).  
 Рябинчикъ, см. Калужеръ (*Tanacetum Balsamita* L.).  
 Рясть, см. Хохлатка плотная (*Corydalis solida* Smith.).  
 Рясть бичій, см. Хохлатка полая (*Corydalis cava* Schw.).  
 Рясть гіацинтовый, см. Хохлатка пол. (*Corydalis cava* Schw.).  
 Сабина, см. Кровохлебка лекарствен. (*Sanguisorba officinalis* L.).  
 Сагачка, см. Кукушкины слезы (*Orchis maculata* L.).  
 Саговая пальма, см. Цикасъ (*Cycas* L.).  
 Салата, см. Латукъ-салатъ (*Lactuca muralis* Less.).  
 Салата, см. Чистякъ (*Ficaria ranunculoides* Moench.).  
 Салатный корень, см. Ослиникъ двулѣт. (*Oenothera biennis* L.).  
 Салатъ полевой, см. Латукъ дикій (*Lactuca Scariola* L.).  
 Салепъ вестъ-индскій, см. Арапуртъ (*Marantha arundinacea* L.).  
 Самостой, см. Крестовникъ то колнстый (*Senecio erucaefolius* L.).  
 Самшитъ, см. Буксъ (*Buxus sempervirens* L.).  
 Свекла дикая, см. Кермекъ лимонный (*Statice limonium* L.).  
 Свербигузъ, см. Желтоцвѣтъ пахучій (*Barbarea vulgaris* R. Rr.).  
 Свинка, см. Пазникъ крапчатый (*Achyrophorus maculatus* Scop.).  
 Свинокропъ, см. Торница полевая (*Spergula arvensis* L.).  
 Свинукъ, см. Скерда двулѣтняя (*Crepis biennis* L.).  
 Свинюшникъ, см. Румянка лекарствен. (*Anchusa officinalis* L.).  
 Свирипа, см. Чесночная трава (*Alliaria officinalis* Dc.).  
 Свирѣль пастушеская, см. Частуха обикн. (*Alisma Plant.* L.).  
 Свирѣпка, см. Горчица черная (*Sinapsis nigra* L.).  
 Сдрыжникъ, см. Трясунка средняя (*Briza media* L.).

- Свѣрипа, см. Рапсъ озимый (*Brassica Napus olifera biennis* L.).  
 Святая пачора, см. Гроздовникъ обыкн. (*Botrychium* Lam. Sw.).  
 Селиванъ, см. Коровякъ черный (*Verbascum nigrum* L.).  
 Семилистникъ, см. Квафликъ (*Verbascum Blattaria* L.).  
 Сера, см. Лукъ обыкновенный (*Allium Cera* L.).  
 Серборизъ, см. Тысячелистникъ обыкн. (*Achillea Millefol.* L.).  
 Сердечная трава, см. Бедренецъ обыкн. (*Pimpinella saxifr.* L.).  
 Сердечникъ, см. Бѣлозоръ болотный (*Parnassia palustris* L.).  
 Сердочки, см. Пастушья сумка (*Capsella Bursa pastoris* Moench.).  
 Серебренникъ, см. Ландышъ майскій (*Convallaria majalis* L.).  
 Серезжи, см. Фуксія (*Fuchsia* Plum.).  
 Серпій, см. Ленъ дикій (*Linaria vulgaris* Mill.).  
 Серпуха, см. Водякъ разнолистный (*Cirsium heterophyllum* All.).  
 Серьги, см. Трисунка средняя (*Briza media* L.).  
 Серьги волчьи, см. Бересклетъ бородавч. (*Evonymus verrucos.* L.).  
 Сидачъ, см. Посконникъ конопляный (*Eupatorium cannabinum* L.).  
 Сикоморъ, см. Платанъ (*Platanus* L.).  
 Силиванъ, см. Коровякъ черный (*Verbascum nigrum* L.).  
 Синеголовникъ, см. Осотъ огородный (*Sonchus oleraceus* L.).  
 Синеводъ, см. Иванъ-чай (*Epilobium angustifolium* L.).  
 Синикъ, см. Красикъ (*Boletus Iridus* Schaeff.).  
 Синявка, см. Василекъ сивій (*Centaurea cyanus* L.).  
 Синявки, см. Незабудка средняя (*Myositis intermedia* Link.).  
 Сиротки, см. Пашникъ стеной (*Hyacinthus leucophaeus* Stev.).  
 Ситникъ, см. Вшивца хохлатая (*Pedicularis comosa* L.).  
 Ситница болотная, см. Шейхцерія болот. (*Scheuchzeria pal.* L.).  
 Скорникъ, см. Грыжникъ гладкій (*Herniaria glabra* L.).  
 Скотская трава, см. Частуха обыкновен. (*Alisma Plantago* L.).  
 Сладкая трава, см. Девясиль немецкій (*Inula germanica* L.).  
 Славецъ сосновый, см. Сосна горная (*Pinus montana* Mill.).  
 Слеза трава, см. Колючникъ беззубельн. (*Carlina subacaulis* Dc.).  
 Слезки зѣячы, см. Седмичникъ европ. (*Trientalis europaea* L.).  
 Слезки кукушкины, см. Ожика полевая (*Luzula campestris* Dc.).  
 Слезы кукушьи, см. Касатикъ сибирскій (*Iris sibirica* L.).  
 Слезюкъ, см. Просвирникъ раздѣльнолистный (*Malva Alcea* L.).  
 Словейка, см. Черноголовка обыкновен. (*Prunella vulgaris* L.).  
 Слодиннатъ, см. Окошникъ лекарств. (*Symphytum officinale* L.).  
 Слѣпокуръ, см. Свилина (*Cornus sanguinea* L.).  
 Слѣзота куряча, см. Воробейникъ (*Lithospermum coerul.* L.).  
 Слѣзъ, см. Просвирникъ раздѣльнолистный (*Malva Alcea* L.).  
 Слюнистая трава, см. Зубная трава (*Anthemis pirethrum* L.).  
 Смертьельникъ, см. Цминъ (*Helychrisum arenarium* Dc.).  
 Смертоѣдъ, см. Морозникъ бѣлодвѣтный (*Helleborus niger* L.).  
 Смерть овечья, см. Ковыль перистый (*Stipa pennata* L.).  
 Смѣлка, см. Смолевка повислая (*Silene nutans* L.).  
 Смѣлка біла, см. Смолевка повислая (*Silene nutans* L.).  
 Смѣлка червона, см. Смолка (*Lychnis Viscaria* L.).  
 Смолянка полевая, см. Дрема кук. цвѣтъ (*Lychnis flos cuc.* L.).  
 Смородина моховая, см. Морошка (*Rubus Chamaemorus* L.).



Сморчекъ бѣлый или березовый, см. Булавница красная  
 Смочка, см. Овсяница красная (*Festuca rubra* L.).  
 Снѣжки, см. Калина обыкновенная (*Viburnum Opulus* L.).  
 Собачка, см. Хохлатка полая (*Corydalis cava* Schw.).  
 Собачникъ, см. Черноголовка обыкновен. (*Prunella vulgaris* L.)  
 Сокирка, см. Колокольчикъ сибирскій (*Campanula sibirica* L.).  
 Сокольная ядовитая трава, см. Ястребинка стѣнная.  
 Соломон дина ручка, см. Ятрышникъ широкол. (*Orchis latif.* L.).  
 Солоней, см. Кермекъ (*Statice Gmelini* Willd.).  
 Соль баячья, см. Майникъ двулистный (*Majenthemum bifolium* L.).  
 Сольца, см. Майникъ двулистный (*Majenthemum bifolium* L.).  
 Сороконедужная, см. Ожика волосистая (*Luzula pilosa* Willd.).  
 Сосенка малая, см. Молочай кипарис. (*Euphorbia Cyparis* Sc.).  
 Сосинка, см. Вѣшникъ наземный (*Calamagrostis epigeios* Koch.).  
 Сотенникъ, см. Низзянка маленькая (*Centunculus minimum* L.).  
 Сочевница лѣсная, см. Дрокъ красильный (*Genista tinctoria* L.).  
 Спиканардъ, см. Нардъ (*Nardostachys Jatamansi*).  
 Спячка, см. Смолка (*Lychnis Viscaria* L.).  
 Стародубка, см. Горечавка полевая (*Gentiana campestris* L.).  
 Стебельникъ, см. Полѣвка многолѣтняя (*Mercurialis perennis* L.).  
 Стебъ, см. Аржанецъ песчаный (*Phleum arenarium* L.).  
 Стоголовникъ, см. Ленъ дикій (*Linaria vulgaris* Mill.).  
 Стрепавица, см. Крапива жгучая, или мелкая (*Urtica urens* L.).  
 Стручки сорочьи, см. Марьянникъ лугов. (*Melamp. pratens.* L.).  
 Ступа медвѣжья, см. Акантъ остролистный (*Acanthus mollis* L.).  
 Сурѣпица, см. Гулявникъ лекарств. (*Sisymbrium officin.* L.).  
 Суховершка, см. Клеверъ красно-бѣлый (*Trifolium hybridum* L.).  
 Суховершки, см. Живучка мохнатая (*Ajuga genevensis* L.).  
 Сухоребрица, см. Крупка пестенная (*Draba verna* L.).  
 Считаюкъ, см. Чистецъ однолѣтний (*Stachys annua* L.).  
 Съмена котовы, см. Ласточникъ обыкн. (*Vincetoxicum offic.* Moen.).  
 Съмя волчье, см. Спаржа обыкн. (*Asparagus officinalis* L.).  
 Съмя воробьиное, см. Анютины глазки (*Viola tricolor* L.).  
 Съмя воробьиное, см. Боръ развѣсистый (*Milium effusum* L.).  
 Съмя воробьиное, см. Воробейникъ лекарств. (*Lithosperm. off.* L.).  
 Съмя воробьиное, см. Лапчатка серебр. (*Potentilla argentea* L.).  
 Съмя воробьиное, см. Щавель малый (*Rumex Acetosella* L.).  
 Съмя голубиное, см. Кунырль лѣсной (*Anthriscus silvestris* Hoffm.).  
 Съмя горящное, см. Кушникъ желтый (*Nuphar luteum* Smith.).  
 Съмя дикое } см. Воробейникъ лекарств.  
 Съмя каменное аптекарское } (*Lithosperm. officin.* Moench.).  
 Съмя мышинное, см. Горюхъ къ мышиный (*Vicia cracca* L.).  
 Съмя сорочье, см. Анютины глазки (*Viola tricolor* L.).  
 Съно пьяное, см. Звѣздчатка злачная (*Stellaria graminea* L.).  
 Сърнякъ, см. Зеленчукъ желтый (*Galeobdolon luteum* Sm.).  
 Сывороточная трава, см. Яминникъ душист. (*Asperula odor.* L.).  
 Сырпутьникъ, см. Чистецъ болотный (*Stachys palustris* L.).  
 Табакъ, см. Махорка (*Nicotiana rustica* L.).  
 Табакъ волчій, см. Дождевикъ шиловат. (*Lycoperd. gemm. Ratch.*)

- Тала, см. Ива миндальная (*Salix amygdalina* L.).  
 Талабонъ, см. Ярутка полевая (*Thlaspi arvense* L.).  
 Тальникъ, см. Ива миндальная (*Salix amygdalina* L.).  
 Таралышникъ, см. Соколий перелетъ (*Gentiana cruciata* L.).  
 Тарасникъ, см. Разнолепестка горькая (*Ibris amara* L.).  
 Тармелина, см. Лапчатка-узикъ (*Potentilla Tormentilla* Schrenk.).  
 Тарчовникъ, см. Пармелія морщинистая (*Parmelia caperata*).  
 Татаринъ, см. Бодякъ разнолистный (*Cirsium heterophyllum* All.).  
 Татарки, см. Чертополохъ шерстистый (*Cirsium eriophorum* Scop.).  
 Татарникъ, см. Бодякъ разнолистный (*Cirsium heterophyllum* All.).  
 Тачка, см. Крушка весенняя (*Draba verna* L.).  
 Ташникъ, см. Пастушья сумка (*Capsella Bursa pastoris* Moench.).  
 Терловый копотъ, см. Ласточкинъ обикн. (*Vincetoxic. offic.* Moen.).  
 Темноцвѣтникъ, см. Айлантъ (*Ailanthus glandulosa* Desf.).  
 Тернѣ, см. Акантъ остролистный (*Acanthus mollis* L.).  
 Терновникъ, см. Акантъ остролистный (*Acanthus mollis* L.).  
 Терносливъ, см. Слива обикнов. (*Prunus domestica* L.).  
 Тернь, см. Акантъ остролистный (*Acanthus mollis* L.).  
 Типецъ, см. Овсяница овечья (*Festuca ovina* L.).  
 Типчакъ, см. Овсяница овечья (*Festuca ovina* L.).  
 Ткенна, см. Крушина слабительная (*Rhamnus cathartica* L.).  
 Томка, см. Колосокъ пахучій (*Anthoxanthum odoratum* L.).  
 Тонконігъ, см. Овсяница овечья (*Festuca ovina* L.).  
 Торица, см. Куколь (*Lychnis Githago* Scop.).  
 Тоѣдъ, см. Борецъ желтый (*Aconitum lycoctonum* L.).  
 Тоя, см. Борецъ синий (*Aconitum Napellus* L.).  
 Трава бѣшеная, см. Стародубка (*Gentiana Amarella* L.).  
 Трава войлочная, см. Повелика клевер. (*Cuscuta Epithym.* L.).  
 Трава волосяная, см. Тысячелистн. обикн. (*Achillea Millef.* L.).  
 Трава волчья, см. Купена лекарств. (*Convallaria Polygonatum* L.).  
 Трава волчья, см. Сусакъ зоничный (*Butomus umbellatus* L.).  
 Трава головная, см. Амарантъ колосист. (*Amarantus retroflex.* L.).  
 Трава доледубная, см. Дубровка (*Veronica Chamaedrys* L.).  
 Трава жабная, см. Сушеница болотная (*Gnaphallum uliginosum* L.).  
 Трава зеленый цвѣтъ, см. Василекъ синий (*Centaurea cyanus* L.).  
 Трава змѣева, см. Андреевъ крестъ (*Veronica spicata* L.).  
 Трава красная, см. Амарантъ колос. (*Amarantus retroflex.* L.).  
 Трава красная, см. Амарантъ метельч. (*Amarantus paniculat.* L.).  
 Трава крупнижная, см. Клубника (*Fragaria collina* Ehrh.).  
 Трава курячья, см. Мокрица (*Stellaria media* Smith.).  
 Трава луговая, см. Кермекъ лимонный (*Statice limonium* L.).  
 Трава мѣсячная, см. Колокольчикъ сибир. (*Campan. sibir.* L.).  
 Трава подляца, см. Акантъ остролистный (*Acanthus mollis* L.).  
 Трава попугайная, см. Амарантъ трехцв. (*Amarant. tricol.* L.).  
 Трава пчелиная, см. Асклепiасъ сирійскій (*Asclepias syrica* L.).  
 Трава пьяная, см. Звѣздчатка злачная (*Stellaria graminea* L.).  
 Трава сибирская, см. Касатикъ сибирскій (*Iris sibirica* L.).  
 Трава чесночная, см. Дубровникъ чесноч. (*Teucrium Scord.* L.).  
 Трава шелковая, см. Повелика клевер. (*Cuscuta Epithym.* L.).

Травка заячья, см. Кислица обыкновенная (*Oxalis acetosella* L.).  
 Травянка букеточная, см. Костенец зонтичный (*Holost. umbel.* L.).  
 Травянка, см. Звездчатка большая (*Stellaria Holostea* L.).  
 Травянчикъ, см. Гиацинт степной (*Hyacinthus leucophaeus* Stev.).  
 Трандахиль, см. Сирень обыкновенная (*Syringa vulgaris* L.).  
 Трепешникъ, см. Поддѣбникъ европейск. (*Sanicula europaea* L.).  
 Трепутникъ, см. Подорожникъ большой (*Plantago major* L.).  
 Трехлпникъ, см. Вахта трилистная (*Menyanthes trifoliata* L.).  
 Три брата, см. Очанка желтая (*Euphrasia lutea* L.).  
 Трибулька, см. Рѣзанецъ (*Allium Schoenoprasum* L.).  
 Тривьянца, см. Шиповникъ (*Rosa canina* L.).  
 Трилистникъ, см. Седмичникъ европ. (*Tridentalis europaea* L.).  
 Триперстница, см. Манжетка обыкновенная (*Alchemilla vulgaris* Mill.).  
 Трипутникъ, см. Подорожникъ песчаный (*Plantago arenar.* W. K.).  
 Трипутникъ, см. Сверція многолѣтняя (*Swertia perennis* L.).  
 Трифоль, см. Бѣлокрыльникъ болотный (*Calla palustris* L.).  
 Троечница, см. Седмичникъ европейскій (*Tridentalis europaea* L.).  
 Троица, см. Герань луговая (*Geranium pratense* L.).  
 Троишный цвѣтъ, см. Фиалка душистая (*Viola odorata* L.).  
 Троста, см. Касатикъ водяной (*Iris pseudacorus* L.).  
 Троста, см. Тростникъ обыкновенный (*Arundo Phragmites* L.).  
 Тростъ, см. Тростникъ обыкновенный (*Arundo Phragmites* L.).  
 Троянъ, см. Клеверъ луговой или посѣвной (*Trifolium pratense* L.).  
 Трудъ коневый, см. Авранъ лекарств. (*Gratiola officinalis* L.).  
 Трюфель, см. Трюфель черный (*Tuber cibarium* Sibth.).  
 Трюфель обыкновен., см. Трюфель черный (*Tuber cibarium* Sibth.).  
 Туланъ, см. Кермекъ татарскій (*Statice tatarica* L.).  
 Ткенна, см. Жасминъ полевой (*Lycium barbarum* L.).  
 Тырлычъ, см. Соколий перелетъ (*Gentiana cruciata* L.).  
 Удитки, см. Купальница европейская (*Trollius europaeus* L.).  
 Удотки, см. Купальница европейская (*Trollius europaeus* L.).  
 Ужички, см. Касатикъ водяной (*Iris pseudacorus* L.).  
 Узикъ, см. Горлецъ раковья шейки (*Polygonum Bistorta* L.).  
 Узикъ, см. Заячья капуста (*Sedum Telephium* L.).  
 Узикъ, см. Лапчатка-узикъ (*Potentilla Tormentilla* Schrenk.).  
 Узолька-травка, см. Дубровникъ обыкновенный (*Teucrium Chamaedrys* L.).  
 Укропъ, см. Горичникъ болотный (*Pencedanum palustre* Moench.).  
 Укропъ водяной, см. Кулпъ дѣсной (*Anthriscus silvestris* Hoffm.).  
 Укусникъ, см. Частуха обыкновенная (*Alisma Plantago* L.).  
 Уланки, см. Фуксія (*Fuchsia Plum.*).  
 Уманъ, см. Блошница обыкновенная (*Inula Pulicaria* L.).  
 Умела, см. Омела обыкновенная (*Viscum album* L.).  
 Умывальница, см. Дрема кук. цвѣтъ (*Lychnis flos cuculi* L.).  
 Уразная-травка, см. Василетникъ желтый (*Thalictrum flavum* L.).  
 Уразница, см. Вероника ручная (*Veronica Beccabunga* L.).  
 Урочная-травка, см. Вероника ручная (*Veronica Beccabunga* L.).  
 Урѣзная, см. Тысячелѣстникъ обыкновенный (*Achillea Millefolium* L.).  
 Устели-камень, см. Курпаточья-травка (*Dryas octopetala* L.).  
 Устрой, см. Чеснокъ посѣвной (*Allium sativum* L.).

- Ушки заячьи, см. Майникъ двулист. (*Majanthemum bifolium* L.).  
 Ушки мышьи, см. Ястребинка стѣнная (*Hieracium murorum* L.).  
 Фижда, см. Пижда (*Tanacetum vulgare* L.).  
 Филя, см. Просвирникъ раздѣльнолистный (*Malva Alcea* L.).  
 Фіалка луговая, см. Касатикъ сибирскій (*Iris sibirica* L.).  
 Фіалковый корень, см. Бѣлокрыльникъ болот. (*Calla palust.* L.).  
 Фіалокъ озимый, см. Фіалка ночная (*Hesperis matronalis* L.).  
 Фіориновая трава, см. Полевица бѣлая (*Agrostis alba* L.).  
 Фиміамникъ } см. Богородская трава (*Thymus Serpyll-*  
 Фиміамъ-чебрець } *lum* L.).  
 Французскія грудныя ягоды, см. Юба (*Zizyphus vulgar.* L.).  
 Хабръ, см. Аржанецъ песчаный (*Phleum arenarium* L.).  
 Хама желтая, см. Вербейникъ обыкн. (*Lysimachia vulgaris* L.).  
 Хвалильникъ, см. Кирказонъ обыкн. (*Aristolochia clematidis* L.).  
 Хвостикъ мышинный, см. Щетинникъ сиз. (*Setaria glauca* B.).  
 Хвостъ, см. Горичникъ лекарственный (*Peucedanum officinale* L.).  
 Хвостъ воловій, см. Асфодель (*Asphodelus ramosus* L.).  
 Хвостъ конскій, см. Сосенка водяная (*Hippuris vulgaris* L.).  
 Хвостъ собачій, см. Болякъ разнолист. (*Cirium heterophyl.* All.).  
 Хебдъ, см. Бузина вонючая (*Sambucus ebulus* L.).  
 Хлѣбъ Иванъ-трава, см. Стручки царград. (*Ceraton. seliq.* L.).  
 Хлѣбъ свиной, см. Дряква европейская (*Cyclamen europaeum* L.).  
 Хмелекъ, см. Подорожникъ песчаный (*Plantago arenaria* W. K.).  
 Хмелекъ, см. Черноголовка обыкн. (*Prunella vulgaris* L.).  
 Хмель, см. Купальница европейская (*Trollius europaeus* L.).  
 Хмель дикій, см. Деясиль британскій (*Inula britanica* L.).  
 Хоножникъ, см. Сосна обыкновенная (*Pinus silvestris* L.).  
 Храповникъ, см. Медуница (*Spiraea ulmaria* L.).  
 Хрестовая трава, см. Желтушникъ левк. (*Erysimum cheiranth.* L.).  
 Хрестовникъ, см. Донникъ лекарств. (*Mellilotus officinalis* Lam.).  
 Хринокъ, см. Перечникъ широколистный (*Lepidium latifolium* L.).  
 Христофорова трава, см. Воронежъ колосист. (*Actaea spicata* L.).  
 Христохоронка, см. Живучка ползучая (*Ajuga reptans* L.).  
 Хрънъ полевой, см. Рѣдка дикая (*Raphanus Raphanistrum* L.).  
 Худоба, см. Гроздовникъ обыкновенный (*Botrychium Lunaria* Sw.).  
 Хупавки, см. Пулавка красильная (*Anthemis tinctoria* L.).  
 Цапъ, см. Укропъ огородный (*Anethum graveolens* L.).  
 Цареградскій красный корень, см. Румянка лекарственная.  
 Царь-зелье, см. Борецъ синій (*Aconitum Napellus* L.).  
 Царь-зелье, см. Царскій корень (*Imperatoria Ostruthium* L.).  
 Цвечки, см. Слива обыкновенная (*Prunus domestica* L.).  
 Цвѣтки голубые, см. Василекъ синій (*Centaurea cyanus* L.).  
 Цвѣтникъ, см. Кизильникъ обыкн. (*Cotoneaster vulgaris* Lindl.).  
 Цвѣтокъ мелкій, см. Звѣздочка злачная (*Stellaria graminea* L.).  
 Цвѣтъ гвоздичный, см. Армерія обыкнов. (*Armeria vulgar.* W.).  
 Цвѣтъ голубиный, см. Медовникъ (*Galeopsis Tetrahit* L.).  
 Цвѣтъ желтый, см. Лютикъ золотистый (*Ranunculus Lingua* L.).  
 Цвѣтъ заячій, см. Майникъ двулист. (*Majanthemum bifol.* L.).  
 Целидонія, см. Чистотѣль большой (*Chelidonium majus* L.).

- Цибулька жабьяча, см. Плацинть степной (*Hyacinthus leucoph.*).  
 Цинговая, см. Незабудка средняя (*Myositis intermedia* Link.).  
 Цикорій русскій } см. Одуванчикъ лекарств. (*Taraxacum*  
 Цихорій полевой } *Dens L. D.*).  
 Цихорія полевая, см. Свербѣга восточная (*Bunias orientalis* L.).  
 Цыбулька котья, см. Шпажникъ черепич. (*Gladiolus imbric.* L.).  
 Цыкорія глухая, см. Золотая розга (*Solidago Virgaurea* L.).  
 Цындамъ, см. Колокольчикъ персикол. (*Campanula persicif.* L.).  
 Цыпуша, см. Василекъ луговой (*Centaurea jacea* L.).  
 Цырникъ, см. Ожика волосистая (*Luzula pilosa* Willd.).  
 Цвѣбная трава, см. Подлѣсникъ европ. (*Sanicula europaea* L.).  
 Цѣлистникъ, см. Залчья капуста (*Sedum Telephium* L.).  
 Цѣпа свинцовая, см. Свищовка (*Plumbago europea* L.).  
 Чаберъ московскій, см. Душевикъ остроп. (*Calamintha Asin.* B.).  
 Чакалъ, см. Рогоза широколистная (*Typha latifolia* L.).  
 Чандръ, см. Вербейникъ обыкновенный (*Lysimachia vulgaris* L.).  
 Чапалица степная, см. Вѣйникъ назем. (*Calamogr. epig.* Roth.).  
 Чаполица, см. Бекманія (*Beckmannia erucaeformis* Host.).  
 Чапыжникъ, см. Ююба (*Zizyphus vulgaris* L.).  
 Чахотная трава, см. Подбѣлъ (*Andromeda polifolia* L.).  
 Чай луговой, см. Плакунъ-трава (*Lythrum Salicaria* L.).  
 Чебрець, см. Ланчатка-узикъ (*Potentilla Torment.* Schrenk.).  
 Чеменникъ, см. Касатикъ сибирскій (*Iris sibirica* L.).  
 Чемерица, см. Чемерица бѣлая (*Veratrum album* L.).  
 Червецъ лѣсной, см. Бурачокъ черный (*Alyssum montanum* L.).  
 Червецъ, см. Ланчатка-узикъ (*Potentilla Tormentilla* Schrenk.).  
 Червивая, см. Майникъ двулистный (*Majanthemum bifolium* L.).  
 Червиha дикая, см. Бузина черная (*Sambucus nigra* L.).  
 Чербычникъ, см. Ярутка полевая (*Thlaspi arvense* L.).  
 Червошникъ, см. Вѣтренница лютич. (*Anemone ranunculoid.* L.).  
 Черевы, см. Мокрица (*Stellaria media* Smith.).  
 Черевышки коренье, см. Горлецъ (*Polygonum Bistorta* L.).  
 Череда, см. Чистецъ болотный (*Stachys palustris* L.).  
 Черемха, см. Крушина слабительная (*Rhamnus cathartica* L.).  
 Чемерица, см. Ариика горная (*Arnica montana* L.).  
 Чемерица, см. Брусника (*Vaccinium Vitis Idaea* L.).  
 Чернецъ, см. Воронецъ колосистый (*Actaea Spicata* L.).  
 Чернобыль, см. Божье дерево (*Artemisia procera* Willd.).  
 Черноголовка, см. Василекъ черноголовый (*Centaurea nigris* L.).  
 Черно-зілле, см. Лютикъ ядовитый (*Ranunculus sceleratus* L.).  
 Чернозябренникъ, см. Чистецъ болотный (*Stachys palustris* L.).  
 Чернокудренникъ, см. Вѣлокудренникъ черн. (*Ballota nigr.* L.).  
 Чернолоза, см. Ива бѣлая (*Salix alba* L.).  
 Чернолозь, см. Черноталь (*Salix pentandra* L.).  
 Чернотополь, см. Осокерь обыкновенный (*Populus nigra* L.).  
 Чертополохъ, см. Василекъ луговой (*Centaurea jacea* L.).  
 Чертополохъ, см. Василекъ черноголовый (*Centaurea nigris* L.).  
 Чертополохъ, см. Чертополохъ безстеб. (*Cirsium esculentum* C.).  
 Чертушка, см. Ласточникъ обыкн. (*Vincetoxicum officinale* M.).

- Чеснокъ дикій } см. Дубровникъ чесночный (*Teucrium*  
 Чеснокъ заячій } *Scordium* L.).  
 Чеснокъ конскій }  
 Чеснокъ полевой, см. Лукъ огородный (*Allium oleraceum* L.).  
 Честь Богонова трава, см. Бегонія (*Begonia discolor* R. Br.).  
 Чечевика, см. Чечевича настоящая (*Ervum Lens* L.).  
 Чешуйчатый корень, см. Петровъ крестъ (*Lathr. Squamar.* L.).  
 Чибакъ, см. Бадма (*Nelumbium Caspicum* Fisch.).  
 Чигина, см. Гусиная трава (*Potentilla anserina* L.).  
 Чижъ, см. Рогоза широколистная (*Typha latifolia* L.).  
 Чинарь, см. Платанъ (*Platanus* L.).  
 Чистецъ лѣсовой, см. Звѣздчатка большая (*Stellaria Holostea* L.).  
 Чистецъ, см. Крупка весенняя (*Draba verna* L.).  
 Чистоуетъ подумѣсячный, см. Гроздовникъ обыкновенный.  
 Чистякъ, см. Букашникъ горный (*Jasione montana* L.).  
 Чистякъ, см. Касатикъ водяной (*Iris pseudacorus* L.).  
 Чистякъ, см. Касатикъ сибирскій (*Iris sibirica* L.).  
 Чихранъ, см. Сафлоръ красильный (*Carthamus tinctorius* L.).  
 Чмаръ, см. Цминъ (*Helychrisum arenarium* De.).  
 Чоборъ, см. Богородская трава (*Thymus Serpyllum* L.).  
 Чосникъ кінскій, см. Чесночная трава (*Allium officinalis* De.).  
 Чумакъ, см. Айлантъ (*Allanthus glandulosa* Desf.).  
 Шаберъ, см. Верескъ обыкновенный (*Calluna vulgaris* Salisb.).  
 Шабура, см. Бодякъ разнолистный (*Cirsium heterophyllum* All.).  
 Шавлюкъ полевой, см. Щавель малый (*Rumex Acetosella* L.).  
 Шалфей, см. Андреевъ крестъ (*Veronica spicata* L.).  
 Шалфей дубровный, см. Чистецъ лѣсной (*Stachys silvatica* L.).  
 Шалфей полевой, см. Норичникъ узловат. (*Scrophular. nodosa* L.).  
 Шаль, см. Девясилъ иволжистый (*Inula salicina* L.).  
 Шампольникъ } см. Таволга алтайская (*Spiraea laevi-*  
 Шампольное дерево } *gata* L.).  
 Шандра, см. Бѣлокудренникъ черный (*Ballota nigris* L.).  
 Шандра, см. Яснотка пурпуровая (*Lamium purpureum* L.).  
 Шандра водяная, см. Зюзникъ европ. (*Lycopus europaeus* L.).  
 Шакта черная, см. Бѣлокудренникъ черный (*Ballota nigris* L.).  
 Шамшитъ, см. Букъ (*Buxus sempervirens* L.).  
 Шапка боярская, см. Горичникъ болотный (*Peucedanum palust.*).  
 Шапки полевая, см. Пупавка красильная (*Anthemis tinctoria* L.).  
 Шатеръ, см. Качимъ метельчатый (*Gypsophila paniculata* Led.).  
 Шафранъ полевой, см. Пупавка красил. (*Anthemis tinctor.* L.).  
 Шашкиболотныя, см. Вшивица болотная (*Pedicularis palustris* L.).  
 Шелковая трава, см. Канарейникъ тростник. (*Phalar. arundin.* L.).  
 Шелковая трава, см. Осока мохнатая (*Carex hirta* L.).  
 Шеръ-трава, см. Полѣска однолѣтняя (*Mercurialis annua* L.).  
 Шечевича, см. Люцерна серповидная (*Medicago falcata* L.).  
 Ширъ, см. Полѣска многолѣтняя (*Mercurialis perennis* L.).  
 Шильнякъ, см. Дерева вѣничная (*Genista scoparia* L.).  
 Шипки, см. Гранатовое дерево (*Punica Granatum* L.).  
 Шипокъ, см. Гранатовое дерево (*Punica Granatum* L.).

- Шишелъ, см. Звѣздчатка большая (*Stellaria Holostea* L.).  
 Шишка, см. Ерникъ обыкновенный (*Empetrum nigrum* L.).  
 Шовковица, см. Туповое дерево (*Morus nigra* L.).  
 Шолипиръ, см. Шиповникъ (*Rosa canina* L.).  
 Шолковая трава, см. Ковыль волосистый (*Stipa capillata* L.).  
 Шолковая трава, см. Ковыль перистый (*Stipa pennata* L.).  
 Шпараговый растъ, см. Петровъ крестъ (*Lathraea Squamaria* L.).  
 Шпинатъ перувианскій, см. Марь квиноа (*Chenopodium Quinoa*.).  
 Шуваръ, см. Крапива водяная (*Ceratophyllum densersum* L.).  
 Шульга, см. Омела обыкновенная (*Viscum album* L.).  
 Шшавель, см. Шавель малый (*Rumex Acetosella* L.).  
 Шавель мелкій, см. Кислица обыкновенная (*Oxalis acetosella* L.).  
 Щелкуно, см. Чернокорень лекарств. (*Cynoglossum officinale* L.).  
 Щетка, см. Сафлоръ красильный (*Carthamus tinctorius* L.).  
 Щецъ, см. Облѣнѣха обыкновенная (*Hippophaë rhamnoides* L.).  
 Ширъ, см. Очанка лекарственная (*Euphrasia officinalis* L.).  
 Эфирникъ, см. Ясенецъ бѣлый (*Dictamnus Fraxinella* Pers.).  
 Южа, см. Ежа сборная (*Dactilis glomerata* L.).  
 Яблоко, см. Яблоня (*Pyrus Malus* L.). . . .  
 Яворъ, см. Платанъ (*Platanus* L.).  
 Ягель корковидный, см. Буэллия точечн. (*Buellia punctata* Fek.).  
 Ягильникъ, см. Бедренецъ обыкновен. (*Pimpinella saxifraga* L.).  
 Ягода-дристуха, см. Черника (*Vaccinium Myrtilus* L.).  
 Ягоды волчьи, см. Жминда лозная (*Blitum virgatum* L.).  
 Ягоды волчьи, см. Толокнянка обыкновен. (*Arctostaphylos offic.*).  
 Ягоды зайцевы, см. Майникъ-двулист. (*Majanthemum bifol.* L.).  
 Ягоды кутяшьи, см. Кирказонъ обыкновен. (*Aristolochia clemat.* L.).  
 Ягоды лѣсныя, см. Мандрагора (*Atropa Mandragora* L.).  
 Ягоды собачьи, см. Крушина ломкая (*Rhamnus frangula* L.).  
 Ягоды сорочьи, см. Вербейникъ обыкновен. (*Lysimacha vulgaris* L.).  
 Ядринецъ, см. Бедренецъ обыкновен. (*Pimpinella saxifraga* L.).  
 Ядро лисье красное, см. Пыльцеголовникъ красный.  
 Яжевика, см. Яжевика обыкновенная (*Rubus fruticosus* L.).  
 Яжевичникъ, см. Куманика (*Rubus caesius* L.).  
 Языкъ воловій, см. Чернокорень лекарств. (*Cynogloss. offic.* L.).  
 Язычки бараньи, см. Буквица лекарств. (*Betonica vulgaris* L.).  
 Язычки воловые, см. Блошница проносн. (*Pulicaria dysent.* G.).  
 Язычникъ, см. Горлецъ раковыя шейки (*Polygonum Bistorta* L.).  
 Язычникъ, см. Сивецъ луговой (*Scabiosa succisa* L.).  
 Языкъ воловій, см. Бодякъ разнолист. (*Cirsium heterophyl* All.).  
 Яички, см. Фиалка ночная (*Platanthera bifolia* Rich.).  
 Яйца котовыя, см. Заячья капуста (*Sedum Telephium* L.).  
 Янтарка, см. Яблоня райская (*Pirus boccata* L.).  
 Ярможникъ-трава, см. Гайникъ широкол. (*Epipac. latif.* Sw.).  
 Ятрышникъ двулистный, см. Фиалка ночная.  
 Ясколка, см. Чистотѣль большой (*Chelidonium majus* L.).  
 Ястреница, см. Палайя (*Parauca vulgaris* De. sin. *Carica Papaya* L.).  
 Ячменникъ, см. Ожика волосистая (*Luzula pilosa* Willd.).

# АЛФАВИТНЫЙ СПИСОКЪ БОЛѢЗНЕЙ ЧЕЛОВѢКА

домашнія лечебныя средства противъ которыхъ находятся  
въ „СЛОВАРѢ-ТРАВНИКѢ и ЦВѢТНИКѢ“.

(Цифры, стоящія за названіемъ болѣзни, обозначаютъ страницы словаря.)

Англійская болѣзнь . . . . .	69. 104. 207. 289. 320. 566. 622. 648. 715.
Апоплексія . . . . .	11. 550. 615. 747.
Астма . . . . .	79. 86. 158. 177. 238. 334. 504. 878. 888. 1025. 1058.
Безплодіе . . . . .	350. 501.
Бессонница . . . 143. 205. 206. 519. 550. 555. 612. 615. 703. 747. 790. 853.	
872. 896. 899. 914. 925. 973. 1091.	
Бессонница у дѣтей . . . . .	502. 853.
Блззороукость . . . . .	206. 900.
Блѣдная немочь . . . . .	341. 430. 622. 642.
— Боли внизу живота . . . . .	163. 206. 338. 671. 853. 872. 1054. 1093.
Боль въ животѣ . . . 253. 257. 265. 269. 283. 310. 320. 384. 386. 403. 425.	
429. 472. 478. 507. 523. 533. 544. 550. 555. 570. 572. 584. 615. 625. 642.	
657. 675. 697. 704. 731. 732. 768. 779. 790. 797. 807. 843. 853. 871. 895.	
901. 925. 969. 1016. 1025.	
— Боль въ крестцѣ . . . . .	841.
Боль въ поясницѣ . . . . .	533. 547. 603. 622.
— Боль въ спинѣ . . . . .	584. 920.
Боль живота у дѣтей . . . . .	205. 668. 835. 853. 983. 990.
Болѣзни полостей рта . 79. 121. 125. 273. 289. 320. 332. 370. 400. 445.	
468. 559. 560. 561. 588. 655. 663. 691. 717. 804. 831. 912.	
Бородавки и пятна на кожѣ 85. 136. 247. 308. 316. 323. 368. 650. 658.	
691. 717. 760. 857. 1054.	
— Бронхитъ хроническій . . . . .	888. 930. 931.
Блѣлая горячка . . . . .	433.
Блѣли . . . . .	330. 368. 523. 639. 773.
Венерическія болѣзни . . . . .	308. 496. 590. 653. 871. 895. 1018. 1051.
Венерическія раны . . . . .	258.
Верета . . . . .	511. 626. 633. 769. 782. 784. 1040. 1052.
Веснушки . . . . .	357. 864.
Влгова пляска . . . . .	192. 204. 667.
Водобоязнь . . . . .	237. 335. 605. 639. 657. 658. 693. 763. 920. 1056. 1095.



Водянка 85. 99. 105. 135. 207. <u>244.</u> <u>247.</u> <u>248.</u> <u>249.</u> 320. 325. 329. 346. 400.	
402. 415. 430. 438. 445. 447. 463. 513. 528. 529. 535. 547. 570. 573. 597.	
633. 652. 653. 734. 743. 760. 781. 790. 800. 857. 872. 879. 895. 896. 925.	
930. 933. 936. 1010. 1093.	
Водянка головная . . . . .	682.
Водянка въ животѣ . . . . .	394. 504. 682.
Воспаленіе вѣкъ . . . . .	159. 227. 570. 990. <u>1025.</u> 1095.
Воспаленіе внутреннихъ органовъ . . . . .	<u>158.</u> <u>1063.</u>
Воспаленіе легкихъ . . . . .	252. 332. 432. 550. 579. 750. 888. <u>1001.</u>
Воспаленіе наружное . . . . .	<u>161.</u>
Воспаленіе слѣпой кишки . . . . .	544.
Вывихи . . . . .	686.
Выкидыши . . . . .	504. 1063.
Выпаденіе волосъ . . . . .	78. 119. 154. 252. 479. 542. 576. 597. 627. 718. V
Выпаденіе кишки . . . . .	533. 1093.
Гангрена . . . . .	329. 433.
Геморрой. 79. 119. 192. 206. 226. 242. 280. 313. 319. 340. 368. 392. 453.	
517. 530. 544. 547. 566. 570. 572. 627. 655. 663. 720. 726. 892. 965. 968	
1025. 1099.	
Глазные болѣзни 78. 81. 116. 133. 177. 192. 207. 212. 235. 384. 422. 471.	
504. 555. 577. 591. 615. 617. 627. 676. 682. 732. 848. 981. <u>1028.</u> 1095.	
Глисты 100. 135. 152. 193. 290. 329. 340. 344. 368. 403. 408. 429. 445. <u>461.</u>	
478. 520. 524. 525. 529. 530. 544. 570. 572. 584. 597. 615. 649. 650. 662.	
709. 715. 717. 740. 763. 790. 794. 797. 860. 895. 918. 920. 931. 976. 1010.	
1017. <u>1043.</u> <u>1044.</u> <u>1077.</u> <u>1089.</u> <u>1091.</u>	
Глухота . . . . .	78. 257. 550. 597. <u>1025.</u> <u>1094.</u> V
Головные боли 78. 100. 104. 116. 125. 154. 158. 204. 283. 327. 357. 368.	
412. 419. 473. 507. 537. 550. 590. 591. 603. 604. 624. 625. 626. 763. 773.	
797. 804. 844. 872. 881. 884. <u>936.</u> <u>953.</u> <u>995.</u> <u>1025.</u>	
Головокруженіе 100. 154. 206. 550. 615. 642. 747. 763. 844. 924. <u>953.</u> 990.	
Гоннорея . . . . .	876. 886.
Горловые болѣзни . 81. 121. 131. 308. 316. 351. 370. 422. 428. 448. 469.	
496. 533. 550. 572. 617. 639. 663. 677. 697. 711. 732. 793. 806. 848. 852.	
853. 857. 872. <u>999.</u> <u>1032.</u> <u>1050.</u> <u>1051.</u> <u>1058.</u> <u>1094.</u>	
Горячка . . . . .	473. 1072.
Гриппъ . . . . .	99. 158. 418. 732. 1001.
Грудница . . . . .	655.
Грудные болѣзни 80. 86. 94. 148. 175. 210. 252. 258. 269. 283. 340. 365.	
381. 386. 394. 398. 422. 426. 493. 533. 543. 544. 550. 572. 597. 615. 624.	
639. 648. 707. 732. 747. 792. 797. 807. 896. 942. 953. 991. 999. 1018.	
1032. 1080. 1099.	
Грыжа 192. 237. 239. 257. 304. 313. 377. 392. 469. 473. 521. 525. 543. 547.	
562. 568. 570. 605. 680. 693. 732. 797. 892. 958. 1072. 1097.	
Дизентерія . . . . .	95. 418. 841. 868. 998.
Диспепсія . . . . .	1001.
Дифтеритъ . . . . .	120. 432. 577.
Душевная болѣзнь . . . . .	334. 615.
Жаба . . . . .	308. 346. 351. 717. 732. <u>1094.</u>
Жаръ . . . . .	228. 323. 576.

Желёзы . . . . .	177. 352. 368. 530. 597. 603. 621. 781. <u>1015.</u>
Желёзы (миндалевидныя) . . . . .	366. 367. 912. <u>1058.</u>
Желтуха 100. 207. 265. 310. 323. 340. 523. 525. 528. 538. 566. 576. 579. 622. 682. 734. 763. 800. 815. 925. 1010. 1054. 1061. 1093. 1094.	
Желудочныя болѣзни 69. 79. 80. 89. 92. 100. 101. 131. 133. 135. 144. 152. 154. 175. 192. 210. 212. 247. 348. 344. 403. 425. 426. 432. 478. 556. 604. 606. 612. 646. 684. 709. 750. 759. 786. 791. 818. 834. 835. 841. 853. 912. <u>962. 1003. 1081.</u>	
Желчь . . . . .	77. 226. 547. 697. 709. 763. 1018.
Женскія болѣзни 148. 222. 247. 258. 340. 402. 469. 523. 543. 572. 615. 653. 668. 751. 752. 759. 791. 807. 968. <u>1066. 1094.</u>	
Заворотъ кишечъ . . . . .	192.
Загаръ . . . . .	347. 701.
Задержка мочи 206. 210. 249. 321. 329. 393. 415. 429. 463. 504. 523. 576. 578. 588. 590. 593. 597. 664. 673. 701. 754. 760. 763. 794. 800. 844. 887. 890. 901. <u>991. 1042. 1073.</u>	
Занозы . . . . .	626.
Запой . . . . .	148. 244.
Запоры 63. 75. 77. 79. 81. 104. 119. 131. 133. 154. 161. 177. 181. 210. 225. 265. 272. 282. 297. 310. 324. 340. 368. 412. 440. 447. 451. 473. 477. 478. 504. 529. 535. 544. 566. 572. 573. 576. 610. 613. 620. 621. 622. 627. 663. 684. 694. 697. 701. 709. 759. 813. 835. 872. 878. 881. 904. 908. 959. <u>1069. 1081. 1090.</u>	
Зобъ . . . . .	238. 336. 485. 603. 781.
Золотуха 69. 91. 105. 114. 154. 210. 267. 269. 289. 327. 330. 336. 398. 411. 504. 523. 568. 570. 629. 633. 663. 682. 693. 715. 717. 732. 779. 783. 797. 804. 806. 815. 866. 878. 890. 930. 931. 969. 1028. 1042. 1050. 1051. 1054. 1099.	
Зубныя болѣзни 85. 121. 125. 159. 235. 247. 255. 258. 272. 326. 327. 330. 338. 351. 390. 448. 455. 487. 491. 496. 544. 579. 583. 591. 639. 667. 676. 773. 782. 792. 853. 881. 884. 896. 913. 914. 925. <u>960. 1003. 1016. 1025.</u> <u>1047. 1069.</u>	
Зудъ . . . . .	235. 444. 627.
Ибога . . . . .	550. <u>1025.</u>
Инфлуэнца . . . . .	579.
Ипохондрія . . . . .	400. 134. 763. <u>1025.</u>
Испугъ у дѣтей . . . . .	70. 768. 797. 899. <u>1040.</u>
Истерика 204. 247. 351. 402. 403. 624. 627. 779. 925. 1050. 1051. <u>1053.</u> <u>1094.</u>	
Истерическія припадки . . . . .	104. 152. 403. 642. 693.
Истерическія судороги . . . . .	86. 433. 523. 530. 639.
Истощеніе . . . . .	85. 441.
Каменная болѣзнь 100. 192. 218. 236. 400. 504. 524. 525. 529. 572. 573. 584. 593. 597. 615. 646. 673. 685. 704. 760. 790. 844. 900. 936. 953. <u>964.</u> <u>990. 1010. 1043. 1099.</u>	
Карбункулъ . . . . .	380.
Катарръ бронхъ . . . . .	100. 120. 226. 252. 323. 340. 418. 584. 912. 983.
Катарръ дыхательныхъ органовъ 253. 313. 419. 432. 620. 704. 844. <u>905.</u> <u>931. 978. 983.</u>	


Катарръ глотки . . . . .	912.
Катарръ желудка . . . . .	80. 226. 227. 309. 343. 925. 1010.
Катарръ кишки . . . . .	80. 226. 309. 620. 709. 925.
Кашель 80. 89. 131. 148. 154. 177. 180. 193. 210. 212. 220. 265. 269. 272. -	
283. 297. 309. 328. 340. 384. 386. 417. 418. 419. 425. 447. 453. 463. 471.	
472. 487. 512. 542. 543. 550. 554. 566. 568. 572. 585. 615. 633. 636. 646.	
648. 663. 677. 681. 701. 704. 709. 715. 732. 782. 786. 792. 793. 796. 797.	
804. 818. 848. 866. 872. 896. 912. 923. 925. 940. 953. 1018. 1028. 1043.	
1081. 1091.	
Книжка болзни 254. 290. 329. 419. 421. 442. 477. 579. 615. 638. 673.	
709. 790. 835. 912. 935. 982. 995. 1010. 1081.	
Коклюшъ . . . . .	99. 104. 114. 158. 192. 297. 419. 857. 912. 924. 1017. 1025.
Коллики . . . . .	192. 504. 530. 544. 572. 615. 712. 766. 918. 1040.
Коллики живота отъ скопления газовъ 89. 472. 536. 613. 615. 642. 673. -	
709. 760. 853. 914. 1040.	
Колотье въ бокахъ и груди . . . . .	401. 542. 585.
Колтушь . . . . .	125. 163. 1051. 1068. 1086.
Конвульси у дѣтей . . . . .	926.
Корь . . . . .	158. 418. 432. 615. 751. 1003.
Костовда . . . . .	78. 159. 235.
Кровавая моча . . . . .	400. 504.
Кровавый поносъ . 79. 215. 351. 405. 418. 458. 477. 533. 572. 596. 779.	
782. 876. 912. 1003. 1036. 1095. 1096. 1097.	
Кровеносные сосуди . . . . .	682.
Кровотеченіе 78. 215. 249. 258. 265. 289. 319. 328. 330. 340. 346. 347. 390.	
415. 419. 445. 453. 461. 462. 533. 559. 560. 561. 639. 681. 745. 752. 818.	
831. 935. 945. 1004. 1097.	
Кровотеченіе изъ носа . 78. 523. 579. 667. 707. 935. 1003. 1063. 1094.	
Кровохарканіе 158. 215. 328. 366. 526. 568. 572. 597. 682. 704. 857. 876.	
886.	
Кружное воспаленіе легкихъ . . . . .	681. 931.
Крупи . . . . .	120. 418. 857.
Крупи ложный . . . . .	418.
Куриная слѣнота . . . . .	70. 248. 1095.
Легкихъ болзни. 252. 309. 329. 343. 453. 551. 584. 633. 681. 712. 818.	
848. 857. 888. 912. 931. 940. 1003. 1028.	
Лимфатическія железы . . . . .	153. 154. 682. -
Лихорадка 175. 177. 220. 227. 242. 247. 248. 320. 351. 377. 398. 403. 419.	
469. 471. 473. 477. 482. 496. 524. 525. 535. 555. 605. 617. 653. 693. 720.	
740. 744. 745. 747. 750. 782. 790. 797. 800. 804. 848. 852. 857. 892. 900.	
925. 972. 991. 1089. 1091. 1099.	
Лихорадка вслѣдствіе катарральн. состоянія внутр. органовъ . 86	
Лихорадка гастрическая . . . . .	682
Лихорадка желчная . . . . .	945.
Лихорадка крапивная . . . . .	85. 158. 579.
Лихорадка перемежающаяся 63. 99. 100. 135. 158. 159. 213. 235. 236.	
249. 289. 328. 340. 341. 356. 407. 408. 415. 416. 419. 432. 461. 507. 519.	
556. 579. 591. 615. 711. 726. 752. 754. 790. 793. 852. 857. 920. 1001.	
1002. 1017. 1025. 1028. 1036. 1043. 1074.	

Лишай	119. 135. 159. 336. 340. 347. 370. 544. 591. 653. 717. 796. <u>995. 1018.</u> 1095. 1096.
Ломота	258. 323. 327. 328. 349. 384. 463. 469. 524. 525. 530. 547. 572. 578. 590. 605. 610. 615. 622. 639. 642. 680. 715. 747. 763. 765. 796. 818. 896. 936. 969. 995. 1016. 1028. 1034. 1073.
Ломота ногъ	207. 210. 572. 686. 711.
Лунатизмъ	751
Малокровіе	79. 85. 86. 100. 104. 154. 206. 309. 326. 328. 340. 734. 925. <u>978. 1061. 1069.</u>
Маша	247. 925.
Маточныя кровотеченія	453. 458. 477. 509. 523. 542. 681. 745. 853. 935. 1073.
Меланхолія	193. 247. 504. 590. 682. 924. 1025.
Менструація	104. 116. 135. 154. 207. 210. 215. 247. 326. 351. 357. 366. 402. 463. 471. 505. 555. 556. 596. 625. 642. 668. 697. 701. 717. 753. 754. 759. 763. 773. 849. 868. 897. 924. <u>978. 1001. 1031. 1032. 1050. 1051.</u> 1061.
Мягиснь	238. 507. 674. 747.
Мозгъ	550. 615. 621. 667. 1001.
Мозоли	381. 655. 658. 691. 734. <u>1041.</u>
Молочница	215. 351. 366. 381. 596. 655. 663. 685. 717. 818.
Мочевыхъ органовъ болѣзни	394. 504. 584. 620. 652. 760. 912.
Мочевой пузырь	222. 236. 336. 504. 550. 573. 584. 591. 652. 663. 797. 853. 868. 878. 933. 936. 940. 963. 976. <u>1007. 1021. 1097. 1099</u>
Мочепусканіе	64. 80. 85. 101. 135. 154. 175. 192. 212. 235. 325. 461. 550. 571. 572. 576. 597. 615. 620. 621. 663. 717. 718. 744. 844. 961. <u>978. 1017.</u>
Мышцы	585. 673. 754.
Нажожныя болѣзни	81. 85. 91. 411. 415. 570. <u>1054. 1070. 1074.</u>
Нарывы	279. 473. 530. 597. 600. 605. 633. 693. 712. 782. 784. <u>1030.</u>
Насморкъ	116. 136. 177. 326. 368. 447. 507. 544. 724. 773. 844. 891.
Невралгія	159. 192. 193. 204. 238. 433. 642. 998. 1001. 1002. 1025.
Недомоганіе общее	512.
Нервы	78. 86. 92. 104. 154. 163. 193. 204. 222. 247. 283. 333. 334. 368. 402. 403. 426. 432. 473. 507. 550. 555. 584. 612. 615. 624. 642. 668. 673. 703. 750. 756. 793. 819. 872. 879. <u>953. 972. 990. 1001. 1002. 1032.</u> 1069.
Ноготки	610. <u>1017.</u>
Носовыя болѣзни	674.
Обморокъ	642. 1025. 1050. <u>1051.</u>
Одышка	104. 134. 270. 327. 334. 425. 511. 636. 663. 681. 682.
Ожоги	349. 366. 381. 415. 538. 544. 593. 597. 655. 663. 691. 709. 718. 965. 1082.
Опѣтые члены	926
Опрѣлость у мал. дѣтей	444. 769.
Опухоли ногъ	70. 294.
Опухоль	85. 177. 207. 273. 316. 321. 336. 462. 469. 537. 546. 550. 566. 576. 578. 597. 600. 610. 629. 671. 717. 751. 800. 811. 892. 904. 1050. 1051.
Опухоль злокачественная	109.

Опухоль на костях . . . . .	159.
Ослабленіе памяти . . . . .	682. 708. 990.
Оспа . . . . .	158. 368. 519. 751. 1003.
Острыя сыпныя болѣзни . . . . .	1001
Отекъ ногъ . . . . .	270. 681. 682. 897.
Отмораживаніе . . . . .	667. 668. 866. 925. 1082.
Отравленіе 105. 153. 158. 192. 198. 204. 222. 283. 330. 418. 429. 433. 119.	
577. 579. 613. 646. 709. 787. 792. 844. 972. 1003.	
Отрыжка . . . . .	79. 154. 579. 834. 1025.
Падучая болѣзнь 192. 204. 258. 308. 334. 338. 555. 734. 763. 793. 900.	
918. 1031. 1054.	
Параличъ 85. 99. 100. 104. 135. 235. 247. 283. 338. 524. 525. 550. 551. 624.	
668. 708. 751. 849. 851. 1018. 1025.	
Пароксизмъ . . . . .	556.
Парши на головѣ . . . . .	248.
Переутомленіе . . . . .	519. 621. 708.
Перхоть въ головѣ . . . . .	627. 708. 1032. 1041. 1052.
Печень 77. 104. 390. 440. 451. 504. 620. 648. 682. 704. 750. 753. 781. 790.	
853. 872. 1021. 1061. 1066. 1094.	
Пищевареніе 69. 77. 86. 92. 94. 95. 100. 104. 121. 163. 204. 205. 210. 213.	
227. 228. 239. 267. 289. 310. 339. 343. 398. 415. 416. 422. 426. 427. 467.	
510. 519. 555. 568. 668. 704. 708. 754. 763. 790. 818. 834. 864. 868. 872.	
875. 916. 962. 972. 978. 1001. 1010. 1028. 1031.	
Плевритъ . . . . .	226. 572. 681. 682.
Поврежденіе въ костяхъ . . . . .	680.
Подagra 69. 99. 105. 135. 192. 238. 247. 249. 253. 258. 267. 328. 394. 415.	
463. 544. 566. 591. 593. 627. 642. 671. 682. 710. 844. 849. 878. 916. 925.	
930. 964. 965. 1010. 1021. 1043.	
Подложечныя болѣ . . . . .	668.
Полипы . . . . .	100.
Полнокровіе . . . . .	717.
Понось 73. 79. 80. 85. 94. 95. 125. 163. 193. 210. 227. 236. 273. 289. 290.	
297. 298. 309. 336. 346. 356. 366. 377. 392. 400. 405. 408. 449. 453. 465.	
478. 509. 521. 524. 525. 543. 548. 559. 560. 561. 572. 578. 627. 633. 639.	
669. 673. 677. 697. 707. 717. 752. 779. 786. 793. 800. 831. 834. 844. 848.	
853. 868. 871. 925. 935. 1002. 1023. 1025. 1028. 1030. 1032. 1036. 1048.	
1066. 1073. 1097. 1098.	
Порокъ сердца . . . . .	682.
Порезы . . . . .	320. 381. 511. 636. 691. 920. 1034.
Послѣродовыя болѣзни . . . . .	298. 304. 511. 519. 624. 642. 815. 1018.
Потъ . . . . .	135.
Почки . . . . .	226. 323. 344. 477. 652. 762. 878. 925. 933. 1094.
Приливы крови къ головѣ . . . . .	78. 206. 1025.
Пролетѣи . . . . .	330. 349. 356. 407. 1036.
Прорѣзываніе зубовъ . . . . .	985.
Простудныя болѣзни 176. 218. 220. 249. 298. 308. 327. 328. 390. 415. 425.	
463. 469. 471. 544. 550. 579. 590. 615. 617. 710. 724. 750. 796. 797. 800.	
815. 853. 864. 871. 925. 1002. 1016. 1018. 1021. 1032. 1040. 1058.	
Прыщи и угри . . . . .	570. 617. 619. 655. 701. 760. 1052.

Пьянство . . . . .	440. 442. 507.
Раздраженное состояніе духа . . . . .	78. 1025.
Ракъ . . . . .	100. 154. 336. 577. 663. 734. 781. 1042.
Раны 78. 99. 119. 161. 296. 298. 323. 329. 349. 351. 356. 358. 366. 377. 380.	
400. 407. 511. 521. 596. 600. 605. 621. 626. 636. 638. 680. 686. 691. 693.	
736. 779. 782. 784. 804. 894. 920. 1047. 1089.	
Разстройство кишечника . . . . .	249. 449.
Рвота . . . . .	79. 193. 519. 577. 790. 1017.
Ревматизмъ 85. 100. 101. 105. 114. 116. 135. 158. 192. 206. 247. 249. 253.	
329. 338. 368. 380. 394. 415. 520. 547. 579. 591. 593. 642. 681. 710. 751.	
754. 763. 777. 844. 849. 851. 878. 879. 916. 925. 926. 930. 936. 965. 996.	
1028.	
Родимецъ . . . . .	308. 555. 768. 899.
Родовыя болѣзни . . . . .	509. 897. 926.
Рожь . . . . .	432. 544. 784. 848. 853. 988. 1004.
Сердце . . . . .	105. 158. 227. 619. 657. 681. 682. 933. 1025. 1047.
Сердцебиеніе . . . . .	247. 550. 555. 642. 681. 708. 818. 924. 991. 1093.
Сибирская язва . . . . .	547. 783.
Сифилисъ 247. 253. 590. 591. 593. 671. 710. 717. 720. 878. 879. 925. 965.	
1028. 1089.	
Скарлатина . . . . .	85. 158. 432. 679.
Скорбуть . . . . .	89. 100. 362. 517. 546. 720. 781. 1010. 1044.
Слабость зрѣнія . . . . .	210. 298. 597. 924. 1017.
Слабость ногъ и рукъ . . . . .	604. 610.
Слабость общая 215. 227. 340. 419. 432. 433. 547. 550. 768. 1002. 1016.	
1025. 1042.	
Слабость въ ногахъ у дѣтей . . . . .	407.
Слабость мужская . . . . .	380.
Слабоуміе . . . . .	193.
Селезенки болѣзни . . . . .	438. 753. 790. 872. 940.
Слезотеченіе . . . . .	78. 357. 370. 732. 945.
Слизистой оболочки болѣзни 426. 467. 554. 696. 831. 844. 905. 972. 1058.	
Слизетеченіе 77. 249. 273. 289. 309. 329. 330. 346. 356. 415. 453. 458. 461. 559.	
576. 653. 752. 935.	
Соски груди кормящ. женщинъ . . . . .	116. 119. 655. 718.
Соадины . . . . .	349. 691.
Судороги 70. 193. 222. 321. 338. 357. 377. 433. 504. 507. 519. 550. 615. 624.	
642. 667. 732. 747. 768. 790. 852. 853. 890. 1063. 1094.	
Сумасшествіе . . . . .	892. 1018. 1025.
Суставовъ болѣзни 380. 386. 578. 584. 591. 603. 622. 648. 712. 754. 930.	
953. 1025.	
Сухотка . . . . .	320. 1000.
Сыпь 81. 85. 91. 119. 125. 135. 158. 210. 213. 222. 235. 247. 309. 310. 326.	
411. 444. 588. 591. 593. 619. 627. 653. 667. 671. 697. 701. 708. 717. 724.	
734. 743. 773. 779. 797. 926. 930. 933. 1025. 1072.	
Сѣмьятеченіе . . . . .	154.
Тазовые органы . . . . .	925. 1007.
Тифъ . . . . .	227. 550. 682. 998.
Тифъ брюшной . . . . .	432. 478.

Тошнота . . . . .	79. 212. 283. 478. 504. 612.
Тришперъ . . . . .	120. 136. 504. 760.
Трясеніе въ рукахъ и ногахъ . . . . .	344. 747. 1097.
Увеличеніе молока (для) . . . . .	89. 320. 390. 576. 646. 963. 1068.
Угаръ . . . . .	701.
Удушье . . . . .	297. 386. 469. 498. 525. 633. 648. 677. 724. 778. 796.
Ужаленіе змѣй . . . . .	242. 258. 308. 327. 392. 487. 639. 895. 1044.
Ужаленія наѣкомыми . . . . .	614. 653. 760. 782.
Укушеніе бышен. животными . . . . .	307. 496. 547. 639. 657. 677. 693. 893. 895.
897. 913. 1018.	
Упадокъ силъ . . . . .	519. 1021. 1041. 1097.
Ушибы . . . . .	63. 99. 192. 269. 294. 626. 784.
Ушные болѣзни . . . . .	154. 213. 222. 269. 332. 435. 471. 507. 597. 676. 853.
1061.	
Флюсъ . . . . .	273. 912.
Холера . . . . .	222. 227. 335. 433. 550. 579. 674. 931. 1025.
Хорей . . . . .	1003. 1063.
Худоба . . . . .	210. 216. 365. 511. 667. 740. 807. 930. 1025. 1041.
Худосочіе . . . . .	215. 519. 622. 662. 744. 1041.
Цынга . . . . .	69. 89. 135. 175. 215. 265. 272. 273. 289. 290. 297. 304. 340. 349.
350. 357. 358. 366. 400. 440. 445. 463. 465. 482. 490. 528. 529. 577.	
579. 588. 596. 597. 617. 618. 648. 653. 663. 664. 685. 701. 734. 765	
800. 864. 866. 868. 881. 965. 1007. 1010. 1030. 1043. 1055.	
Чажотка . . . . .	99. 100. 114. 125. 180. 210. 248. 252. 294. 297. 327. 340. 349. 387. 398.
400. 422. 423. 440. 441. 463. 469. 504. 523. 524. 525. 533. 621. 633. 663.	
667. 693. 701. 744. 747. 777. 931. 978. 1095.	
Чажотка горловая . . . . .	857.
Чажотка скоротечная . . . . .	550.
Чесотка . . . . .	216. 239. 309. 323. 340. 351. 384. 513. 529. 535. 544. 550. 576. 590.
603. 627. 649. 653. 671. 797. 811. 849. 878. 884. 926. 1025. 1040. 1051.	
1054. 1072.	
Чирьи . . . . .	239. 724. 779.
Чума . . . . .	1044.
Экзема . . . . .	119. 159. 309.
Эпидемія . . . . .	163. 193. 667. 712. 733. 779. 1025.
Язвы . . . . .	100. 119. 121. 273. 307. 319. 347. 349. 358. 370. 403. 523. 650. 671.
769. 779. 805. 848. 895. 1089.	
Языка болѣзни . . . . .	559. 560. 561. 655. 864.



# АЛФАВИТНЫЙ СПИСОКЪ БОЛѢЗНЕЙ ЖИВОТНЫХЪ

домашнія лечебныя средства противъ которыхъ находятся  
въ „СЛОВАРЬ-ТРАВНИКЪ и ЦВѢТНИКЪ“.

(Цифры, стоящія за названіемъ болѣзни, обозначаютъ страницы словаря.)

<b>Астма</b> . . . . .	89. 683.
<b>Боли въ животѣ</b> . . . . .	394. 550. 673. 675. 707. 709. 978.
<b>Бородавки</b> . . . . .	369.
<b>Били у коровъ</b> . . . . .	247.
<b>Бѣшенство</b> . . . . .	193. 495. 504. 616. 683. 1034.
<b>Водобоязнь</b> . . . . .	605.
<b>Водянка</b> . . . . .	331. 403. 597. 864.
<b>Воспаленіе вымя</b> . . . . .	546.
<b>Воспаленіе десенъ</b> . . . . .	709. 1058.
<b>Воспаленіе желудка и кишокъ у новорожденныхъ</b> . . . . .	751.
<b>Воспаленіе легкихъ</b> . . . . .	70. 85. 89. 403. 416. 419. 550. 682. 751. 761.
<b>Воспаленіе копытъ</b> . . . . .	639.
<b>Воспаленіе околосердечной сумки</b> . . . . .	683.
<b>Выпаденіе волосъ</b> . . . . .	593.
<b>Гангрена</b> . . . . .	331.
<b>Глазныя болѣзни</b> 78. 81. 99. 133. 177. 193. 205. 235. 247. 334. 616. 732. 925. 972.	
<b>Глисты</b> . . . . .	70. 99. 105. 135. 310. 403. 416. 467. 507. 597. 718. 763. 791.
<b>Глухота</b> . . . . .	550.
<b>Головная боль</b> . . . . .	550.
<b>Горловыя болѣзни</b> . . . . .	81. 550. 857.
<b>Гриппъ</b> . . . . .	85. 89. 343. 434. 683. 751.
<b>Гриппозное воспаленіе легкихъ</b> . . . . .	343.
<b>Грудныя болѣзни</b> . . . . .	80. 550.
<b>Дыхательныхъ органовъ болѣзни</b> . . . . .	554. 683. 923.
<b>Жаба</b> . . . . .	419.
<b>Желтуха</b> . . . . .	853.
<b>Желудочныя болѣзни</b> . . . . .	80. 89. 105. 135. 177. 192. 205. 616.
<b>Желчь</b> . . . . .	77.
<b>Желюзы</b> . . . . .	142. 754.
<b>Заворотъ кишокъ</b> . . . . .	193.
<b>Задержка мочи</b> . . . . .	301. 400. 761. 853.



Запоры . . . . .	78. 81. 105. 205. 507. 536. 616. 769.
Зобъ . . . . .	983.
Золотуха . . . . .	330.
Зудъ . . . . .	235. 593. 616. 709. 978.
Катарръ бронхъ . . . . .	683. 925.
Катарръ дыхательныхъ органовъ . . . . .	119. 419. 864. 1058. 1100.
Катарръ желудка . . . . .	81. 247. 754. 835. 864. 925.
Катарръ кишекъ . . . . .	81. 247. 403. 754. 835. 864. 925. 1058.
Кашель 81. 89. 105. 193. 247. 310. 344. 472. 491. 511. 550. 554. 593. 636.	653. 709. 857. 920. 923. 972. 1070. 1071.
Кишечника болѣзни . . . . .	78. 330. 682. 697. 707. 1070. 1071. 1100.
Коклюшъ у собакъ . . . . .	247. 925.
Костюда . . . . .	160. 235.
Кровавая моча . . . . .	419. 523. 559. 560. 707.
Кровотеченіе . . . . .	330. 559. 560. 707. 945.
Крупъ . . . . .	70. 416. 857. 1100.
Легкія . . . . .	572.
Лихорадка . . . . .	136. 159. 177. 204. 235. 343. 356. 433. 857. 925. 945.
Лихорадка послѣ родовъ . . . . .	85. 247.
Лихорадка молочная . . . . .	616.
Лпшанъ . . . . .	159. 593. 653. 1070. 1071.
Маточныя болѣзни . . . . .	925.
Мозга болѣзни . . . . .	550. 683.
Мочевой пузырь . . . . .	572.
Мочеиспусканіе 80. 81. 119. 135. 193. 235. 247. 325. 504. 550. 597. 718.	769.
Мытъ . . . . .	769.
Надкостница . . . . .	142. 707.
Нажожныя болѣзни . . . . .	81. 85. 1058.
Насморкъ . . . . .	247.
Нервы . . . . .	105. 334. 434. 550. 615. 853.
Норпца . . . . .	763.
Одышка . . . . .	105.
Ожоги . . . . .	593.
Опоеііе . . . . .	114. 511. 636.
Опухоли . . . . .	70. 154. 159. 177. 593. 597. 761. 1034. 1036.
Оспа у овецъ . . . . .	362. 781.
Отекъ подкожн. клетчатки . . . . .	761.
Отравленіе . . . . .	105. 193. 572. 1003.
Отрыжка . . . . .	709.
Падучая болѣзнь . . . . .	193. 334.
Параличъ . . . . .	205. 228. 247. 550. 754. 853.
Переломы костей . . . . .	707.
Переутомленіе . . . . .	616.
Пищевареніе . . . . .	69. 78. 105. 205. 228. 268. 310. 331. 416. 419. 572. 791.
Плевры болѣзни . . . . .	682. 751.
Повальная болѣзнь животныхъ . . . . .	205. 223. 920.
Полость рта и глотки . . . . .	247. 925.
Поносъ 69. 80. 81. 330. 356. 400. 416. 419. 596. 615. 616. 707. 835. 925. 978.	1025.

Порокъ сердца . . . . .	682.	683.
Простуда . . . . .	550.	751.
Раны 70. 78. 331. 356. 369. 472. 593. 596. 616. 791. 818. 854. 895. 978. 1036.		
1038. 1054. 1070. 1071.		
Растяженіе суставовъ . . . . .	99.	
Рвота . . . . .	69.	1025.
Ревматизмъ 70. 85. 99. 104. 135. 142. 177. 193. 206. 228. 394. 416. 433. 751.		
761.		
Родовыя болѣзни . . . . .	228.	247. 510. 616. 853. 925. 1100.
Рожа . . . . .		751.
Сапъ . . . . .	70. 89.	247. 416. 751. 760. 925. 1100.
Сердцебіеніе . . . . .		550.
Скопленіе жидкости послѣ болѣзни . . . . .		1003.
Скопленіе жидкости въ брюшной полости . . . . .		761.
Слабость ногъ . . . . .	85. 313.	511. 636. 683. 707.
Слабость общая . . . . .	99. 227. 433. 550. 673. 675. 754. 761. 1099.	1100.
Слезотеченіе . . . . .		78. 945.
Слизотеченіе . . . . .		77. 356. 925.
Ссадины . . . . .		387. 884. 1058.
Столбнякъ . . . . .		223. 434.
Судороги . . . . .	105. 193. 205. 223. 228. 334. 550. 551. 616. 853.	
Суставовъ болѣзни . . . . .		193. 682. 707.
Сухожилія болѣзни . . . . .		707.
Сыпь . . . . .	85. 135. 136. 235. 310. 335]	653. 718.
Тазовыхъ органовъ болѣзни . . . . .		1058.
Тифъ . . . . .		343. 550.
Трипперъ у собакъ . . . . .		369.
Увеличеніе молока (для) . . . . .	511. 538.	636. 680. 978.
Ужаленіе насѣкомыми . . . . .		709. 718. 791.
Укушеніе змѣй . . . . .		709.
Ушибы . . . . .	70. 99. 193. 331.	707. 1036. 1058.
Ушные болѣзни . . . . .		154. 193. 709.
Фистула . . . . .		925.
Холера . . . . .		550.
Хорея . . . . .		334.
Чажотка . . . . .		416. 550. 683.
Чажотка легкихъ у овецъ . . . . .		70.
Черви . . . . .		513.
Чесотка . . . . .	529. 535.	606. 653. 761.
Чума . . . . .		751. 769. 853.
Экзема . . . . .		160.
Эпилепсія . . . . .		193. 205. 223.
Язвы . . . . .	78. 585. 718. 895. 972. 1016. 1025. 1058.	
Ящуръ . . . . .		239. 351.

КОНЕЦЪ.

Ср. 93791




Рис. 259. Ртута башенная.



Рис. 260. Ртута жоржанака.



Рис. 261. Ртута маленькая.



Рис. 262. Сабельник болотный.



Рис. 263. Салатъ джикі.



Рис. 264. Самшукъ обыкновенный.



Рис. 265. Сафлоръ красильный



Рис. 266. Сафой.



Рис. 267. Снег а обыкновенная.



Рис. 268. Свещия много-  
летняя.



Рис. 269. Сельдерей обыкновенный.



Рис. 270. Сердечникъ по-  
левой.



Рис. 271. Сироголовникъ  
прим. рсѣй.



Рис. 272. Синеголовникъ  
равнинный.



Рис. 273. Ситникъ блестящій.



Рис. 274. Ситникъ жабъный.



Рис. 275. Ситникъ примор-  
ский.



Рис. 276. Ситникъ сизый.



Рис. 277. Скеръ а воиочай.



Рис. 278. Скерда двулѣтняя.



Рис. 273. Сшерда зеленая.



Рис. 280. Смоковница обыкновенная.



Рис. 281. Смоленка почечковатая.



Рис. 282. Смоленка повислая.





Рис. 283. Смолка.



Рис. 284. Смородина черная.



Рис. 285. Сныть обыкновенная.



Рис. 286. Солеросъ.



Рис. 287 Солнцеглядъ.




Рис. 288. Сосемка водяная.



Рис. 28 . Сосна горная.



Рис. 290. С агачка болотная.



Рис. 291. Стѣвникъ лекар-  
ственный.



Рис. 29 . Сурѣшникъ.



Рис. 293. Сушенецъ лѣсная.



Рис. 294. Сѣтъ буряя.



Рис. 295. Сыть желтоватая.



Рис. 296. Тернъ.



Рис. 297. Тимофеевка.



Рис. 298. Тиссъ обыкновенный.



Рис. 299. Тминъ обыкновенный.



Рис. 300. Торница полевая.



Рис. 301. Тофисельдія чайничная.



Рис. 302. Триостренникъ болотный.



Рис. 303. Тутовое дерево  
(шелковица белая).



Рис. 304. Тутовое дерево  
(шелковица черная).



Рис. 305. Турча болотная.



Рис. 306. Тялоръвъ сабуре-  
видный.



Рис. 307. Тюльпанъ лѣсной.



Рис. 308. Укропъ воложскій.




Рис. 309. Уруть колосистая.



Рис. 310. Фасоль обыкновенная.




Рис. 311. Хвощь белотный.



Рис. 312. Хвощь лесной.



Рис. 313. Хлопушка.



Рис. 314. Хвеле радъ : быкновенный.





Рис. 315. Коклатка желтая.



Рис. 316. Хрѣнь.



Рис. 317. Хрѣнь водяной.



Рис. 318. Чаберъ садовый.



Рис. 319. Чертополохъ бес-  
стебельный.



Рис. 320. Чертополохъ болот-  
ный.



Рис. 321. Чертополохъ шер-  
стистый.



Рис. 322. Чеснокъ полевой.



Рис. 323. Чечевица волосистая.



Рис. 324. Чечевица четырехгранная.



Рис. 325. Ч. а. безлистная.



Рис. 326. Чина черная.



Рис. 327. Чистецъ болотный.



Рис. 328. Чистякъ.



Рис. 329. Шандра об кно-венная.



Рис. 330. Шафранъ настоящий.



Рис. 331. Шейхцерія болотная.



Рис. 332. Шпинатъ огородный.



Рис. 333. Щавель водяной.



Рис. 334. Щавель курчав лѣ.



Рис. 335. Щавель морской.



Рис. 336. Щавель рѣчной.



Рис. 337. Яворъ.



Рис. 338. Ясколка обыкновенная.



Рис. 339. Яснотка стебле-  
ооъемлющая.



Рис. 340. Ястребинка воло-  
систая.



Рис. 341. Ястребинка стѣн-  
ная.



Рис. 342. Ягрышникъ муж-  
ской.



Рис. 343. Ятрышник широколистный.



Рис. 344. Ячмень обыкновенный.



Рис. 345. Ячмень шестирядный





Фигуры: 228) Сиякъ обыкновенный. 229) Румянка лекарственная. 230 и 231) Рѣдка. 232 и 233) Рыжикъ. 234) Сердечникъ горькій. 235 и 236) Грибные обыкновенная.



Фигуры: 237) Спрень обыкновенная. 238 и 239) Смородина красная. 240) Сморокъ. 241) Строчокъ. 242) Слива. 243) Серпуха красильная.



Фигуры: 244 и 245) Сосна обыкновенная. 246) Сусак зонтичный. 247) Стальник пахучий. 248 и 249) Спаржа обыкновенная. 250) Сушенца альпийская (эдельвейс).



Фигуры: 251) Татарникъ колючій. 252) Тополь серебристый. 253) Трюфель  
бѣлый. 254) Трюфель черный. 255) Толокнянка. 256) Трисунка средняя.





Фигуры: 257) Тысячелестникъ обыкновенный. 258) Фиалка ночная. 259) Тростникъ обыкновенный. 260. Хвощъ. 261. Фиалка трехцветная.



Фигуры: 262) Цикорій обыкновенный. 263) Фукусъ пузырчатый 264) Хмель.  
265) Чемерица бѣлая.



Фигуры: 266) Черда трехраздельная. 267) Черемуха. 268) Чернобыльник обыкновенный. 269) Черника.



Фигуры: 270) Чертополохъ пониклый. 271) Чертополохъ огородный. 272) Черноталь. 273) Чесночная трава.





Фигуры: 281) Шелковникъ черная. 282) Шафранъ весенній. 283) Шпорникъ красный. 284) Шпажникъ обыкновенный. 285 и 286) Шиповникъ. 287) Щавель обыкновенный.



Фигуры: 274) Чина лѣсная. 275) Чистецъ лѣсной. 276) Чернокорень лекарственный. 277 и 278) Шампињонъ. 279) Чистотѣль. 280) Шалфей лекарственный.





Фигуры: 288) Щитникъ большой. 289) Яблоня. 290) Язвенникъ обыкновенный. 291) Эспарсеть кормовой. 292) Ясминнаѣ душистый. 293 и 294) Ясень бѣлый.



Фигуры: 295 и 296) Ясень обыкновенный. 297) Ятрышникъ пятипестый. 298) Яснотка пурпуровая. 299) Ятрышникъ пирамидальный. 300) Ячмень двурядный.



шкаф. е 221-120

1898 а

Залесова Е.Н.  
Полный русск. иллюст.  
сл-рь-травник.

Т. II (С-Я) СПб, 1901